

KENNZEICHUNG

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

{Omdoos }

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nafpenzal DC

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Form.:

natrii nafcillinas 100 mg (acidum) –procaini benzylpenicillinas 300mg. - dihydrostreptomycini sulfas
100 mg (base) - ad 3g per injector/par injecteur/pro Injektor

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie/Suspension

4. VERPAKKINGSGROOTTE

5 x 4 injectoren/injecteurs

1 x 20 injectoren/injecteurs

6 x 20 injectoren/injecteurs

100 injectoren/injecteurs

5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen tijdens droogstand

Bovins pendant le tarissement

Rinder während der Trockenstehperiode.

6. INDICATIES

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor intramammaire toediening.

Pour administration intramammaire.

Zum Einbringen in das Euter.

8. WACHTTIJD**Wachttijden/temps d'attente/Wartezeit:**

Vlees + organen: 5 w.

Melk: droogstand: ≥ 46 d.: 3 mm.
 < 46 d.: 46 d.

Viande + organes: 5 s.

Lait: tarissement: ≥ 46 j.: 3 tr.
 < 46 j.: 46 j.

Fleisch + Organe: 5 W.

Milch: Trockenstehperiode: ≥ 46 T.: 3 Mv.
 < 46 T.: 46 T.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Zie bijsluiters/Voir notice/Siehe Packungsbeilage

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 25°C. Niet invriezen.
À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas congeler.
Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

-

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Ad us.vet.
Voorschrift/Ordonnance/Vorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Conserver hors de la portée et de la vue des enfants.
Ausser Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V. - Boxmeer - Nederland vertegenwoordigd door/représenté par/Vertreten
durch: MSD Animal Health BVBA – Lynx Binnenhof 5 – 1200 Brussel

16. NUMMER IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

BE-V023572

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

18. OVERIGE INFORMATIE

DROOGZETTER/TARISSEMENT/TROCKENSTELLER

Uitwendig gebruik/Usage externe/Außerlichen Anwendung

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

{Injector à 3g}

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nafpenzal DC

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Form.:natrii nafcillin 100 mg (acidum) –procaini benzylpenicillin 300mg. - dihydrostreptomycini sulfas 100 mg (base) - ad 3g per injector/par injecteur/pro Injektor

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN**4. TOEDIENINGSWEG(EN):**

Voor intramammaire toediening tijdens de droogstand.
Pour administration intramammaire en période de tarissement.
Zum Einbringen in das Euter während der Trockenstehperiode.

5. WACHTTIJD**Wachttijd/temps d'attente/Wartezeit:**

Vlees + organen: 5 w.

Melk: droogstand: ≥ 46 d.: 3 mm.
< 46 d.: 46 d.

Viande + organes: 5 s.

Lait: tarissement: ≥ 46 j.: 3 tr.
< 46 j.: 46 j.

Fleisch + Organe: 5 W.

Milch: Trockenstehperiode: ≥ 46 T.: 3 Mv.
< 46 T.: 46 T.

6. PARTIJNUMMER

Lot:

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us. vet.

9. OVERIGE INFORMATIE

DROOGZETTER/TARISSEMENT/TROCKENSTELLER

BE-V023572

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

{aluminiumzak}

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nafpenzal DC

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

-

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

-