

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****KARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Taurador 5 mg/ml Lösung zum Übergiessen für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Doramectin: 5 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 ml

1 l

2,5 l

5 l

10 l

20 l

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG****Anwendung:**

Anwendung zum Übergiessen.

Das Tierarzneimittel sollte entlang der Mittellinie des Rückens in einem schmalen Streifen zwischen dem Widerrist und dem Schwanzansatz aufgetragen werden.

Dosierung: Eine einzelne Behandlung von 1 ml (5 mg Doramectin) pro 10 kg Körpergewicht (basierend auf einer empfohlenen Dosierung von 500 µg Doramectin pro kg Körpergewicht).

DOSIERHILFE		DIE TIERE SOLLTEN GEWOGEN UND NACH KÖRPERGEWICHT GRUPPIERT WERDEN, UM UNTER- ODER ÜBERDOSIERUNG ZU VERMEIDEN*					
KÖRPER- GEWICHT	DOSIS PRO TIER	ANZAHL DER VOLLEN DOSEN PRO PACKUNG					
		250 ml	1 Liter	2,5 Liter	5 Liter	10 Liter	20 Liter
100 kg	10 ml	25	100	250	500	1000	2000
150 kg	15 ml	16	66	166	333	666	1333

200 kg	20 ml	12	50	125	250	500	1000
250 kg	25 ml	10	40	100	200	400	800
300 kg	30 ml	8	33	83	166	333	666
350 kg	35 ml	7	28	71	142	285	571
400 kg	40 ml	6	25	62	125	250	500
450 kg	45 ml	5	22	55	111	222	444
500 kg	50 ml	5	20	50	100	200	400
550 kg	55 ml	4	18	45	90	181	363
600 kg	60 ml	4	16	41	83	166	333

* Dosirate 1 ml pro 10 kg Körpergewicht

Wenn Tiere nicht einzeln, sondern in Gruppen behandelt werden sollen, sollten sie nach ihrem Körpergewicht gruppiert und entsprechend dosiert werden, um Unter- oder Überdosierungen zu vermeiden.

Um eine korrekte Dosierung zu gewährleisten, sollte das Körpergewicht so genau wie möglich ermittelt werden. Die Genauigkeit der Dosierhilfe sollte überprüft werden.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 35 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Bei trächtigen Kühen oder Färsen, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten (60 Tagen) vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

Nicht im Kühlschrank lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren. Das Verpackung fest verschlossen halten.

Kontaminationen sind zu vermeiden.

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hochentzündlich - von Hitze, Funken, offenen Flammen oder sonstigen Zündquellen fernhalten.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V540293 (Flaschen)
BE-V540302 (Back-Packs)
BE-V540311 (Kanistern)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

ETIKETT (BASIS ETIKETT FÜR ERWEITERBARES ETIKETT – 10L UND 20L)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Taurador 5 mg/ml Lösung zum Übergießen für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Doramectin: 5 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Anwendung zum Übergießen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 35 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Bei trächtigen Kühen oder Färsen, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten (60 Tagen) vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

Nicht im Kühlschrank lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren. Das Verpackung fest verschlossen halten

Kontaminationen sind zu vermeiden.

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hochentzündlich - von Hitze, Funken, offenen Flammen oder sonstigen Zündquellen fernhalten.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}