

## PAKKAUSSELOSTE

### Duplocillin LA vet injektioneste, suspensio koiralle ja kissalle

#### 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Alankomaat

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Intervet Productions S.r.l.  
Via Nettunese Km. 20, 300  
04011 Aprilia (Latina)  
Italia

#### 2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duplocillin LA vet injektioneste, suspensio

#### 3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

**Vaikuttavat aineet:**

1 ml sisältää:

Bentsyylipenisilliinibentsatiini	150.000 IU	(125 mg)
Bentsyylipenisilliiniprokaiini	150.000 IU	(150 mg)

**Apuaineet:** Metyyliparahydroksibentsoaatti (E 218), propyyli parahydroksibentsoaatti (E 216), lesitiini, natriumsitraattidihydraatti, kaliumdivetyfosfaatti, dimetikoni, sorbitaalipalmitaatti, polysorbaatti 40, natriumkloridi, natriumhydroksidi/fosforihappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

#### 4. KÄYTTÖAIHEET

Penisilliinille herkkien bakteerien aiheuttamien infektioiden, esimerkiksi puremien ja paiseiden hoitoon.

#### 5. VASTA-AIHEET

Beetalaktamaasia (penisillinaasia) tuottavien stafylokokkien aiheuttamat infektiot. Yliherkkyyks penisilliinille tai muille beetalaktaameille.

#### 6. HAITTAVAIKUTUKSET

Yliherkkyyksireaktiot mahdollisia.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

## 7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Koira, kissa

## 8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Ohjeannostus:

Koira, kissa: 27,5 mg/kg = 1 ml/10 kg ihonalaisesti.

Annoksen voi tarvittaessa uusia 2 vrk:n kuluttua.

## 9. ANNOSTUSOHJEET

Ravistettava ennen käyttöä. Annetaan ihon alle.

## 10. VAROAIKA

Ei oleellinen.

## 11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä jääkaapissa ( 2 °C – 8 °C ) ja valolta suojassa. Ei saa jäättyä.

Säilytä avattu pullo jääkaapissa ( 2 °C – 8 °C ) ja käytä 28 päivän kuluessa.

## 12. ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:

Ei ole.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Ei ole.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Penisilliinit voivat aiheuttaa yliherkkyysoireita injisoituina, hengitettynä, syötyinä tai ihokontaktilla.

Joskus reaktiot voivat olla hengenvaarallisia. Jos olet yliherkkä beetalaktaameille tai neomysiinille, älä käsittele valmistetta. Jos saat sellaisia oireita, kuten ihottumaa, kasvojen, huulien tai kurkunpään turvotusta tai hengitysvaikeuksia, ota yhteyttä lääkäriin. Kädet on hyvä pestä aina valmisteen antamisen jälkeen.

Tiineys:

Voidaan käyttää tiineyden ja laktation aikana.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Bakterisidiset (bakteereita tappavat) ja bakteriostaattiset (bakteereiden kasvua ja lisääntymistä estävät) mikrobilääkkeet vaikuttavat vastakkaisesti.

Synergismia (samansuuntaisia vaikutuksia) saattaa esiintyä käytettäessä samanaikaisesti muita

bakterisidisiä valmisteita.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Ei tunnettuja.

Yhteensopimattomuudet:

Ei tunneta.

### **13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

### **14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY**

4.11.2019

### **15. MUUT TIEDOT**

**Pakkaustyyppi ja koko:**

100 ml:n muovinen (PET) injektiopullo.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

MSD Animal Health Oy  
info\_ah\_finland@merck.com  
Puh: 010 2310 750

## BIPACKSEDEL FÖR

### Duplocillin LA vet injektionsvätska, suspension för hund och katt

#### 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsats:

Intervet Productions S.r.l.  
Via Nettunese Km. 20, 300  
04011 Aprilia (Latina)  
Italien

#### 2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Duplocillin LA vet injektionsvätska, suspension

#### 3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

**Aktiv substans:**

1 ml innehåller:

Bensylpenicillinbenzatin	150.000 IU	(125 mg)
Bensylpenicillinprokain	150.000 IU	(150 mg)

**Hjälpämnen:** Metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxidbensoat (E 216), lecitin, natriumcitratdihydrat, kaliumdivätefosfat, dimetikon, sorbitalpalmitat, polysorbat 40, natriumklorid, natriumhydroxid/fosforsyra, vatten för injektionsvätska.

#### 4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Infektioner orsakade av bakterier känsliga för penicillin, exempelvis för behandling av bitsår och bölder.

#### 5. KONTRAINDIKATIONER

Infektioner orsakade av betalaktamas (penicillinas) producerande stafylokocker. Överkänslighet för penicillin eller andra betalaktamer.

#### 6. BIVERKNINGAR

Överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

## **7. DJURSLAG**

Hund, katt

## **8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)**

Doseringsanvisning:

Hund, katt: 27,5 mg/kg = 1 ml/10 kg subkutant.

Behandlingen kan upprepas vid behov efter 2 dygn.

## **9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING**

Omskakas före användning. Ges subkutant.

## **10. KARENSTID**

Ej relevant.

## **11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Bruten förpackning bör förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C) och användas inom 28 dagar.

## **12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)**

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Inga.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Inga.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Penicilliner kan åstadkomma överkänslighetsreaktioner om man injicerar, andas eller äter av dem samt vid hudkontakt. Ibland kan reaktionerna vara livshotande. Om du är överkänslig för betalaktamer eller neomycin, undvik hantering av produkten. Vid symptom så som eksem, svullnad av ansikte, läppar, struphuvud eller andningssvårigheter kontakta läkare. Tvätta händerna vid behov efter administration av produkten.

Dräktighet:

Kan användas under dräktighet och laktation.

Andra läkemedel och Duplocillin LA:

Den baktericida (bakteriedödande) och bakteriostatiska (tillväxthämmande) effekten av mikrobläkemedel verkar antagonistiskt. Synergism (samverkan) kan förekomma om andra baktericida preparat används samtidigt.

Överdoser (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Inga kända.

Blandbarhetsproblem:

Inga kända.

**13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

**14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

4.11.2019

**15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

100 ml plast (PET) injektionsflaska.

För ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel, kontakta den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

MSD Animal Health Oy  
info\_ah\_finland@merck.com  
Puh: 010 2310 750

