

[Version 9.1,11/2024]

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

LEVA-200 WS, 200 mg/g, milteliai geriamajam tirpalui ruošti veršeliams, avims, paukščiams ir kiaulėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g yra:

veikliosios medžiagos:

levamizolio hidrochlorido 200 mg;

pagalbinių medžiagų:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Silikono dioksidas
Natrio sulfatas
Laktozės monohidratas.

Balti milteliai.

3. KLINIKINIAI DUOMENYS

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Veršeliai, avys, paukščiai (vištos, kalakutai) ir kiaulės.

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Veršeliams, vištomis, kalakutam, avims ir kiaulėms, užsikrėtusiems virškinimo trakto ir plaučių helmintais, gydyti ir profilaktiškai:

- galvijams, veršeliams ir avims: *Bunostomum*, *Chabertia*, *Cooperia*, *Dictyocaulus*, *Haemonchus*, *Nematodirus*, *Ostertagia*, *Protostrongylus* ir *Trichostrongylus* spp.
- vištomis ir kalakutam: *Ascaridia* ir *Capillaria* spp.
- kiaulėms: *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Metastrongylus elongatus*, *Oesophagostomum* spp. ir *Trichuris suis*.

3.3. Kontraindikacijos

Negalima gydyti gyvūnų, sutrikus kepenų funkcijai.

Negalima naudoti kartu su piranteliu, moranteliu arba organiniais fosforo junginiais.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

3.4. Specialieji įspėjimai

Būtina laikytis nurodytų dozių, nes perdozavimas gali sukelti toksiškumą.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Veterinarinio vaisto naudojimas turi būti pagrįstas vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie nematodų jautrumą ir rekomendacijomis kaip apriboti tolimesnį atsparumą antihelmintinėms medžiagoms.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus ar patekus į akis, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir gydytojui parodyti veterinarinio vaisto pakuotės lapelį arba etiketę. Atsitiktinai patekus ant odos, tą vietą būtina plauti dideliu kiekiu vandens.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas levamizolio hidrochloridui turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Dirbant su veterinariniu vaistu būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones (apsauginius rūbus ir pirštines). Stengtis nesukelti dulkių. Vengti įkvėpti dulkių.

Baigus darbą būtina plauti rankas. Dirbti su veterinariniu vaistu reikia apdairiai.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės:

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujami reiškiniai

Veršeliai, avys, paukščiai (vištos, kalakutai) ir kiaulės:

Naudojus rekomenduotinomis dozėmis nepalankios reakcijos menkai tikėtinos.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo ar laktacijos metu, bet atsargiai gydyti pateles vėlyvame vaikingumo laikotarpyje ar dėl blogų oro sąlygų, prastos mitybos, perkėlimo, laikymo sąlygų ir t.t. stresą patiriančius gyvūnus.

Dedantys kiaušinius paukščiai

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Ženkli sąveika nėra žinoma. Negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Skiriamas su geriamuoju vandeniu.

Veršeliams ir avims reikia skirti 7,5 mg levamizolio hidrochlorido 1 kg kūno svorio vieną kartą.

Veterinarinį vaistą reikia sugirdyti per kartą.

Rekomenduotinos dozės:

Galvijai		Aviai ar ožkai	
Kūno svoris (kg)	Leva-200 WS (g)	Kūno svoris (kg)	Leva-200 WS (g)
50	1,9	10	0,4
100	3,8	20	0,8

150	5,6	30	1,1
200	7,5	40	1,5
250	9,4	50	1,9
300	11,3	60	2,3

Kiaulėms reikia skirti 7,5 mg levamizolio hidrochlorido 1 kg kūno svorio vieną kartą. Veterinarinį vaistą reikia girdyti su geriamuoju vandeniu.

Paukščiams (vištoms ir kalakutams) reikia skirti 30 mg levamizolio hidrochlorido 1 kg kūno svorio vieną kartą. Veterinarinį vaistą reikia girdyti su geriamuoju vandeniu.

Remiantis rekomenduojama doze ir gydomų gyvūnų skaičiumi bei svoriu, tiksli veterinarinio vaisto paros koncentracija turi būti apskaičiuota pagal šią formulę:

$$\frac{\text{..... mg g miltelių/1 kg kūno svorio per parą}}{\text{vidutinis vieno gyvūno per parą suvartojamo vandens kiekis (l)}} \times \frac{\text{gydytinų gyvūnų vidutinis kūno svoris (kg)}}{\text{viena}} = \text{.... mg miltelių/ 1 l geriamojo vandens}$$

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

Išgeriamo su veterinariniu vaistu sumaišyto vandens kiekis priklauso nuo gyvūnų klinikinės būklės. Siekiant gauti tinkamą dozę, gali tekti koreguoti veterinarinio vaisto koncentraciją geriamajame vandenyje.

Jeigu naudojamos ne pilnos pakuotės, rekomenduojama naudoti tinkamai sukalibruotą svėrimo įrangą.

Veterinarinio vaisto paros dozę reikia įmaišyti į tokį geriamojo vandens kiekį, kad visas veterinarinis vaistas būtų suvartotas per 24 val. Kas 24 val. geriamasis vanduo su veterinariniu vaistu turėtų būti ruošiamas naujai. Rekomenduojama paruošti koncentruotą tirpalo ruošinį (maždaug 100 gramų veterinarinio vaisto vienam litrai geriamojo vandens) ir prireikus jį toliau skiesti iki terapinės koncentracijos.

Veterinarinį vaistą taip pat galima girdyti su geriamuoju vandeniu, 0,05 % koncentracijos: 1 kg miltelių ištirpinti 2 000 l geriamojo vandens vieną kartą.

Vandenį su veterinariniu vaistu reikia keisti kas 24 val.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Perdozavimas gali sukelti dieglius, kosulį, padidėjusį seilėtekį, sujaudinimą, padažnėjusį kvėpavimą, ašarojimą, spazmus, prakaitavimą ir vėmimą.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

Veršienai, avienai, paukštienai ir kiaulienai – 10 parų.

Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.

Negalima naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas: QP52AE01.

4.2. Farmakodinamika

Levamisolis yra sintetinis antihelminitikas, veikiantis daugumą virškinimo trakto ir kvėpavimo takų helmintų.

Levamisolis stimuliuoja jautrių helmintų parasimpatinius ir simpatinius ganglijus. Didelės levamisolio dozės sąveikauja su nematodų angliavandenių metabolizmu blokuodamos fumarato redukciją ir sukcinato oksidaciją. Poveikis paralyžiuoja helmintą ir jis iš organizmo pašalinamas gyvas.

Aprašytas avių *Teladorsagia*, *Cooperia* ir *Trichostrongylus* rūšių parazitų atsparumas levamisoliui kai kuriose šalyse, įskaitant ir ES. Dėl to veterinarinio vaisto naudojimas turi būti pagrįstas vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie nematodų jautrumą ir rekomendacijomis kaip apriboti tolimesnį atsparumą antihelminatinėms medžiagoms.

4.3 Farmakokinetika

Absorbuotas levamisolis pasklinda organizme, kur metabolizuojamas ir tik mažiau nei 6 % išsiskiria nepakitusio su šlapimu. Eliminacijos iš kraujo plazmos pusperiodis galvijams yra 4–6 val., kiaulėms – 3,5–6,8 val. Metabolitai išsiskiria su šlapimu (daugiausiai) ir išmatomis.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. Nėra informacijos apie galimą šio veterinarinio vaisto sąveiką ar nesuderinamumą, naudojant per burną, sumaišius su geriamuoju vandeniu kuriame yra biocidinių produktų, pašaro priedų ar kitų geriamajame vandenyje panaudotų medžiagų.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 2 sav.

Tinkamumo laikas, ištirpinus pagal nurodymus, – 24 val.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Indą laikyti sandariai uždarytą.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Balti DTPE indai po 1 000 g, apgaubti baltu MTPE gaubteliu su apsaugine juoste.

5.5 Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar LT“

7. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/16/2362/001

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2016-07-14

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2025-09-26

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**INDAS****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

LEVA-200 WS, 200 mg/g, milteliai geriamajam tirpalui

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA

1 g yra:
levamizolio hidrochlorido 200 mg.

3. PAKUOTĖS DYDIS

1 000 g

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Veršeliai, avys, paukščiai (vištos, kalakutai) ir kiaulės.

5. INDIKACIJA (-OS)**6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS**

Skiriamas su geriamuoju vandeniu.

7. IŠLAUKA

Išlauka:
Veršienai, ožkienai, avienai, paukštienai ir kiaulienai – 10 parų.
Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.
Negalima naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

8. TINKAMUMO DATA

Exp.: {mėnuo/metai}
Atidarius, sunaudoti per 2 sav.
Atskiedus sunaudoti per 24 val.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti sausoje vietoje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Indą laikyti sandariai uždarytą.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/16/2362/001

15. SERIJOS NUMERIS

Lot: {numeris}

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

LEVA-200 WS, 200 mg/g, milteliai geriamajam tirpalui ruošti veršeliams, avims, paukščiams ir kiaulėms

2. Sudėtis

1 g yra:

veikliosios medžiagos:

levamizolio hidrochlorido 200 mg.

Balti milteliai.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Veršeliai, avys, paukščiai (vištos, kalakutai) ir kiaulės.

4. Naudojimo indikacijos

Veršeliams, vištomis, kalakutams, avims ir kiaulėms, užsikrėtusiems virškinimo trakto ir plaučių helmintais, gydyti ir profilaktiškai:

- galvijams, veršeliams ir avims: *Bunostomum*, *Chabertia*, *Cooperia*, *Dictyocaulus*, *Haemonchus*, *Nematodirus*, *Ostertagia*, *Protostrongylus* ir *Trichostrongylus* spp.

- vištomis ir kalakutams: *Ascaridia* ir *Capillaria* spp.

- kiaulėms: *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Metastrongylus elongatus*, *Oesophagostomum* spp. ir *Trichuris suis*.

5. Kontraindikacija

Negalima gydyti gyvūnų, sutrikus kepenų funkcijai.

Negalima naudoti kartu su piranteliu, moranteliu arba organiniais fosforo junginiais.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai:

Būtina laikytis nurodytų dozių, nes perdozavimas gali sukelti toksiškumą.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims:

Veterinarinio vaisto naudojimas turi būti pagrįstas vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie nematodų jautrumą ir rekomendacijomis kaip apriboti tolimesnį atsparumą antihelminatinėms medžiagoms.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojančiams vaistą gyvūnams:

Atsitiktinai prarijus ar patekus į akis, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir gydytojui parodyti veterinarinio vaisto pakuotės lapelį arba etiketę. Atsitiktinai patekus ant odos, tą vietą būtina plauti dideliu kiekiu vandens.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas levamizolio hidrochloridui turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Dirbant su veterinariniu vaistu būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones (apsauginius rūbus ir pirštines). Stengtis nesukelti dulkių. Vengti įkvėpti dulkių. Baigus darbą būtina plauti rankas. Dirbti su veterinariniu vaistu reikia apdairiai.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės:
Netaikytinos.

Vaikingumas ir laktacija:

Galima naudoti vaikingumo ar laktacijos metu, bet atsargiai gydyti patelės vėlyvame vaikingumo laikotarpyje ar dėl blogų oro sąlygų, prastos mitybos, perkėlimo, laikymo sąlygų ir t.t. stresą patiriančius gyvūnus.

Dedantys kiaušinius paukščiai:

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu.

Perdozavimas:

Perdozavimas gali sukelti dieglius, kosulį, padidėjusį seilėtekį, sujaudinimą, padažnęjusį kvėpavimą, ašarojimą, spazmus, prakaitavimą ir vėmimą.

Specialūs naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos:

Netaikytinos.

Pagrindiniai nesuderinamumai:

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. Nėra informacijos apie galimą šio veterinarinio vaisto sąveiką ar nesuderinamumą, naudojant per burną, sumaišius su geriamuoju vandeniu kuriame yra biocidinių produktų, pašaro priedų ar kitų geriamajame vandenyje panaudotų medžiagų.

7. Nepageidaujami reiškiniai

Veršeliai, avys, paukščiai (vištos, kalakutai) ir kiaulės:

Naudojus rekomenduotinomis dozėmis nepalankios reakcijos menkai tikėtinos.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius taip pat galite pranešti registruotojui arba jo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

El. paštas: vaistu.registracija@vmvt.lt

Pranešimo forma:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Skiriamas su geriamuoju vandeniu.

Veršeliams ir avims reikia skirti 7,5 mg levamizolio hidrochlorido 1 kg kūno svorio vieną kartą.

Veterinarinį vaistą reikia sugirdyti per kartą.

Rekomenduotinos dozės:

Galvijai		Aviai ar ožkai	
Kūno svoris (kg)	Leva-200 WS (g)	Kūno svoris (kg)	Leva-200 WS (g)
50	1,9	10	0,4
100	3,8	20	0,8
150	5,6	30	1,1
200	7,5	40	1,5
250	9,4	50	1,9
300	11,3	60	2,3

Kiaulėms reikia skirti 7,5 mg levamizolio hidrochlorido 1 kg kūno svorio vieną kartą. Veterinarinį vaistą reikia girdyti su geriamuoju vandeniu.

Paukščiams (vištoms ir kalakutams) reikia skirti 30 mg levamizolio hidrochlorido 1 kg kūno svorio vieną kartą. Veterinarinį vaistą reikia girdyti su geriamuoju vandeniu.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Remiantis rekomenduojama doze ir gydomų gyvūnų skaičiumi bei svoriu, tiksli veterinarinio vaisto paros koncentracija turi būti apskaičiuota pagal šią formulę:

$$\frac{\text{..... mg g miltelių/1 kg kūno svorio per parą} \times \text{gydytinų gyvūnų vidutinis kūno svoris (kg)}}{\text{vidutinis vieno gyvūno per parą suvartojamo vandens kiekis (l)}} = \text{.... mg miltelių/ 1 l geriamojo vandens}$$

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

Išgeriamo su veterinariniu vaistu sumaišyto vandens kiekis priklauso nuo gyvūnų klinikinės būklės. Siekiant gauti tinkamą dozę, gali tekti koreguoti veterinarinio vaisto koncentraciją geriamajame vandenyje.

Jeigu naudojamos ne pilnos pakuotės, rekomenduojama naudoti tinkamai sukalibruotą svėrimo įrangą.

Veterinarinio vaisto paros dozę reikia įmaišyti į tokį geriamojo vandens kiekį, kad visas veterinarinis vaistas būtų suvartotas per 24 val. Kas 24 val. geriamasis vanduo su veterinariniu vaistu turėtų būti ruošiamas naujai. Rekomenduojama paruošti koncentruotą tirpalo ruošinį (maždaug 100 gramų veterinarinio vaisto vienam litrai geriamojo vandens) ir prireikus jį toliau skiesti iki terapinės koncentracijos.

Veterinarinį vaistą taip pat galima girdyti su geriamuoju vandeniu, 0,05 % koncentracijos: 1 kg miltelių ištirpinti 2 000 l geriamojo vandens vieną kartą.

Vandenį su veterinariniu vaistu reikia keisti kas 24 val.

10. Išlauka

Veršienai, avienai, paukštienai ir kiaulienai – 10 parų.

Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.

Negalima naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Indą laikyti sandariai uždarytą.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Exp“.
Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 2 sav.

Tinkamumo laikas, ištirpinus pagal nurodymus, – 24 val.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turėtų padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/16/2362/001

Pakuočių dydžiai: 1 000 g.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2026-01-17

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius:

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

Terminalo g. 13, Biruliškės

LT-54469, Kauno r.

Lietuva

Tel.: +37065571517

El.p.: marius@interchemie.lt

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

Metaalweg 8

5804 CG, Venray,

Nyderlandai

Tel: +31 885252208

E-mail: coo@interchemie.com