

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/19/0002

LV Calmasol-204 S šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs :

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi county
Harjumaa 74013
Igaunija
Tel: +372 6005 005

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

LV Calmasol-204 S šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, suņiem un kaķiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāta monohidrāts 200 mg

Nātrija toldimfos 4 mg

Magnija hlorīda heksahidrāts 3,34 mg

Palīgvielas:

Nātrija metilparahidroksibenzoāts 1,5 mg

Nātrija propilparahidroksibenzoāts 0,15 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Piena triekas, pirmsdzemdību un pēcdzemdību paraplēģijas, stresa sindroma, alerģisku reakciju ārstēšanai, organisma vispārējai stimulācijai zirgiem, liellopiem, teļiem, kumeļiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas, aitas, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lēnai intravenozai, subkutānai, intraperitoneālai vai intramuskulārai injekcijai.

Zirgiem, liellopiem – 250ml.

Teļiem, kumeļiem, aitām, cūkām – 50-150ml.

Suņiem un kaķiem – 15-50ml.

Saskaņā ar ārstējošā veterinārārsta norādījumiem, nepieciešamības gadījumā šīs veterinārās zāles ievada atkārtoti.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 8. punktā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Pirms lietošanas šīm veterinārajām zālēm ļaut uzsilt līdz ķermeņa temperatūrai.

Intravenozā infūzija vai injekcija jāveic lēni.

Ievadot subkutāni, kopējā deva jāsadala uz divām injekcijas vietām.

Infūzijas laikā jāuzrauga sirdsdarbības ātrums un ritms, kā arī asinsrite. Ja parādās jebkādas pārdozēšanas pazīmes, infūzija nekavējoties jāpārtrauc.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša saskare ar acīm, rūpīgi skalot acis ar tekošu ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skartā vieta jāmazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.

Nejaušas pašinjekcijas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai marķējumu ārstam.

Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Nekavējoties noskalojiet ādu ar acīm un skalojiet ar ūdeni.

Ar šīm veterinārajām zālēm jārikojas uzmanīgi, ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Pēc preparāta lietošanas mazgājiet rokas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

Pārdozēšana:

Nav novērota.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

02/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

500 ml polipropilēna flakons ar sterilu brombutila gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu.
Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.