



ETIQUETA/PROSPECTO (saco de 25 Kg)

CRISTACID PREMIX
(12,5 % doxiciclina)

Composición (por 100g):

Doxiciclina (hclato).....12,5 g
Excipiente c.s.p.....100 g

Indicaciones de uso:

Afecciones respiratorias del cerdo causadas por *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Pasteurella multocida*.

Forma farmacéutica:

Premezcla medicamentosa.

Especies de destino:

Porcino.

Posología modo y vía de administración:

Vía oral en pienso.

Porcino: Administrar 15 mg de doxiciclina/Kg de peso vivo durante 5 días.

Como tasa de incorporación patrón, se deberá añadir 2 Kg de premezcla por Tm de pienso. Sólo para uso en piensos granulados.

La temperatura máxima de granulación deberá ser de 60°C.

Contraindicaciones

No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.

No administrar a animales con alteraciones hepáticas.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Fotosensibilización.

En tratamientos muy prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.

Precauciones especiales de uso

Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

Evitar su administración en comederos y/o bebederos oxidados.

Utilización durante la gestación y lactancia

En los estudios realizados en animales de experimentación no se evidenciaron efectos tóxicos. La seguridad del producto no se ha demostrado en cerdas gestantes ni en cerdas en lactación, por lo que se recomienda no usarlo en estos animales.



Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción

La absorción de la doxiciclina se puede disminuir con la presencia de Ca^{++} , Fe^{++} , Mg^{++} o Al^{+++} en la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

Tiempo de espera:

Porcino: 5 días.

Precauciones especiales de seguridad que deberá tomar la persona que administre o manipule el medicamento

No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas.

Manipular el producto con cuidado para evitar el contacto durante su incorporación al pienso, así como durante la administración del pienso medicamentoso a los animales, tomar las precauciones específicas:

Tomar las medidas adecuadas para evitar la diseminación de polvo durante la incorporación del producto al pienso.

Llevar una mascarilla antipolvo (conforme con la norma EN140FFP1), guantes, mono de trabajo y gafas de seguridad aprobadas.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar abundantemente con agua clara.

No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.

Si aparecen síntomas tras exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y presentar dichas advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente.

Período de validez

Premezcla: 18 meses.

Una vez abierto el envase: 8 meses.

Pienso medicado: 3 meses.

Precauciones especiales de conservación

Mantener en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz.

Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el medicamento no utilizado y/o los envases

Los envases usados y cualquier resto de contenido deberán ser eliminados de forma segura para el medio ambiente y de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia.

Nº de lote

Fecha de caducidad

Nº de autorización de comercialización **1705 ESP**

Para Uso Veterinario



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

Con prescripción veterinaria

Contenido: 25 Kg

Titular de la autorización y fabricante

LABORATORIO JAER
c/ Barcelona, 411
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)