

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНИ КУТII

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Fascionix 34% Inj. – 340 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Nitroxinil 340.00 mg/ml (като N-ethylglucamine salt)

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml
100 ml
250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда и овце.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Ветеринарният лекарствен продукт е предназначен за лечение на фасциолоза (опаразитяване със зрели и незрели форми на *Fasciola hepatica*) при говеда и овце. Ефективен е и срещу опаразитяване с възрастни и ларвни форми на *Haemonchus contortus* при говеда и овце, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum* и *Bunostomum phlebotomum* при говеда.

6. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За подкожно приложение.

Говеда и овце: 10 mg/kg телесна маса еквивалентно на 1 ml ветеринарен лекарствен продукт на 35 kg телесна маса. Дозата може да бъде увеличена до 1.25 ml на 35 kg телесна маса в случаи на остра фасциолоза (незрели форми).

За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

При овце се препоръчва използването на подходящо градуирани спринцовки, за прецизно определяне на дозата.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда и овце:

Месо и вътрешни органи: 60 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора, включително през сухостойния период.

Не се разрешава за употреба през последния триместър от бременността при юници, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Да не се използва по-малко от 1 година преди първото агнене при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След пробиване, използвай в рамките на 30 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Кepro B.V.

14. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2157

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

ФЛАКОНИ ОТ 50 ml, 100 ml И 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Fascionix 34% Inj. – 340 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Nitroxinil 340.00 mg/ml (като N-ethylglucamine salt)

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда и овце.

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочетете листовката.

За подкожно приложение.

Говеда и овце: 10 mg/kg телесна маса еквивалентно на 1 ml ветеринарен лекарствен продукт на 35 kg телесна маса. Дозата може да бъде увеличена до 1.25 ml на 35 kg телесна маса в случаи на остра фасциолиза (незрели форми).

За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

При овце се препоръчва използването на подходящо градуирани спринцовки, за прецизно определяне на дозата.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда и овце:

Месо и вътрешни органи: 60 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора, включително през сухостойния период.

Не се разрешава за употреба през последния триместър от бременността при юници, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Да не се използва по-малко от 1 година преди първото агнене при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След пробиване използвай в рамките на 30 дни.

След пробиване използвай до.....

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ
--

Кepro B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП