

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cepralock, 2,6 g, intramaminė suspensija užtrūkusioms karvėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename 4 g intramaminiam švirkšte yra:

veikliosios medžiagos:

bismuto subnitrato 2,6 g.
(atitinka 1,9 g bismuto)

Pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Skystasis parafinas
Aliuminio stearatas
Koloidinis silicio dioksidas, bevandenis

Baltos arba gelsvos spalvos vienalytė suspensija.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu).

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Apsaugoti nuo naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu.

Karvėms, kurios galimai neserga subklinikiniu mastitu, veterinarinį vaistą galima naudoti vieną užtrūkusių karvių priežiūrai ir mastito kontrolei.

3.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti veterinarinio vaisto vieno karvėms, sergančioms subklinikiniu mastitu užtrūkinimo metu.

Negalima naudoti karvėms, sergančioms klinikiniu mastitu užtrūkinimo metu.

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu. Žr. 3.7 p.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

3.4. Specialieji įspėjimai

Karvių atranka gydymui šiuo veterinariniu vaistu turi būti atliekama atsižvelgiant į veterinarinį klinikinį įvertinimą. Atrankos kriterijai gali būti pagrįsti atskirų karvių sergamumo mastitu ir somatinių ląstelių kiekio istorija arba pripažintais tyrimais subklinikiniam mastitui nustatyti, arba bakteriologiniais tyrimais.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Pagal gerąją praktiką užtrūkusias karves reikia reguliariai stebėti, ar nėra klinikinio mastito požymių. Jei kamščiu užkimštame tešmens ketvirtyje išsivysto klinikinis mastitas, prieš pradedant tinkamą gydymą, pažeistą ketvirtį reikia išmelžti rankomis.

Norint sumažinti užteršimo riziką, švirkšto negalima merkti į vandenį.

Švirkštą reikia naudoti tik vieną kartą.

Naudojant veterinarinį vaistą, svarbu laikytis griežtų aseptikos reikalavimų, nes veterinarinis vaistas neturi antimikrobinio aktyvumo.

Po veterinarinio vaisto naudojimo negalima naudoti jokių kitų intramaminių vaistų.

Karvėms, kurios gali sirgti subklinikiniu mastitu, šį veterinarinį vaistą galima naudoti po užtrūkusios karvės infekuoto tešmens ketvirčio tinkamo gydymo antibiotikais.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Šis veterinarinis vaistas gali dirginti odą ir akis. Reikia vengti sąlyčio su oda ar akimis.

Patekus ant odos ar į akis, paveiktą vietą reikia kruopščiai nuplauti vandeniu.

Bismuto druskos siejamos su padidėjusio jautrumo reakcijomis. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bismuto druskoms, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Jeigu po sąlyčio su veterinariniu vaistu pasireiškia simptomai, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Po naudojimo būtina plauti rankas.

Dezinfekcinės servetėlės

Dezinfekcinės servetėlės gali sudirginti odą ir akis dėl jose esančio izopropilo alkoholio. Vengti sąlyčio su akimis. Vengti ilgalaikio sąlyčio su oda. Vengti garų įkvėpimo.

Mūvint pirštines, galima išvengti odos dirginimo.

Po naudojimo būtina plauti rankas.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujamos reakcijos

Nežinomos.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas

Kadangi sušvirkštas į tešmenį veterinarinis vaistas neabsorbuojamas, jį galima naudoti veršingoms karvėms. Karvei apsiveršiavus, veršelis gali praryti kamštį. Veterinarinio vaisto prarijimas veršeliui yra saugus ir nesukelia nepageidaujamo poveikio.

Laktacija

Veterinarinis vaistas skirtas naudoti užtrūkusioms karvėms. Atsitiktinai panaudojus karvei laktacijos metu, gali būti pastebimas laikinas nedidelis (iki 2 kartų) somatinių ląstelių kiekio padidėjimas. Tokiu atveju kamštį reikia išmelžti rankomis, jokios papildomos atsargumo priemonės nebūtinos.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad lyginant spenio kamščio sudėtį, kurioje yra bismuto subnitrato, veterinarinį vaistą galima derinti tik su užtrūkusioms karvėms skirtais vaistais, kurių sudėtyje yra kloksacilino.

Taip pat žiūrėkite 3.5 p.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas


Naudoti į tešmenį.

Veterinarinis vaistas turi dvejopą antgalį. Švirkšto dangtelis gali būti dalinai arba visiškai nuimtas. Rekomenduojama prispausti spenį prie spenio pagrindo, nes tai padeda nukreipti pastą į spenio cisterną, užsandarinant spenio kanalą nuo viršaus.


Trumpojo antgalio pasirinkimas: trumpojo antgalio pasirinkimas suteikia dalinio švirkšto įkišimo galimybę, todėl jį reikia įkišti tik į spenio galiuką.

Ilgąjo antgalio pasirinkimas: ilgojo antgalio pasirinkimas gali būti naudojamas gydymo patogumui, pvz., apsaugo antgalį nuo išstūmimo dėl karvės judėjimo ar nervingumo.

1 žingsnis: Nulaužiamo dangtelio nuėmimas



2 žingsnis: Ilgojo arba trumpojo antgalio įkišimas



Vieno švirkšto turinį su veterinariniu vaistu sušvirkšti į kiekvieną tešmens ketvirtį nedelsiant po paskutinio laktacijos periodo melžimo (užtrūkimo metu). Sušvirkštus veterinarinį vaistą, negalima masažuoti spenio ar tešmens, nes svarbu, kad sandariklis liktų pačiame spenyje ir nepatektų į tešmenį.

Norint sumažinti mastito atsiradimo po veterinarinio vaisto sušvirkštimo riziką, švirkšti reikia apdairiai, kad į spenį nepatektų patogeninių mikroorganizmų.

Svarbu, kad spenys būtų kruopščiai nuvalytas su pridėtomis alkoholiu įmirkytomis dezinfekcinėmis servetėlėmis. Spenius reikia valyti tol, kol ant servetėlių nelieta jokių matomo purvo pėdsakų. Prieš švirkščiant veterinarinį vaistą, speniams reikia leisti išdžiūti. Veterinarinį vaistą reikia sušvirkšti laikantis aseptikos reikalavimų ir stengtis neužteršti švirkšto galiuko. Sušvirkštus patartina naudoti tinkamą spenių mirkalą ar purškalą.

Esant šaltoms sąlygoms veterinarinį vaistą galima sušildyti iki kambario temperatūros šiltoje aplinkoje, kad būtų lengviau švirkšti.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Karvėms naudojus dvigubai didesnę nei rekomenduojama veterinarinio vaisto dozę, jokie nepageidaujami klinikiniai poveikiai nepasireiškė.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinį ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

Skerdienai ir subproduktams – 0 parų.
Pienui – 0 val.

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas: QG52X.

4.2. Farmakodinamika

Sušvirkštus veterinarinį vaistą į kiekvieną tešmens ketvirtį, susidaro fizinis barjeras, trukdantis prasiskverbti bakterijoms ir sumažinantis naujų intramaminių infekcijų atsiradimą užtrūkimo metu. Veterinarinis vaistas yra sterilus ir neturi antimikrobinio poveikio.

4.3. Farmakokinetika

Bismuto subnitratas iš pieno liaukų neabsorbuojamas, tačiau išlieka kaip kamštis spenyje, kol nepašalinamas fiziškai (įrodyta su karvėmis, kurių užtrūkimo laikotarpis buvo iki 100 dienų).

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Netaikytina.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Vienadozis LDPE intramaminis švirkštas, uždengtas nulaužiamu LDPE dangteliu, kuriame yra 4 g suspensijos.

Pakuočių dydžiai

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 24 švirkštai ir alkoholiu įmirkytos dezinfekcinės servetėlės.

Plastikinis kibirėlis, kuriame yra 144 švirkštai ir alkoholiu įmirkytos dezinfekcinės servetėlės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Intervet International B.V.

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/21/2647/001-002

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2021-02-18.

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2024-12-17

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ ARBA KIBIRĖLIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cepralock, 2,6 g, intramaminė suspensija

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekviename 4 g intramaminiam švirkšte yra 2,6 g bismuto subnitrato.

3. PAKUOTĖS DYDIS

24 švirkštai (supakuoti dėžutėse)

144 švirkštai (supakuoti kibirėlyje)

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu).

5. INDIKACIJA (-OS)

6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti į tešmenį.

Veterinarinis vaistas turi dvejopą antgalį. Švirkšto antgalis gali būti dalinai arba visiškai nuimtas. Trumpojo antgalio pasirinkimas suteikia dalinio švirkšto įkišimo galimybę, todėl jį reikia įkišti tik į spenio galiuką.

7. IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 0 parų;

pienui – 0 val.

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“
--

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“
--

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Intervet International B.V.

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/21/2647/001

LT/2/21/2647/002

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ ŠVIRKŠTAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
--

Cepalock

2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA
--

bismuto subnitratas: 2,6 g

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Cepralock, 2,6 g, intramaminė suspensija užtrūkusioms karvėms

2. Sudėtis

Kiekviename 4 g intramaminiam švirkšte yra:

veikliosios medžiagos:

bismuto subnitrato 2,6 g.
(atitinka 1,9 g bismuto)

Baltos arba gelsvos spalvos vienalytė suspensija.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu).

4. Naudojimo indikacijos

Apsaugoti nuo naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu.

Karvėms, kurios galimai neserga subklinikiu mastitu, veterinarinį vaistą galima naudoti vieną užtrūkusių karvių priežiūrai ir mastito kontrolei.

5. Kontraindikacijos

Negalima naudoti veterinarinio vaisto vieno karvėms, sergančioms subklinikiu mastitu užtrūkinimo metu.

Negalima naudoti karvėms, sergančioms klinikiu mastitu užtrūkinimo metu.

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu. Žr. „Specialieji įspėjimai“.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Karvių atranka gydymui šiuo veterinariniu vaistu turi būti atliekama atsižvelgiant į veterinarinį klinikinį įvertinimą. Atrankos kriterijai gali būti pagrįsti atskirų karvių sergamumo mastitu ir somatinių ląstelių kiekio istorija arba pripažintais tyrimais subklinikiniam mastitui nustatyti, arba bakteriologiniais tyrimais.

Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams
Pagal gerąją praktiką užtrūkusias karves reikia reguliariai stebėti, ar nėra klinikinio mastito požymių. Jei kamščiu užkimštame tešmens ketvirtyje išsivysto klinikinis mastitas, prieš pradedant tinkamą gydymą, pažeistą ketvirtį reikia išmelžti rankomis.
Norint sumažinti užteršimo riziką, švirkšto negalima merkti į vandenį.
Švirkštą reikia naudoti tik vieną kartą.

Naudojant veterinarinį vaistą, svarbu laikytis griežtų aseptikos reikalavimų, nes veterinarinis vaistas neturi antimikrobinio aktyvumo.

Po veterinarinio vaisto naudojimo negalima naudoti jokių kitų intramaminių vaistų.

Karvėms, kurios gali sirgti subklinikinio mastitu, šį veterinarinį vaistą galima naudoti po užtrūkusios karvės infekuoto tešmens ketvirčio tinkamo gydymo antibiotikais.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Šis veterinarinis vaistas gali dirginti odą ir akis.

Reikia vengti sąlyčio su oda ar akimis.

Patekus ant odos ar į akis, paveiktą vietą reikia kruopščiai nuplauti vandeniu.

Bismuto druskos siejamos su padidėjusio jautrumo reakcijomis. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bismuto druskoms, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Jeigu po sąlyčio su veterinariniu vaistu pasireiškia simptomai, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Po naudojimo būtina plauti rankas.

Dezinfekcinės servetėlės

Dezinfekcinės servetėlės gali sudirginti odą ir akis dėl jose esančio izopropilo alkoholio.

Vengti sąlyčio su akimis. Vengti ilgalaikio sąlyčio su oda. Vengti garų įkvėpimo.

Mūvint pirštines, galima išvengti odos dirginimo.

Po naudojimo būtina plauti rankas.

Vaikingumas

Kadangi sušvirkštas į tešmenį veterinarinis vaistas neabsorbuojamas, jį galima naudoti veršingoms karvėms. Karvei apsiveršiavus, veršelis gali praryti kamštį. Veterinarinio vaisto prarijimas veršeliui yra saugus ir nesukelia nepalankaus poveikio.

Laktacija

Veterinarinis vaistas skirtas naudoti užtrūkusioms karvėms. Atsitiktinai panaudojus karvei laktacijos metu, gali būti pastebimas laikinas nedidelis (iki 2 kartų) somatinių ląstelių kiekio padidėjimas. Tokiu atveju kamštį reikia išmelžti rankomis, jokios papildomos atsargumo priemonės nebūtinės.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad lyginant spenio kamščio sudėtį, kurioje yra bismuto subnitrato, veterinarinį vaistą galima derinti tik su užtrūkusioms karvėms skirtais vaistais, kurių sudėtyje yra kloksacilino.

Perdozavimas

Karvėms naudojant dvigubai didesnę nei rekomenduojama veterinarinio vaisto dozę, jokie nepageidaujami klinikiniai poveikiai nepasireiškė.

7. Nepageidaujamos reakcijos

Nežinoma.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą.

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Naudoti į tešmenį.

Vieno švirkšto turinį su veterinariniu vaistu sušvirkšti į kiekvieną tešmens ketvirtį nedelsiant po paskutinio laktacijos periodo melžimo (užtrūkinimo metu).

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Veterinarinio vaisto negalima naudoti, jei pastebėsite pažeistus dangtelius ar kitus matomus gedimo požymius.

Veterinarinis vaistas turi dvejopą antgalį. Švirkšto dangtelis gali būti dalinai arba visiškai nuimtas. Rekomenduojama prispausti spenį prie spenio pagrindo, nes tai padeda nukreipti pastą į spenio cisterną, užsandarinant spenio kanalą nuo viršaus.


Trumpojo antgalio pasirinkimas: trumpojo antgalio pasirinkimas suteikia dalinio švirkšto įkišimo galimybę, todėl jį reikia įkišti tik į spenio galiuką.

Ilgąjo antgalio pasirinkimas: ilgąjo antgalio pasirinkimas gali būti naudojamas gydymo patogumui, pvz., apsaugo antgalį nuo išstūmimo dėl karvės judėjimo ar nervingumo.

1 žingsnis: Nulaužiamo dangtelio nuėmimas



2 žingsnis: Ilgojo arba trumpojo antgalio įkišimas



Sušvirkštus veterinarinį vaistą, negalima masažuoti spenių ar tešmens, nes svarbu, kad sandariklis liktų pačiame spenyje ir nepatektų į tešmenį.

Norint sumažinti mastito atsiradimo po veterinarinio vaisto sušvirkštimo, riziką, švirkšti reikia apdairiai, kad į spenį nepatektų patogeninių mikroorganizmų.

Svarbu, kad spenys būtų kruopščiai nuvalytas su pridėtomis alkoholiu įmirkytomis dezinfekcinėmis servetėlėmis. Spenius reikia valyti tol, kol ant servetėlių nelieta jokių matomo purvo pėdsakų. Prieš švirkščiant veterinarinį vaistą, speniams reikia leisti išdžiūti. Veterinarinį vaistą reikia sušvirkšti laikantis aseptikos reikalavimų ir stengtis neužteršti švirkšto galiuko. Sušvirkštus patartina naudoti tinkamą spenių mirkalą ar purškalą.

Esant šaltoms sąlygoms veterinarinį vaistą galima sušildyti iki kambario temperatūros šiltoje aplinkoje, kad būtų lengviau švirkšti.

10. Išlauka

Skerdienai ir subproduktams – 0 parų.

Pienui – 0 val.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po Exp. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/21/2647/001-002

Pakuočių dydžiai

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 24 švirkštai ir alkoholiu įmirkytos dezinfekcinės servetėlės.

Plastikinis kibirelis, kuriame yra 144 švirkštai ir alkoholiu įmirkytos dezinfekcinės servetėlės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2024-12-17

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nyderlandai

Tel: + 37052196111

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

85716 Unterschleissheim

Vokietija