

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/02/1434

Ruvax suspensija injekcijām cūkām, aitām un tītariem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Boehriner Ingelheim Animal Health France SCS
29 avenue Tony Garnier,
69007 LYON,
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Boehriner Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire de Porte des Alpes,
99 rue de l'Aviation,
69800 Saint Priest,
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ruvax suspensija injekcijai cūkām, aitām un tītariem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena vakcīnas deva (2 ml) satur:

Aktīvās vielas:

Erysipelothrix rhusiopathiae (lizētas baktēriju šūnas), serotips 2 ≥ 1 ELISA U*

* ELISA U: imūnfermentatīvās analīzes (ELISA) vienību daudzums, lai panāktu dzīvniekam serokonversijas indeksu (ar ELISA) saskaņā ar Ph. Eur.

Pienbalta suspensija pēc saskalināšanas.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Vakcīna sarkanguļas profilaksei cūku, aitu un tītaru aktīvai imunizācijai pret *Erysipelothrix rhusiopathiae* infekciju.

Imunitātes iestāšanās: 3 nedēļas pēc primārās vakcinācijas.

Imunitātes ilgums: 11 mēnešus pēc revakcinācijas.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Vakcīna var izraisīt mezgliņa veidošanos injekcijas vietā pēc subkutānas injekcijas.

Vakcinācija reizēm var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas dažiem dzīvniekiem, īpaši tiem, kas jau ir inficēti ar *Erysipelothrix rhusiopathiae*. Tādos gadījumos nekavējoties jāuzsāk atbilstoša ārstēšana.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Cūkas, aitas, tītari.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Cūkām:

Dziļai intramuskulārai injekcijai kakla muskuļos vai iespējama subkutānai injekcijai.

Injicēt vienu 2 ml devu saskaņā ar sekojošu shēmu:

Plānotiem vaislas dzīvniekiem (jauncūkas un kuilīši) un vaislas dzīvniekiem:

- Primārā vakcinācija:
Divas injekcijas ar 3 līdz 4 nedēļu intervālu pirms pirmās pārošanas.
- Revakcinācija:
Reizi pusgadā.

-Sivēnmātēm: katras laktācijas beigās vai grūsnības pēdējā mēnesī.

-Kuilīem: ne ātrāk kā 3 nedēļas pirms pārošanas.

Nobarojamās cūkas:

Divas injekcijas ar 3 līdz 4 nedēļu intervālu no 10 nedēļu vecuma.

Grūsnām aitām:

Subkutānai lietošanai.

Injicēt vienu 2 ml devu saskaņā ar sekojošu shēmu:

- Primārā vakcinācija:
Divas injekcijas ar 3 līdz 4 nedēļu intervālu.
- Revakcinācija:
Viena injekcija grūsnības pēdējā trešdaļā.

Tītariem:

Subkutānai lietošanai.

Injicēt vienu 0,5 ml devu saskaņā ar sekojošu shēmu:

- Primārā vakcinācija:
Viena injekcija no 8 nedēļu vecuma.
- Revakcinācija:
Pirms dēšanas sākuma.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Saskalināt pirms lietošanas.

Ievērot aseptiku.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Lietot parastās dzīvnieku fiksācijas metodes.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Dēšanas periods:

Drīkst lietot dēšanas perioda laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par zāļu nekaitīgumu un efektivitāti, ja vakcīnu lieto kopā ar kādu citu vakcīnu. Tāpēc iesaka nelietot citas vakcīnas vismaz 14 dienas pirms vai pēc vakcinācijas ar šo vakcīnu.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Netika novērotas blakusparādības pēc dubultas vakcīnas devas ievadīšanas.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citu vakcīnu vai imunoloģiskām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Viens 10 ml (stikla) flakons kartona kastītē.
Viens 20 ml (stikla) flakons kartona kastītē.
Viens 50 ml (stikla) flakons kartona kastītē.
Viens 250 ml (polipropilēna) flakons kartona kastītē.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti