

## **I PRIEDAS**

### **VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS**

## **VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

TAbic V.H., šnypščiosios tabletės

## **2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS**

Vienoje vakcinos dozėje yra:

### **veikliosios medžiagos:**

lentogeninių V.H. padermės Niukaslo virusų  $\geq 10^{6,0}$  EID<sub>50</sub> .

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1p.

## **3. VAISTO FORMA**

Šnypščiosios tabletės, naudojamos su vandeniu.

## **4. KLINIKINIAI DUOMENYS**

### **4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)**

Vištos (broileriai, tėviniai pulkai, dedeklės) ir kalakutai.

### **4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis**

Broileriams, tėviniams pulkams, dedeklėms ir kalakutams vakcinuoti nuo Niukaslo ligos.

### **4.3. Kontraindikacijos**

Nėra.

### **4.4. Specialieji išpėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams**

Nėra.

### **4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės**

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

1. Vakcinuoti galima tik sveikus paukščius, kurie neveikiami streso, pvz., perpildymas, perkaitimas, atšalimas, nepakankamas šėrimas ir t.t.
2. Gyvos vakcinos yra jautrios orui, saulės šviesai, karščiui, dezinfekantams ir detergentams, todėl jas reikia saugoti nuo to.
3. Būtina teisingai dozuoti (negalima sugirdyti mažiau, geriau perdozuoti, nes vakcina nežalinga).
4. Negalima naudoti tablečių, kurios yra lizdinės plokštelės pažeistose sekcijose.
5. Negalima kaitinti vandens, kuriame yra atskiesta vakcina.

## Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonėms vakcina gali sukelti nesunkų konjunktyvitą, kuris gali trukti 2-3 d. Dirbant su vakcina, būtina vengti, kad nepatektų tiesiai į akis. Jei vakcina purškiama, operatorius privalo dėvėti apsauginius akinius ir kaukę.

### **4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)**

Nepastebėta.

### **4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu**

Netaikytina.

### **4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos**

Norint išvengti bet kokios sąveikos, būtina nutraukti geriamojo vandens apdorojimą ir dezinfekciją 24 val. iki vakcinacijos (kai vakcina suduodama su vandeniu).

### **4.9. Dozės ir nauojimo būdas**

Norint gauti gerus rezultatus ir užtikrinti pilną paukščių apsaugą per visą jų augimo periodą iki pat skerdimo (7-8 sav.) bei tėvinius pulkus ir dedekles kiaušinių dėjimo metu, rekomenduotina vakcinuoti viščiukus du kartus, 1-mą ir 17-tą amžiaus dieną.

Šią vakciną galima suduoti su geriamu vandeniu, sulašinti į akį arba išpurkšti stambiais lašais ar aerozoliu.

Norint paruošti suspensiją vakcinacijai, reikia išimti tabletę iš lizdinės plokštelės ir įdėti į šaltą virintą vandenį. Būtina įsitikinti, kad tabletė visiškai išsisklaidė, palaukiti 1-2 min. Po to lėtai išmaišyti, kad būtų užtikrintas vakcinės homogeniškumas.

Rekomenduotini skiedimo tūriai (ml):

| Dozių skaičius | Purškimas<br>stambiais lašais* | Aerozolis * | Lašinimas į akį** |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 100            |                                |             |                   |
| 500            |                                |             |                   |
| 1000           | 50-300                         | 100-150     | 30-50             |
| 2000           | 100-600                        | 200-300     | 60-100            |
| 2500           | 125-750                        | 250-375     | 75-125            |
| 5000           | 250-1500                       | 500-750     | 150-250           |
| 10000          | 500-3000                       | 1000-1500   | 300-500           |

\* Tikslus vandens kiekis priklauso nuo naudojamo aparato išėigos: purškimas stambiais lašais ar smulkiais lašais.

\*\* Tikslus vandens kiekis priklauso nuo lašintuvo tipo.

### **Vakcinavimas su geriamu vandeniu**

Suduodant vaciną su geriamu vandeniu, rekomenduotina reikiamą skaičių tablečių ištirpinti 1/5 vandens, kurį paprastai paukščiai išgeria per dieną (tikslus vandens kiekis priklauso nuo paukščių rūšies, amžiaus ir oro sąlygų). Norint neutralizuoti chlorą geriamajame vandenyje, reikia naudoti komercinį chloro neutralizatorių pagal instrukciją arba įpilti 50 ml nugriebto pieno arba 5 g nugriebto pieno miltelių į 1 litrą vandens. Įpylus nugriebto pieno, reikia palaukti 5 min ir tik tada dėti vakcinės tabletes.

PASTABOS:

1. Rekomenduotina paukščius vakcinuoti ryte, naudojant šaltą vandenį.
2. Būtinai užtikrinti, kad užtektų girdyklų ir visi paukščiai gautų vandens tuo pačiu metu ir išgertų vandenį su vakcina per 2-3 val.
3. Vanduo ir girdyklos turi būti švarios, juose neturi būti dezinfekantų likučių.
4. 2 val. iki vakcinacijos reikia nutraukti vandens tiekimą.
5. Negalima pradėti tiekti vandens paukščiams, kol visa vakcina nesuvartota.

### **Vakcinavimas lašinant į akį**

Tabletės turi būti skiestos vėsiam virintame vandenyje santykiu: 1 tabletė (1000 dozių) skiedžiama 30-50 ml vandens (tikslus vandens kiekis priklauso nuo lašintuvo tipo).

Vakcina prieš vakcinaciją turi būti gerai išmaišyta. Lašintuvu reikia įlašinti paukščiui 1 lašą į akį.

### **Vakcinavimas purškiant stambiais lašais ir aerozoliu**

**Purškimas stambiais lašais.** Purkštuvus, kuriuos dažniausiai naudoja daržininkystėje, galima naudoti purkšti vienadienius viščiukus, ką tik iš inkubatoriaus ar bruderio. Vyresniems paukščiams reikia naudoti elektrinius purkštuvus arba ant nugaros nešiojamus purkštuvus, kurie purškia vienodžiau; lašai neturi būti mažesni nei 100µ.

Kiekvienas naudojamas purkštuvas turi būti patikrintas, per kiek laiko išpurškia rekomenduotiną vandens kiekį.

**Aerozolis.** Šis metodas nerekomenduotinas paukščiams iki 2 sav. amžiaus; šis būdas taikytinas tik antrai vakcinacijai.

Elektriniu ar ant nugaros nešiojamu purkštuvu išpurškiami lašai turi būti 40-100µ dydžio.

PASTABOS:

1. Prietaiso, naudojamo stambiams lašams arba aerozoliui, efektyvumas turi būti patikrintas prieš vakcinaciją.
2. Purkštuvai ir aerosolinės sistemos turi būti nukreiptos virš paukščių 60-70 cm atstumu.
3. Lašeliai turi kristi lėtai; todėl ventiliatorius reikia išjungti 20-30 min.
4. Prieš purškimą paukštidėse reikia sumažinti apšvietimą ir užtikrinti ramybę vakcinacijos metu ir po jos.

### **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei reikia**

Nustatyta, kad vakcina buvo saugi vienadieniams SPF viščiukams, įlašinus 0,05 ml į akį (atitinka 10 dozių).

### **4.11. Išlauka**

0 parų.

## **5. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS**

Farmakoterapinė grupė: gyvos virusinės vakcinės paukščiams.

ATC vet kodas: QI01AD, QI01AC.

TAbic V.H. yra gyva vakcina nuo Niukaslo ligos, kurios sudėtyje yra lentogeninės V.H. padermės virusų (ICPI (intracerebrinis patogeniškumo indeksas) - 0,15). V.H padermės virusai yra tiek pat patogeniški kaip La Sota padermės, bet yra švelnesni kaip Hitchner B1 padermės virusai. Virusai kultivuojami apvaisintuose kiaušiniuose iš SPF pulkų. Po pirmos vakcinacijos imunitetas pasireiškia praėjus 5., bet pilnas imunitetas susidaro praėjus 2 sav. po vakcinacijos ir trunka 2 mėn.

## **6. FARMACINIAI DUOMENYS**

### **6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas**

Natrio bikarbonatas,  
bevandenė citrinų rūgštis,  
magnio stearatas.

## **6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai**

Nežinoma.

## **6.3. Tinkamumo laikas**

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus pirminės pakuotės, – 2 metai.  
Išimtos iš lizdinės plokštelės tabletės turi būti sunaudotos nedelsiant.  
Vakcina turi būti sunaudota nedelsiant, atskiedus pagal nurodymus.

## **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Laikyti šaldytuve (2 – 8 °C ). Saugoti nuo šviesos.

## **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Aliumininės lizdinės plokštelės po 5 ar 10 tablečių, kuriose yra po 100, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 ar 10 000 dozių, kartoninėse dėžutėse.  
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

## **6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **7. REGISTRUOTOJAS**

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 28  
00-839 Warszawa  
Lenkija

## **8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/08/1827/001-014

## **9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA**

Registravimo data 2008-12-29  
Perregistravimo data 2013-12-18

## **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

2022-10-03

**DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI**

Nėra.

## **II PRIEDAS**

- A. <BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) GAMINTOJAS (-AI) IR>  
GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ**
- B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO**
- C. DUOMENYS APIE DLK**
- <D. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI>**

**A. <BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS (-IŲ) MEŽIAGOS (-Ų) GAMINTOJAS (-AI) IR>  
GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ**

<Biologiškai veiklios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojo (-ų) pavadinimas ir adresas

ABIC Biological Laboratories Ltd.  
P.O.Box 489, West Industrial Zone, Beit-Shemesh 99100  
IZRAELIS  
Tel.: +972 2 9906916, Faksas: +972 2 9906917, El.paštas: [www.abic-vet.com](http://www.abic-vet.com)

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą pavadinimas ir adresas

ABIC POLSKA Sp. z o.o.  
63-100 Śrem, ul. Szkolna 17  
Lenkija  
Tel .: +48 61 28 30 773  
Faksas: +48 61 28 30 170  
El.paštas: [office@abicpolska.pl](mailto:office@abicpolska.pl)

**B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO**

Parduodama tik veterinarijos gydytoui.

**C. DUOMENYS APIE DLK**

Netaikytina.

**D. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI**

Netaikytina.

**REGISTRACIJOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR EFEKTYVAUS  
NAUDOJIMO**

Netaikytina

**SPECIFINIAI REGISTRUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI**

Specifinių įsipareigojimų nėra.

### **III PRIEDAS**

#### **ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS**

## **A. ŽENKLINIMAS**

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**  
**KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

TAbic V.H., šnypščiosios tabletės

**2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)**

Vienoje dozėje yra: lentogeninių V.H. padermės Niukaslo ligos virusų  $\geq 10^{6,0}$  EID<sub>50</sub>.

**3. VAISTO FORMA**

Šnypščiosios tabletės.

**4. PAKUOTĖS DYDIS**

5 tabletės po 100 dozių.  
10 tablečių po 100 dozių.  
5 tabletės po 500 dozių.  
10 tablečių po 500 dozių.  
5 tabletės po 1000 dozių.  
10 tablečių po 1000 dozių.  
5 tabletės po 2000 dozių.  
10 tablečių po 2000 dozių.  
5 tabletės po 2500 dozių.  
10 tablečių po 2500 dozių.  
5 tabletės po 5000 dozių.  
10 tablečių po 5000 dozių.  
5 tabletės po 10 000 dozių.  
10 tablečių po 10 000 dozių.

**5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)**

Vištos (broileriai, tėviniai pulkai, dedeklės) ir kalakutai.

**6. INDIKACIJA (-OS)**

Prieš naudojant, būtina perskaityti informacinį lapelį.

**7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS**

Prieš naudojant, būtina perskaityti informacinį lapelį.

**8. IŠLAUKA**

0 dienų.

**9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA**

Prieš naudojant, būtina perskaityti informacinį lapelį.

**10. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki: {mėnuo/metai}

**11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

Laikyti šaldytuve ( 2 - 8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ  
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA “TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI” IR TEIKIMO BEI  
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

**14. NUORODA “SAUGOTI NUO VAIKŲ”**

Saugoti nuo vaikų.

**15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

Lenkija

**16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/08/1827/001

LT/2/08/1827/002

LT/2/08/1827/003

LT/2/08/1827/004

LT/2/08/1827/005

LT/2/08/1827/006

LT/2/08/1827/007

LT/2/08/1827/008

LT/2/08/1827/009

LT/2/08/1827/010

LT/2/08/1827/011

LT/2/08/1827/012

LT/2/08/1827/013

LT/2/08/1827/014

**17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Serijos numeris:

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ  
ALUMININĖS LIZDINĖS PLOKŠTELĖS**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Tabic V.H., šnypščiosios tabletės

**2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS**

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.

**3. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki: {mėnuo/metai}

**4. SERIJOS NUMERIS**

Serija: {numeris}

**5. NUORODA “TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI”**

Tik veterinariniam naudojimui.

## **B. INFORMACINIS LAPELIS**

**INFORMACINIS LAPELIS**  
TABic V.H., šnypščiosios tabletės

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 28  
00-839 Warszawa  
Lenkija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

ABIC POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Szkolna 17  
63-100 Śrem  
Lenkija

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

TABic V.H., šnypščiosios tabletės

**3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS**

Vienoje vakcinos dozėje yra:

**veikliosios medžiagos:**

lentogeninių V.H. padermės Niukaslo ligos virusų  $\geq 10^{6,0} \text{ EID}_{50}$ .

**4. INDIKACIJA (-OS)**

Broileriams, tėviniams pulkams, dedeklėms ir kalakutams vakcinuoti nuo Niukaslo ligos.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Nėra.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Nepastebėta.

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

**7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)**

Vištos (broileriai, tėviniai pulkai, dedeklės) ir kalakutai.

## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Norint gauti gerus rezultatus ir užtikrinti pilną paukščių apsaugą per visą jų augimo periodą iki pat skerdimo (7-8 savaites) bei tėvinius pulkus ir dedekles kiaušinių dėjimo metu, rekomenduotina vakcinuoti viščiukus du kartus, 1-mą ir 17-tą amžiaus dieną.

Šią vakciną galima suduoti su geriamu vandeniu, sulašinti į akį arba išpurkšti stambiais lašais ar aerozoliu.

Norint paruošti suspensiją vakcinacijai, reikia išimti tabletę iš lizduotės ir įdėti į šaltą virintą vandenį. Būtina įsitikinti, kad tabletė visiškai išsisklaidė, palaukti 1-2 min. Po to lėtai išmaišyti, kad būtų užtikrintas vakcinės homogeniškumas.

Rekomenduotini skiedimo tūriai (ml):

| Dozių skaičius | Purškimas<br>stambiais lašais* | Aerozolis * | Lašinimas į akį** |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 100            |                                |             |                   |
| 500            |                                |             |                   |
| 1000           | 50-300                         | 100-150     | 30-50             |
| 2000           | 100-600                        | 200-300     | 60-100            |
| 2500           | 125-750                        | 250-375     | 75-125            |
| 5000           | 250-1500                       | 500-750     | 150-250           |
| 10000          | 500-3000                       | 1000-1500   | 300-500           |

\* Tikslus vandens kiekis priklauso nuo naudojamo aparato išėigos: purškimas stambiais lašais ar smulkiais lašais.

\*\* Tikslus vandens kiekis priklauso nuo lašintuvo tipo.

### Vakcinavimas su geriamu vandeniu

Suduodant vakciną su geriamu vandeniu, rekomenduotina reikiamą skaičių tablečių ištirpinti 1/5 vandens, kurį paprastai paukščiai išgeria per dieną (tikslus vandens kiekis priklauso nuo paukščių rūšies, amžiaus ir oro sąlygų). Norint neutralizuoti chlorą geriamajame vandenyje, reikia naudoti komercinį chloro neutralizatorių pagal instrukciją arba įpilti 50 ml nugriebto pieno arba 5 g nugriebto pieno miltelių į 1 litrą vandens. Įpylus nugriebto pieno, reikia palaukti 5 min ir tik tada dėti vakcinės tabletes.

#### PASTABOS:

6. Rekomenduotina paukščius vakcinuoti ryte, naudojant šaltą vandenį.
7. Būtinai užtikrinti, kad užtektų girdyklų ir visi paukščiai gautų vandens tuo pačiu metu ir išgertų vandenį su vakcina per 2-3 val.
8. Vanduo ir girdyklos turi būti švarios, juose neturi būti dezinfekantų likučių.
9. 2 val. iki vakcinacijos reikia nutraukti vandens tiekimą.
10. Negalima pradėti tiekti vandens paukščiams, kol visa vakcina nesuvartota.

### Vakcinavimas lašinant į akį

Tabletės turi būti skiestos vėsiam virintame vandenyje santykiu: 1 tabletė (1000 dozių) skiedžiama 30-50 ml vandens (tikslus vandens kiekis priklauso nuo lašintuvo tipo).

Vakcina prieš vakcinaciją turi būti gerai išmaišyta. Lašintuvu reikia įlašinti paukščiui 1 lašą į akį.

### Vakcinavimas purškiant stambiais lašais ir aerozoliu

**Purškimas stambiais lašais.** Purkštuvus, kuriuos dažniausiai naudoja daržininkystėje, galima naudoti purkšti vienadienius viščiukus, ką tik iš inkubatoriaus ar bruderio. Vyresniems paukščiams reikia naudoti elektrinius purkštuvus arba ant nugaros nešiojamus purkštuvus, kurie purškia vienodžiau; lašai neturi būti mažesni nei 100µ.

Kiekvienas naudojamas purkštuvus turi būti patikrintas, per kiek laiko išpurškia rekomenduotiną vandens kiekį.

**Aerolis:** Šis metodas nerekomenduotinas paukščiams iki 2 sav. amžiaus; šis būdas taikytinas tik antrai vakcinacijai.

Elektriniu ar ant nugaros nešiojamu purkštuvu išpurškiami lašai turi būti 40-100µ dydžio.

**PASTABOS:**

5. Prietaiso, naudojamo stambiems lašams arba aeroliui sudaryti, efektyvumas turi būti patikrintas prieš vakcinaciją.
6. Purkštuvai ir aerolinės sistemos turi būti nukreiptos virš paukščių 60-70 cm atstumu.
7. Lašeliai turi kristi lėtai; todėl ventiliatorius reikia išjungti 20-30 min.
8. Prieš purškimą paukštidėse reikia sumažinti apšvietimą ir užtikrinti ramybę vakcinacijos metu ir po jos.

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

1. Vakcinuoti galima tik sveikus paukščius, kurie neveikiami streso, pvz., perpildymas, perkaitimas, atšalimas, nepakankamas ir t.t.
2. Būtina teisingai dozuoti (negalima sugirdyti mažiau, geriau perdozuoti, nes vakcina nežalinga).
3. Gyvos vakcinos yra jautrios orui, saulės šviesai, karščiui, dezinfekantams ir detergentams, todėl jas reikia saugoti nuo to.
4. Nenaudoti tablečių, kurios yra pažeistose lizdinės plokštelės sekcijose.
5. Negalima kaitinti vandens, kuriame yra atskiesta vakcina.

## **10. IŠLAUKA**

0 dienų.

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2 – 8 °C). Saugoti nuo šviesos.

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant lizduotės.

Tinkamumo laikas – 2 metai.

Išimtos iš lizdinės plokštelės tabletės turi būti sunaudotos nedelsiant.

Vakcina turi būti sunaudota nedelsiant, atskiedus pagal nurodymus.

## **12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI**

Žmonėms vakcina gali sukelti naudotojui nesunkų konjunktyvitą, kuris gali trukti 2-3 d. Dirbant su vakcina, būtina vengti, kad nepatektų tiesiai į akis. Jei vakcina purškiama, operatorius privalo dėvėti apsauginius akinius ir kaukę.

## **13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

## **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA**

2022-10-03

## **15. KITA INFORMACIJA**

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu ar registruotoju.