

## **PAKKAUSSSELOSTE**

T 61 vet injektioneste, liuos

### **1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI**

Myyntiluvan haltija:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Alankomaat

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaaja:

Intervet International GmbH  
Feldstrasse 1a  
85716 Unterschleissheim  
Saksa

### **2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

T 61 vet injektioneste, liuos

### **3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET**

1 ml sisältää:

**Vaikuttavat aineet:**

Mebetsoniumjodidi	50,0 mg
Embutramidi	200,0 mg
Tetrakaiinihydrokloridi	5,0 mg

**Apuaineet:**

Dimetyylyliformamidi	566,67 mg
Injektionesteisiin käytettävä vesi	

### **4. KÄYTTÖAIHEET**

Eläinten eutanasia.

### **5. VASTA-AIHEET**

Ei saa käyttää tajuissaan olevalle eläimelle.

Ei saa käyttää tiimeyden aikana.

## 6. HAITTAVAIKUTUKSET

Erittäin harvinaisissa tapauksissa lihasnykimistä ja kramppuja on raportoitu. Sydämenpysähdyks saattaa tapahtua viiveellä.

Huom.: T61:n käyttö aiheuttaa histopatologisia muutoksia, kuten endoteelivaurioita, keuhkostaasia, keuhkopöhöä ja hemolyysiä.

Jos havaitset muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

## 7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Koira, kissa, hevonen, nauta, sika, minkki, kesykyyhky, hamsteri, marsu ja kani.

## 8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

### Koira

Laskimonsisäisesti:	0,3-0,5 ml/elo painokilo
Intrapulmonaalisesti:	<i>alle 10 kg painaville:</i> 0,7 – 1,0 ml/ elo painokilo <i>yli 10 kg painaville:</i> 13-20 ml per eläin, riippuen eläimen koosta
Intrakardiaalisesti:	0,3 ml/elo painokilo

### Kissa

Intrapulmonaalisesti:	1,0 ml	pennut, muutaman päivän vanhat
	3,0 ml	alle 6 kk:n ikäiset
	5,0 ml	yli 6 kk:n ikäiset
	10,0 ml	yli 5 kg:n painoiset

### Hevonen, nauta ja sika

Laskimonsisäisesti:	4,0 – 6,0 ml/50 elo painokiloa
---------------------	--------------------------------

### Minkki, kesykyyhky, hamsteri, marsu ja kani

Intrapulmonaalisesti:	0,5 – 2,0 ml elo painosta riippuen
-----------------------	------------------------------------

## 9. ANNOSTUSOHJEET

Valmiste tulee antaa hitaasti.

## 10. VAROAIKA

Ei saa käyttää eläimille, joita on tarkoitus käyttää elintarvikkeena.

T61-valmisteella lopetetut tuotanto- ja turkiseläimet ovat eläintautilainsäädännön tarkoittamaa

suuririskistä eläinjätettä.

## **11. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Tämä eläinlääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysohjeita.

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

## **12. ERITYISVAROITUKSET**

### **Eläimiä koskevat erityiset varotoimet**

- Vain eläinlääkärin annettavaksi.
- T61 tulee antaa ainoastaan tajuttomille (nukutetuille) eläimille, koska valmisten imetyymiseen tai antoon liittyvissä epäsuotuisissa oloissa tajuissaan oleva eläin saattaa tukehtua.
- T61 käsitellyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
- Suonensisäisen injektion aikana on varmistettava, että koko annos annetaan intravaskulaarisesti. Laskimokanyylin käyttö on suositeltavaa.
- Erittäin harvinaisena kissoilla on raportoitu esiintyvän kuoleman jälkeen lihasnykimistä ja kramppuja.

### **Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudattava**

- Vältä suoraa kontaktia eläinlääkkeen kanssa.
- Poista saastuneet vaatteet heti.
- Jos valmistetta joutuu vahingossa avoimeen haavaan tai limakalvoille, pese alue välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla.
- Jos valmistetta vahingossa pistetään ihmiseen, haava on pestävä välittömästi vedellä ja saippualla ja pistopaikkaa on puristettava voimakkaasti.
- Jos valmistetta roiskahtaa vahingossa silmiin, huuhtele silmiä välittömästi puhtaalla vedellä usean minuutin ajan.
- Injisoitaessa valmistetta vahingossa ihmiseen tai kun sitä on nielty, on käännyttää välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä hänen pakkauselostetta tai myyntipäällystä.

Ei saa käyttää koko tiineyden aikana.

## **13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Käyttämättä jäädyn valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

## **14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY**

10.10.2019

## **15. MUUT TIEDOT**

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.  
MSD Animal Health Oy, Espoo  
[info\\_ah\\_finland@merck.com](mailto:info_ah_finland@merck.com)  
Puh. 010 2310 750

## BIPACKSEDEL

T 61 vet injektionsvätska, lösning

- 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLika**

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nederlanderna

Tillverkare:

Intervet International GmbH  
Feldstrasse 1a  
85716 Unterschleissheim  
Tyskland

- 2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELETS NAMN**

T 61 vet injektionsvätska, lösning

- 3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER**

1 ml innehåller:

**Aktiva substanser:**

Mebetsoniumjodid	50,0 mg
Embutramid	200,0 mg
Tetrakainhydroklorid	5,0 mg

**Hjälpämnen:**

Dimetylformamid	566,67 mg
Vatten för injektionsvätskor	

- 4. ANVÄNDNINGSMRÅDE(N)**

Eutanasi av djur.

- 5. KONTRAINDIKATIONER**

Får inte användas på djur vid medvetande.

Skall inte användas under hela dräktigheten.

## 6. BIVERKNINGAR

I mycket sällsynta fall har muskelpasmer och kramper rapporterats.  
Asystole kan ske med en fördräjning.

Obs: Användning av T61 orsakar histopatologiska förändringar så som endotelskador, lungstas, lungödem och hemolys.

Om du observerar andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

## 7. DJURSLAG

Hund, katt, häst, nöt, svin, mink, tamduva, hamster, marsvin och kanin.

## 8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

### Hund

Intravenöst:	0,3-0,5 ml/ kg kroppsvikt
Intrapulmonallesi:	<i>under 10 kg kroppsvikt: 0,7 – 0,10 ml/ kg kroppsvikt</i>
	<i>över 10 kg kroppsvikt: 13-20 ml per djur, beroende på djurets storlek</i>
Intrakardialt:	0,3 ml/ kg kroppsvikt

### Katt

Intrapulmonalt:	1,0 ml	valpar, några dagar gamla
	3,0 ml	under 6 månader
	5,0 ml	över 6 månader
	10,0 ml	över 5 kg kroppsvikt

### Häst, nöt och svin

Intravenöst: 4,0 – 6,0 ml/50 kg kroppsvikt

### Mink, tamduva, hamster, marsvin och kanin

Intrapulmonalt: 0,5 – 2,0 ml beroende på kroppsvikt

## 9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Preparatet bör administreras långsamt.

## 10. KARENSTID

Skall ej ges till djur som avses för humankonsumtion.

Produktions- och pälsdjur som avlivats med T61 är enligt djursjukdomslagen djuravfall med

omfattande risk.

## **11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

## **12. SÄRSKILDA VARNING**

### **Särskilda försiktighetsåtgärder för djur**

- Administreras enbart av veterinär.
- T61 bör ges enbart till medvetslösa (sövda) djur, eftersom djuret kan kvävas om absorption eller administration förhållandena är ogynnsamma.
- T61 användning kräver extra försiktighet.
- Vid intravenös administration bör man försäkra att hela dosen ges intravaskulärt. Användning av venkanyl rekommenderas.
- Muskelpasmer och kramper efter eutanasi har i mycket sällsynta fall rapporterats hos katter.

### **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur**

- Undvik direkt kontakt med det veterinärmedicinska preparatet.
- Avlägsna kontaminerade kläder direkt.
- Om preparatet i misstag kommer i kontakt med ett öppet sår eller med slemhinna, tvätta såret omedelbart, använd rikligt med vatten och tvål.
- Om preparatet i misstag injiceras i människa, måste såret tvättas med vatten och tvål och injektionsstället skall kraftigt pressas samman.
- Om stänk från preparatet i misstag hamnar i ögonen, skölj ögonen omedelbart med rent vatten i flera minuter.
- Om preparatet i misstag injiceras i människa eller ifall preparatet sväljs, uppsök genast läkare och uppvisa denna information eller etiketten.

Skall inte användas under hela dräktigheten.

## **13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

## **14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

10.10.2019

## **15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

MSD Animal Health Oy, Esbo

info\_ah\_finland@merck.com

Tel. 010 2310 750