

## **ANEXO I**

### **RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

## 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Purevax RCP liofilizado e solvente para suspensão injectável

## 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Por dose de 1 ml ou 0,5 ml:

### Substâncias activas:

Herpesvírus da rinotraqueíte felina atenuado (FHV estirpe F2)..... $\geq 10^{4,9}$  DICC<sub>50</sub><sup>1</sup>  
Antígenos do calicivírus felino inativado (estirpes FCV 431 e FCV G1)..... $\geq 2,0$  U. ELISA  
Vírus da panleucopenia felina atenuado (PLI IV)..... $\geq 10^{3,5}$  DICC<sub>50</sub><sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dose infecciosa 50% em cultura celular

### Excipientes:

| Composição qualitativa dos excipientes e outros componentes | Composição quantitativa, se esta informação for essencial para a administração adequada do medicamento veterinário |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liofilizado:</b>                                         |                                                                                                                    |
| Sacarose                                                    |                                                                                                                    |
| Sorbitol                                                    |                                                                                                                    |
| Dextrano 40                                                 |                                                                                                                    |
| Hidrolisado de caseína                                      |                                                                                                                    |
| Hidrolisado de colagénio                                    |                                                                                                                    |
| Hidrogenofosfato de potássio                                |                                                                                                                    |
| Diidrogenofosfato de potássio                               |                                                                                                                    |
| Hidróxido de potássio                                       |                                                                                                                    |
| Água para injetáveis                                        |                                                                                                                    |
| <b>Solvente:</b>                                            |                                                                                                                    |
| Água para injetáveis                                        | q.b.p. 1 ml ou 0,5 ml                                                                                              |

Liofilizado: bege homogéneo.

Solvente: líquido transparente incolor.

## 3. INFORMAÇÃO CLÍNICA

### 3.1 Espécies-alvo

Gatos.

### 3.2 Indicações de utilização para cada espécie-alvo

Imunização activa dos gatos com 8 ou mais semanas de idade:

- Contra a rinotraqueíte vírica felina, para redução dos sinais clínicos;
- Contra a infecção por calicivírus, para redução dos sinais clínicos;
- Contra a panleucopenia felina para prevenção da mortalidade e sinais clínicos.

Início da imunidade: 1 semana depois da primo-vacinação.

Duração da imunidade: 1 ano após a primo-vacinação e 3 anos após a última re-vacinação.

### 3.3 Contraindicações

Não existentes.

### 3.4 Advertências especiais

Vacinar apenas animais saudáveis.

### 3.5 Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para a utilização segura nas espécies-alvo:

Não aplicável.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:

Em caso de autoinjeção acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo.

Precauções especiais para a proteção do ambiente:

Não aplicável.

### 3.6 Eventos adversos

Gatos:

|                                                                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequentes<br>(1 a 10 animais / 100 animais tratados):                                 | Apatia, anorexia, hipertermia <sup>1</sup> .<br>Reações no local da injeção (dor, prurido, edema) <sup>2</sup> . |
| Pouco frequentes<br>(1 a 10 animais / 1000 animais tratados):                          | Reação de hipersensibilidade <sup>3</sup> .                                                                      |
| Muito raros<br>(<1 animal / 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas): | Emese <sup>4</sup> .                                                                                             |

<sup>1</sup> geralmente com duração de 1 ou 2 dias.

<sup>2</sup> dor leve à palpação, prurido ou edema limitado. Desaparece dentro de 1 ou 2 semanas, no máximo.

<sup>3</sup> pode exigir tratamento sintomático apropriado.

<sup>4</sup> principalmente dentro de 24 a 48 horas.

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. As notificações devem ser enviadas, de preferência por um médico veterinário, ao titular da Autorização de Introdução no Mercado ou ao respetivo representante local ou à autoridade nacional competente através do sistema nacional de farmacovigilância veterinária. Para obter informações de contacto, consulte o Folheto Informativo.

### 3.7 Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos

Não administrar durante toda a gestação e lactação.

### **3.8 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação**

Existe informação sobre segurança e eficácia que demonstra que esta vacina pode ser administrada e misturada com vacinas sem adjuvante, da Boehringer Ingelheim, contra a leucemia felina e/ou administrada no mesmo dia mas não misturada, com a vacina com adjuvante, da Boehringer Ingelheim, contra a raiva.

Existe informação sobre segurança e eficácia que demonstra que esta vacina pode ser administrada e misturada com a vacina sem adjuvante, da Boehringer Ingelheim, contra a raiva.

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com aqueles já referidos. A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso.

### **3.9 Posologia e via de administração**

Via subcutânea.

Reconstituir suavemente a vacina para obter uma suspensão uniforme com formação limitada de espuma.

Aparência visual após reconstituição: suspensão transparente, ligeiramente amarela.

Após a reconstituição do liofilizado com 0,5 ml ou 1 ml de solvente (dependendo da apresentação escolhida), injetar uma dose da vacina de acordo com o seguinte esquema de vacinação:

Primo-vacinação:

- 1ª injeção: a partir das 8 semanas de idade,
- 2ª injeção: 3 a 4 semanas mais tarde.

Quando se suspeita que existem elevados níveis de anticorpos maternos contra os componentes de rinotraqueíte, calicivirose ou panleucopenia (p. ex.: gatinhos com 9 a 12 semanas de idade nascidos de mães vacinadas antes da gestação e/ou com conhecida ou suspeita exposição prévia ao(s) patógeno(s)), a primo-vacinação deve ser adiada até às 12 semanas de idade.

Revacinação:

- A primeira revacinação deverá ser realizada um ano após a primo-vacinação,
- Revacinações subsequentes: em intervalos de até 3 anos.

### **3.10 Sintomas de sobredosagem (e, quando aplicável, procedimentos de emergência e antídotos)**

Não foram observados outros eventos adversos para além dos já mencionados na secção 3.6 “Eventos adversos”, com excepção de hipertermia que pode, excepcionalmente, durar 5 dias.

### **3.11 Restrições especiais de utilização e condições especiais de utilização, incluindo restrições à utilização de medicamentos veterinários antimicrobianos e antiparasitários, a fim de limitar o risco de desenvolvimento de resistência**

Não aplicável.

### **3.12 Intervalos de segurança**

Não aplicável.

## **4. PROPRIEDADES IMUNOLÓGICAS**

### **4.1 Código ATCvet: QI06AH09**

Vacina contra a rinotraqueíte vírica felina, a calicivirose felina e a panleucopenia felina. Estimula a imunidade ativa contra o herpesvírus da rinotraqueíte felina, o calicivírus felino e o vírus da panleucopenia felina.

O medicamento veterinário demonstrou reduzir a excreção de calicivírus felino no início da imunidade e durante um ano após a vacinação.

## **5. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS**

### **5.1 Incompatibilidades principais**

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com o solvente fornecido para utilização com este medicamento veterinário e exceto com aqueles mencionados acima na secção 3.8.

### **5.2 Prazo de validade**

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 18 meses.  
Prazo de validade após reconstituição de acordo com as instruções: administrar imediatamente.

### **5.3 Precauções especiais de conservação**

Conservar e transportar refrigerado (2 °C – 8 °C).  
Proteger da luz.  
Não congelar.

### **5.4 Natureza e composição do acondicionamento primário**

Frasco para injetáveis de vidro Tipo I contendo 1 dose de liofilizado e frasco para injetáveis de vidro Tipo I contendo 1 ml ou 0,5 ml de solvente, ambos fechados com uma rolha de elastómero de butilo e selados com tampa de alumínio ou plástico.

Caixa de plástico contendo 10 frascos para injetáveis com 1 dose de liofilizado e 10 frascos para injetáveis com 1 ml de solvente.

Caixa de plástico contendo 50 frascos para injetáveis com 1 dose de liofilizado e 50 frascos para injetáveis com 1 ml de solvente.

Caixa de plástico contendo 10 frascos para injetáveis com 1 dose de liofilizado e 10 frascos para injetáveis com 0,5 ml de solvente.

Caixa de plástico contendo 50 frascos para injetáveis com 1 dose de liofilizado e 50 frascos para injetáveis com 0,5 ml de solvente.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

### **5.5 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos**

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Utilize sistemas de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis ao medicamento veterinário em causa.

**6. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**7. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

EU/2/04/052/001-004

**8. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO**

Data da primeira autorização: 23/02/2005

**9. DATA DA ÚLTIMA REVISÃO DO RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO  
MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

MM/AAAA

**10. CLASSIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS**

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **ANEXO II**

### **OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Não existentes.

**ANEXO III**

**ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO**

## **A. ROTULAGEM**

## INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO

Caixa de plástico contendo 10 frascos para injetáveis com liofilizado e 10 frascos para injetáveis com solvente

Caixa de plástico contendo 50 frascos para injetáveis com liofilizado e 50 frascos para injetáveis com solvente

### 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Purevax RCP liofilizado e solvente para suspensão injectável

### 2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ACTIVAS

Por dose de 0,5 ml ou 1 ml:

FHV (estirpe F2) .....  $\geq 10^{4,9}$  DICC<sub>50</sub>

FCV (estirpes 431 e G1) .....  $\geq 2,0$  U. ELISA

FPV (PLI IV) .....  $\geq 10^{3,5}$  DICC<sub>50</sub>

### 3. DIMENSÃO DA EMBALAGEM

Liofilizado (10 x 1 dose) + solvente (10 x 1 ml)

Liofilizado (50 x 1 dose) + solvente (10 x 1 ml)

Liofilizado (10 x 1 dose) + solvente (10 x 0,5 ml)

Liofilizado (50 x 1 dose) + solvente (10 x 0,5 ml)

### 4. ESPÉCIES-ALVO

Gatos.

### 5. INDICAÇÕES

### 6. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Via subcutânea.

### 7. INTERVALOS DE SEGURANÇA

### 8. PRAZO DE VALIDADE

Exp. {dd/mm/aaaa}

Uma vez reconstituído, administrar imediatamente.

### 9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Armazenar e transportar refrigerado.

Proteger da luz.  
Não congelar.

**10. MENÇÃO "Antes de administrar, ler o folheto informativo"**

Antes de administrar, ler o folheto informativo.

**11. MENÇÃO "USO VETERINÁRIO"**

USO VETERINÁRIO

**12. MENÇÃO "MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

**13. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

EU/2/04/052/001 Liofilizado (10 x 1 dose) + solvente (10 x 1 ml)  
EU/2/04/052/002 Liofilizado (50 x 1 dose) + solvente (50 x 1 ml)  
EU/2/04/052/003 Liofilizado (10 x 1 dose) + solvente (10 x 0,5 ml)  
EU/2/04/052/004 Liofilizado (50 x 1 dose) + solvente (50 x 0,5 ml)

**15. NÚMERO DO LOTE**

Lot {número}

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE  
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO**

**Frasco liofilizado**

**1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

Purevax RCP



**2. INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ATIVAS**

1 dose

0,5 ml ou 1 ml

**3. NÚMERO DO LOTE**

Lot. {número}

**4. PRAZO DE VALIDADE**

Exp. {dd/mm/aaaa}

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE  
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO**

**Frasco solvente**

**1. NOME DO SOLVENTE**

Purevax RCP solvente



**2. INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ATIVAS**

0,5 ml ou 1 ml

**3. NÚMERO DO LOTE**

Lot. {número}

**4. PRAZO DE VALIDADE**

Exp. {dd/mm/aaaa}

## **B. FOLHETO INFORMATIVO**

## FOLHETO INFORMATIVO

### 1. Nome do medicamento veterinário

Purevax RCP liofilizado e solvente para suspensão injectável

### 2. Composição

Por dose de 1 ml ou 0,5 ml:

#### Substâncias activas:

##### Liofilizado:

Herpesvírus da rinotraqueíte felina atenuado (FHV estirpe F2).....  $\geq 10^{4,9}$  DICC<sub>50</sub><sup>1</sup>  
Antígenos do calicivírus felino inativado (estirpes FCV 431 e FCV G1).....  $\geq 2,0$  U. ELISA  
Vírus da panleucopenia felina atenuado (PLI IV).....  $\geq 10^{3,5}$  DICC<sub>50</sub><sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dose infecciosa 50% em cultura celular

##### Solvente:

Água para injectáveis ..... q.b.p. 1 ml ou 0,5 ml

Liofilizado: pellet bege homogéneo.

Solvente: líquido transparente incolor.

### 3. Espécies-alvo

Gatos

### 4. Indicações de utilização

Imunização activa dos gatos com 8 ou mais semanas de idade:

- Contra a rinotraqueíte vírica felina, para redução dos sinais clínicos;
- Contra a infecção por calicivírus, para redução dos sinais clínicos;
- Contra a panleucopenia felina para prevenção da mortalidade e sinais clínicos.

Início da imunidade: 1 semana depois da primo-vacinação.

Duração da imunidade: 1 ano após a primo-vacinação e 3 anos após a última re-vacinação.

### 5. Contraindicações

Não existentes.

### 6. Advertências especiais

Vacinar apenas animais saudáveis.

Precauções especiais a adoptar pela pessoa que administra o medicamento aos animais:

Em caso de auto-injecção accidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo.

Gestação e Lactação:

Não administrar durante toda a gestação e lactação.

Interação com outros medicamentos e outras formas de interação:

Existe informação sobre segurança e eficácia que demonstra que esta vacina pode ser administrada e misturada com vacinas sem adjuvante da Boehringer Ingelheim contra a leucemia felina e/ou administrada no mesmo dia, mas não misturada, com a vacina com adjuvante da Boehringer Ingelheim contra a raiva.

Existe informação sobre segurança e eficácia que demonstra que esta vacina pode ser administrada e misturada com a vacina sem adjuvante, da Boehringer Ingelheim contra a raiva.

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com aqueles já referidos. A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso.

Sobredosagem:

Não foram observados, outros eventos adversos para além dos já mencionados na secção “Eventos adversos”, com excepção de hipertermia que pode, excepcionalmente, durar 5 dias.

Incompatibilidades principais:

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com o solvente fornecido para utilização com este medicamento veterinário e exceto com aqueles mencionados acima.

## **7. Eventos adversos**

Gatos:

**Frequentes (1 a 10 animais / 100 animais tratados):**

Apatia, anorexia, hipertermia<sup>1</sup>.

Reações no local da injeção (dor, prurido, edema)<sup>2</sup>.

**Pouco frequentes (1 a 10 animais / 1000 animais tratados):**

Reação de hipersensibilidade<sup>3</sup>.

**Muito raros (<1 animal / 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas):**

Emese<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> geralmente com duração de 1 ou 2 dias.

<sup>2</sup> dor leve à palpação, prurido ou edema limitado. Desaparece dentro de 1 ou 2 semanas, no máximo.

<sup>3</sup> que pode exigir tratamento sintomático apropriado.

<sup>4</sup> principalmente dentro de 24 a 48 horas.

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos mesmo que não mencionados, ou pense que o medicamento veterinário não foi eficaz, informe o seu médico veterinário. Também pode comunicar quaisquer eventos adversos ao titular da Autorização de Introdução no Mercado ou representante local do Titular da Autorização de Introdução no Mercado utilizando os dados de contacto no final deste folheto, ou através do Sistema Nacional de Farmacovigilância Veterinária (SNFV): {detalhes do Sistema nacional}

## **8. Dosagem em função da espécie, via e modo de administração**

Via subcutânea.

Após a reconstituição do liofilizado com 0,5 ml ou 1 ml de solvente (dependendo da apresentação escolhida), injetar uma dose da vacina de acordo com o seguinte esquema de vacinação:

Primo-vacinação:

- 1ª injeção: a partir das 8 semanas de idade,
- 2ª injeção: 3 a 4 semanas mais tarde.

Quando se suspeita que existem elevados níveis de anticorpos maternos contra os componentes de rinotraqueíte, calicivírus e panleucopenia (p. ex.: gatinhos com 9 a 12 semanas de idade nascidos de mães vacinadas antes da gestação e/ou com conhecida ou suspeita exposição prévia ao(s) patógeno(s)), a primo-vacinação deve ser adiada até às 12 semanas de idade.

Revacinação:

- A primeira revacinação deverá ser realizada um ano após a primo-vacinação,
- Revacinações subsequentes: em intervalos de até 3 anos.

## **9. Instruções com vista a uma administração correta**

Reconstituir suavemente a vacina para obter uma suspensão uniforme com formação limitada de espuma.

Aparência visual após reconstituição: suspensão transparente, ligeiramente amarela.

## **10. Intervalos de segurança**

Não aplicável.

## **11. Precauções especiais de conservação**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar e transportar refrigerado (2 °C – 8 °C).

Proteger da luz.

Não congelar.

Não administrar este medicamento veterinário depois de expirado o prazo de validade indicado no rótulo, depois de Exp.

Prazo de validade após reconstituição de acordo com as instruções: administrar imediatamente.

## **12. Precauções especiais de eliminação**

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Utilize sistemas de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis. Estas medidas destinam-se a ajudar a proteger o ambiente.

## **13. Classificação dos medicamentos veterinários**

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

**14. Números de autorização de introdução no mercado e tamanhos de embalagem**

EU/2/04/052/001-004

Caixa de plástico contendo:

10 x 1 dose de liofilizado e 10 x 1 ml de solvente

50 x 1 dose de liofilizado e 50 x 1 ml de solvente

10 x 1 dose de liofilizado e 10 x 0,5 ml de solvente

50 x 1 dose de liofilizado e 50 x 0,5 ml de solvente

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

**15. Data em que o folheto informativo foi revisto pela última vez**

MM/AAAA

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia [Union Product Database](https://medicines.health.europa.eu/veterinary) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Detalhes de contacto**

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Alemanha

Fabricante responsável pela libertação do lote:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'aviation

69800 Saint-Priest

França

Representantes locais e detalhes de contacto para comunicar suspeitas de eventos adversos:

**België/Belgique/Belgien**

Boehringer Ingelheim Animal

Health Belgium SA

Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,

1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel

Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

**Lietuva**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Dr. Boehringer Gasse 5-11

A-1121 Vīne, Austrija

Tel: +370 5 2595942

**Република България**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringer Gasse 5-11

A-1121 Виена, Австрия

Tel: +359 2 958 79 98

**Luxembourg/Luxemburg**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,

1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel

Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

**Česká republika**

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.  
Purkyňova 2121/3  
CZ - 110 00, Praha 1  
Tel: +420 234 655 111

**Danmark**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics  
A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tlf: + 45 3915 8888

**Deutschland**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
Tel: 0800 290 0 270

**Eesti**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Eesti filiaal  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viin, Austria  
Tel: +372 612 8000

**Ελλάδα**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία  
Τηλ: +30 2108906300

**España**

Boehringer Ingelheim Animal Health España,  
S.A.U.  
Prat de la Riba, 50  
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
Tel: +34 93 404 51 00

**France**

Boehringer Ingelheim Animal Health France,  
SCS  
29, avenue Tony Garnier  
69007 Lyon  
Tél : +33 4 72 72 30 00

**Hrvatska**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Beč, Austrija  
Tel: +385 1 2444 600

**Magyarország**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Magyarországi Fióktelep  
Lechner Ö. Fasor 10.  
H-1095 Budapest  
Tel: +36 1 299 8900

**Malta**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, il-Ġermanja  
Tel: +353 1 291 3985

**Nederland**

Boehringer Ingelheim Animal Health  
Netherlands bv  
Basisweg 10  
1043 AP Amsterdam  
Tel: +31 20 799 6950

**Norge**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tlf: +47 66 85 05 70

**Österreich**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Wien  
Tel: +43 1 80105-6880

**Polska**

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
Tel.: + 48 22 699 0 699

**Portugal**

Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal,  
Unipessoal, Lda.  
Avenida de Pádua, 11  
1800-294 Lisboa  
Tel: +351 21 313 5300

**România**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Sucursala București  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viena, Austria  
Tel: +40 21 302 28 00

**Ireland**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany  
Tel: +353 1 291 3985

**Slovenija**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Podružnica Ljubljana  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Dunaj, Avstrija  
Tel: +386 1 586 40 00

**Ísland**

Vistor  
Hörgatún 2  
210 Garðabær  
Sími: + 354 535 7000

**Slovenská republika**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viedeň, Rakúsko  
Tel: +421 2 5810 1211

**Italia**

Boehringer Ingelheim Animal Health  
Italia S.p.A.  
Via Vezza d'Oglio, 3  
20139 Milano  
Tel: +39 02 53551

**Suomi/Finland**

Vetcare Oy  
PL/PB 99  
24101 Salo  
Puh/Tel: + 358 201443360

**Κύπρος**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία  
Τηλ: +30 2108906300

**Sverige**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tel: +46 (0)40-23 34 00

**Latvija**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Latvijas filiāle  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viena, Austrija  
Tel: +371 67 240 011

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany  
Tel: +353 1 291 3985

**17. Outras informações**

O medicamento veterinário demonstrou reduzir a excreção de calicivírus felino no início da imunidade e durante um ano após a vacinação.