

## GEBRAUCHSINFORMATION

### Discus compositum-Injektionslösung für Tiere

#### Homöopathische Arzneispezialität

#### 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Deutschland

#### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Discus compositum-Injektionslösung für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

#### 3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält je 50 mg von:

##### Wirkstoffe:

Acidum ascorbicum D6

Acidum picrinicum D6

Acidum silicicum D6

Acidum thiocticum D8

Aesculus hippocastanum D6

Ammonium chloratum D8

Argentum metallicum D10

Berberis vulgaris D4

Calcium phosphoricum D10

Cartilago suis D8

Cimicifuga racemosa D4

Cinchona pubescens D4

Citrullus colocynthis D4

Coenzym A D10

Cuprum aceticum D6

Discus intervertebralis suis D8

Embryo totalis suis D10

Funiculus umbilicalis suis D10

Glandula suprarenalis suis D10

Hydrargyrum oxydatum rubrum D10

Kalium carbonicum D6

Ledum palustre D4

Medulla ossis suis D10

Nadidum D6

Natrium diethyloxalaceticum D6  
Riboflavini natrii phosphas D6  
Nicotinamidum D6  
Pseudognaphalium obtusifolium D4  
Pulsatilla pratensis D6  
Pyridoxini hydrochloridum D6  
Ranunculus bulbosus D4  
Secale cornutum D6  
Sepia officinalis D10  
Sulfur D12  
Thiamini hydrochloridum D6  
Zincum metallicum D10

#### **Sonstige Bestandteile:**

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke; Spuren von Ethanol 96%, Glycerol 85% und Lactose-Monohydrat

Farblose, klare Injektionslösung

#### **4. ANWENDUNGSGEBIETE**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Unterstützende Behandlung bei Bandscheibenschäden, wirbelsäulenbedingte Nervenschmerzen, entzündliche und degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule.

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

#### **5. GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen, insbesondere Pflanzen aus der Familie der Korbblütler, oder einem der sonstigen Bestandteile.

#### **6. NEBENWIRKUNGEN**

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier feststellen, insbesondere solche die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

#### **7. ZIELTIERARTEN**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Kleinnager, Kaninchen, Ziervögel

#### **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Zur subkutanen, intramuskulären oder intravenösen Anwendung.

## Dosierung:

Entsprechend der Tierart und in Abhängigkeit vom Körpergewicht beträgt die Einzeldosis pro Tag:

Pferd, Rind (über 500 kg): 10 ml  
Pferd, Rind (bis zu 500 kg): 5 ml  
Schwein: 3-5 ml  
Schaf, Ziege: 3-4 ml  
Großer Hund (über 25 kg): 3-4 ml  
mittelgroßer Hund (15-25 kg): 2 ml  
kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze: 1-2 ml  
Kaninchen, Kleinnager, Ziervogel: 0,1-0,5 ml

## *Häufigkeit und Dauer der Anwendung:*

Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung richten sich in erster Linie nach den Grundsätzen der Homöopathie und dem vorliegenden Krankheitsbild.

Bei akuten Beschwerden kann die angegebene Einzeldosis anfangs nach 24 Stunden wiederholt werden, dann mit der Standarddosierung fortfahren.

Bei chronischen Erkrankungen wird die Einzeldosis jeweils in Abständen von 1-4 Tagen verabreicht.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild und wird vom Tierarzt bestimmt.

## Anleitung zum Öffnen einer Ampulle



Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

Ein Aufsägen der Glasampulle ist nicht erforderlich. Halten Sie die Ampulle mit dem Kopf schräg nach oben und lassen Sie die sich darin befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen. Brechen Sie dann den Ampullenkopf ab, indem Sie auf den Farbpunkt Druck ausüben.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

## **10. WARTEZEIT(EN)**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Kaninchen: Essbare Gewebe: Null Tage  
Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: Null Tage

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Arzneimittel in der Originalverpackung aufbewahren. Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Die Ampullen sind nach Anbruch sofort aufzubrauchen oder zu verwerfen.

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Tierarzt kontrolliert werden. Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

### Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt anwenden.

### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden. Wenn dieses Tierarzneimittel gemeinsam mit anderen Arzneimitteln angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

## **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

## **14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

Dezember 2019

## **15. WEITERE ANGABEN**

Brechampullen (OPC) aus farblosem Glas (hydrolytische Klasse I) mit 5 ml Lösung  
Packungsgrößen: 5, 10, 50 und 100 Ampullen.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Z. Nr.: 839289