

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Malaseb šampūns suņiem un kaķiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs ml satur:

Aktīvās vielas:

Hlorheksidīna diglikonāts 20 mg (atbilst 11,26 mg hlorheksidīna)
Mikonazola nitrāts 20 mg (atbilst 17,37 mg mikonazola)

Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs	Kvantitatīvais sastāvs, ja šī informācija ir būtiska veterināro zāļu pareizai ievadīšanai
Metilhloroizotiazolinons	0,0075 mg
Metilizotiazolinons	0,0025 mg
Nātrija benzoāts	1,25 mg
Makrogola laurilēteris	
Kokamīdpropilbetaīns	
Dinātrija kokamfodiacetāts	
Cetrimonija hlorīds	
PEG-120 metilglikozes dioleāts	
Citronskābes monohidrāts	
Sālsskābe	
Ūdens, attīrīts	

Dzidrs līdz nedaudz duļķains, gaiši dzeltens līdz gaiši brūns šķidrums.

3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

3.1. Mērķsugas

Suņi un kaķi.

3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Suņiem: ar *Malassezia pachydermatis* un *Staphylococcus intermedius* saistīta seborejiskā dermatīta ārstēšanai un kontrolei.

Kaķiem: kā palīglīdzeklis *Microsporum canis* izraisītas kailās ēdes ārstēšanai, lietojot kopā ar grizeofulvīnu.

3.3. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret jebkuru no palīgvielām.

3.4. Īpaši brīdinājumi

Suņiem un kaķiem:

Lai novērstu infekcijas atjaunošanos, veikt piemērotus dzīvnieka apkārtējās vides higiēnas pasākumus (piemēram, būdu un gulvietu tīrīšanu un dezinfekciju u.c.).

Kaķiem:

Ārstējot kailo ēdi, šīs veterinārās zāles lietot tikai kopā ar grizeofulvīnu.

Kaķu mazgāšana ar šampūnu, sākotnēji var veicināt *M. canis* noteikšanu, izmantojot ar zobu suku paņemta parauga kultivēšanas metodi.

Gan lauka, gan eksperimentālie pētījumi ir parādījuši, ka vides piesārņojumu ar *M. canis* var novērst vai samazināt, lietojot šīs veterinārās zāles divas reizes nedēļā. Šajos pētījumos grizeofulvīns tika lietots nepārtraukti visā ārstēšanas periodā un bija vērojama gan klīniskā stāvokļa uzlabošanās, gan vides piesārņojuma samazināšanās, salīdzinājumā ar gadījumiem, kad tika izmantots tikai grizeofulvīns.

3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā oficiālā, valsts un reģionālā antimikrobiālā politika.

Tikai ārīgai lietošanai.

Ja notikusi nejauša šampūna nokļūšana acīs, nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu ūdens.

Mazgāšanas ar šampūnu un skalošanas laikā, kā arī pirms nožūšanas neļaut dzīvniekam sevi laizīt. Mazgāšanas laikā ar šampūnu rīkoties uzmanīgi, lai dzīvnieks neieelpotu šīs veterinārās zāles un lai tās nenonāktu dzīvnieka degunā vai mutē.

Kucēni un kaķēni nedrīkst nonākt saskarē ar ārstētām zīdošām kucēm vai kaķenēm, pēc kamēr to apmatojums nav pilnībā izžuvis.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret hlorheksidīnu, mikonazolu vai pret jebkuru no palīgvielām jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Šīs veterinārās zāles var izraisīt acu kairinājumu. Izvairīties no saskares ar acīm. Nejaušas sakares gadījumā ar acīm, skalot tās ar lielu daudzumu ūdens. Ja kairinājums nepāriet, konsultēties ar ārstu.

Uzreiz pēc apstrādes izvairīties no pārmērīgas ārstēto dzīvnieku aiztikšanas un glaudīšanas.

Kaķu kailā ēde ir infekcioza cilvēkiem, tāpēc cērpot un ar šampūnu mazgājot inficētus kaķus ieteicams vilkt cimdus un nosegt rokas. .

Lai, mazgājot kaķi ar šampūnu, izvairītos no ilgstošas saskares ar šampūnu, rūpīgi nomazgāt un nožāvēt rokas. Neberzēt rokas.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Nav piemērojami.

3.6. Blakusparādības

Suņi, kaķi:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Eritēma lietošanasvietā ^a , nieze lietošanas vietā ^a Ādas reakcija (nieze, apsārtums)
---	--

^a Tikai suņiem ar atopiju vai kaķiem ar alerģisku ādas slimību.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam, vai tā vietējam pārstāvim, vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnība un laktācija:

Nav ieteicams lietot šīs veterinārās zāles kopā ar grizeofulvīnu grūsnām kaķenēm, jo grizeofulvīna lietošana grūsnības laikā ir kontrindicēta.

Lūdzu, skatīt 3.5. apakšpunktu.

3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

3.9. Lietošanas veids un devas

Lietošanai uz ādas.

Suņi: Mazgāt ar šampūnu divas reizes nedēļā, līdz simptomi mazinās un pēc tam reizi nedēļā vai pēc nepieciešamības, lai kontrolētu stāvokli.

Kaķi: Mazgāt ar šampūnu divas reizes nedēļā vismaz tik ilgi, kamēr apmatojuma paraugā, kas paņemts ar zobu suku nav atrodams *M.canis*. Maksimālajam ārstēšanas periodam nevajadzētu pārsniegt 16 nedēļas. Atkarībā no apmatojuma veida un garuma apsvērt dzīvnieka apmatojuma noskūšanas lietderību pirms ārstēšanas.

Pilnībā saslapināt dzīvnieku ar tīru ūdeni un uzklāt šīs veterinārās zāles vairākās vietās uz dzīvnieka un iemasēt apmatojumā. Lietot pietiekami daudz šampūna, lai saziņpētu visu ādu un apmatojumu. Pārlicināties, ka šampūns ir uzklāts ap lūpām, zem astes un starp kāju pirkstiem. Ļaut dzīvniekam pastāvēt 10 minūtes, pēc tam noskalot ar tīru ūdeni un ļaut dabiski nožūt siltā vietā, kur nav caurvēja.

Piemēram, ar 250 ml pudeli pietiek aptuveni 8-16 apstrādes reizēm 15 kg smagam sunim vai 5-10 apstrādes reizēm 25 kg smagam sunim, vai 25 apstrādes reizēm kaķim, atkarībā no apmatojuma biezuma.

3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Nav. .

3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojami.

3.12. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

4.1. ATĶvet kods: QD01AC52.

4.2. Farmakodinamiskās īpašības

Hlorheksidīna diglikonāts:

Hlorheksidīna diglikonāts ir bisbiguanīda antibakteriāls līdzeklis pret grampozitīvām un gramnegatīvām baktērijām. Tas ir gan baktericīds, gan bakteriostatisks atkarībā no izmantotās koncentrācijas. Augšanas inhibēšana tiek panākta ar tiešu iedarbību uz ATP-āzi, tādējādi traucējot enerģijas transportēšanas mehānismiem. Hlorheksidīna baktericīdo iedarbību izraisa baktēriju šūnu satura koagulācija.

Hlorheksidīna diglikonāts tiek pievienots šīm veterinārajām zālēm tā aktivitātes pret *Staphylococcus intermedius* dēļ. Tipiskās MIC vērtības, kas atrastas klīniskos *Staphylococcus intermedius* izolātos, ir 2,0 mg/l (2005). Nav ziņots par *Staphylococcus intermedius* rezistenci pret hlorheksidīnu.

Mikonazola nitrāts:

Mikonazola nitrāts ir imidazola pretsēnīšu viela ar aktivitāti pret rauga sēnītēm piemēram, *Malassezia pachydermatis*.

Tas ir gan fungicīds, gan fungistatisks atkarībā no lietotās koncentrācijas. Mikonazols nomāc ergosterola iekļaušanos šūnu membrānās, tādējādi palielinot citotoksiskā ūdeņraža peroksīda koncentrāciju sēnīšu šūnu sienīnās.

Mikonazola nitrāts ir pievienots šīm veterinārajām zālēm tā aktivitātes pret *Malassezia pachydermatis* dēļ. Tipiskās MIC vērtības, kas atrastas klīniskos *Malassezia pachydermatis* izolātos, ir 0,5-4,0 mg/l (2003/5). Nav ziņots par *Malassezia pachydermatis* rezistenci pret mikonazolu.

Hlorheksidīna un mikonazola kombinācija

In vitro pētījumos pierādīta hlorheksidīna un mikonazola sinerģiska aktivitāte pret *Microsporum canis*.

4.3. Farmakokinētiskās īpašības

Hlorheksidīna diglikonāts:

10 minūšu laikā pēc mazgāšanas ar šampūnu tiek sasniegta augsta hlorheksidīna diglikonāta koncentrācija apmatojumā un uz ādas. Šīs koncentrācijas krietni pārsniedz *Staphylococcus intermedius* MIC. Norīšanas gadījumā hlorheksidīna diglikonāts vāji uzsūcas kuņģa-zarnu traktā. Caur ādu uzsūcas mazliet vai nemaz. Ir konstatēts, ka cilvēkiem 29 stundu laikā pēc lietošanas uz ādas paliek 26% aktīvās vielas.

Mikonazola nitrāts:

10 minūšu laikā pēc mazgāšanas ar šampūnu tiek sasniegta augsta mikonazola nitrāta koncentrācija apmatojumā un uz ādas. Šīs koncentrācijas krietni pārsniedz *Malassezia pachydermatis* MIC. Mikonazola nitrāts vāji uzsūcas caur ādu un kuņģa-zarnu traktā.

5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

5.1. Būtiska nesaderība

Nav zināma.

5.2. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši.

5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Neuzglabāt temperatūrā virs 30 °C.
Neatdzesēt vai nesasaldēt.

5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs

250 ml polietilēna pudele ar uzskrūvējamu polipropilēna vāciņu.

5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

Dechra Veterinary Products A/S

7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)

V/MRP/10/0002

8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 22/03/2010

9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2025

10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PIELIKUMS
MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARKĒJUMS

UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA**MARĶĒJUMS****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Malaseb šampūns

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katrs ml satur:

Hlorheksidīna diglikonāts 20 mg (atbilst 11,26 mg hlorheksidīna)

Mikonazola nitrāts 20 mg (atbilst 17,37 mg mikonazola)

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

250 ml

4. MĒRĶSUGAS

Suņi un kaķi.

5. INDIKĀCIJAS**6. LIETOŠANAS VEIDI**

Lietošanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS**8. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp. {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 30 °C.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS
--

Dechra Veterinary Products A/S

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI
--

V/MRP/10/0002

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Veterināro zāļu nosaukums

Malaseb šampūns suņiem un kaķiem

2. Sastāvs

Katrs ml satur:

Aktīvās vielas:

Hlorheksidīna diglikonāts	20 mg (kas atbilst 11,26 mg hlorheksidīna)
Mikonazola nitrāts	20 mg (kas atbilst 17,37 mg mikonazola)

Palīgvielas:

Metilchlorozotiazolinons	0,0075 mg
Metilizotiazolinons	0,0025 mg
Nātrija benzoāts	1,25 mg

Dzidrs līdz nedaudz neskaidrs, gaišdzeltens līdz gaiši brūns šķidrums.

3. Mērķsugas

Suņi un kaķi.

4. Lietošanas indikācijas

Suņiem: ar *Malassezia pachydermatis* un *Staphylococcus intermedius* saistīta seborejiskā dermatīta ārstēšanai un kontrolei.

Kaķiem: kā palīg līdzeklis *Microsporum canis* izraisītas kailās ēdes ārstēšanai, lietojot kopā ar grizeofulvīnu.

5. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret jebkuru no palīgvielām.

6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši brīdinājumi:

Kaķiem: ārstējot kailo ēdi, šīs veterinārās zāles lietot tikai kopā ar grizeofulvīnu. Kaķu mazgāšana ar šampūnu, sākotnēji var veicināt *M. canis* noteikšanu, izmantojot ar zobu suku paņemta apmatojuma parauga kultivēšanas metodi.

Gan lauka, gan eksperimentālie pētījumi ir parādījuši, ka vides piesārņojumu ar *M. canis* var novērst vai samazināt, lietojot šīs veterinārās zāles divas reizes nedēļā. Šajos pētījumos grizeofulvīns tika lietots nepārtraukti visā ārstēšanas periodā, un bija vērojama gan klīniskā stāvokļa uzlabošanās, gan vides piesārņojuma samazināšanās salīdzinājumā ar gadījumiem, kad tika izmantots tikai grizeofulvīns.

Suņiem un kaķiem: lai novērstu infekcijas atjaunošanos, veikt piemērotus dzīvnieka apkārtējās vides

higiēnas pasākumus (piemēram, būdu un guļvietu tīrīšanu un dezinfekciju u.c.).

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā oficiālā, valsts un reģionālā antimikrobiālā politika.

Tikai ārstiem lietošanai.

Ja notikusi nejauša šampūna nokļūšana acīs, nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu ūdens. Mazgāšanas ar šampūnu un skalošanas laikā, kā arī pirms nožūšanas neļaut dzīvniekam sevi laizīt. Mazgāšanas laikā ar šampūnu rīkoties uzmanīgi, lai dzīvnieks neieelpotu šīs veterinārās zāles un lai tas nenonāktu dzīvnieka degunā vai mutē.

Kucēni un kaķēni nedrīkst nonākt saskarē ar ārstētām zīdošām kucēm vai kaķenēm pēc kamēr to apmatojums nav pilnībā izžuvis.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret hlorheksidīnu, mikonazolu vai pret jebkuru no palīgvielām jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Šīs veterinārās zāles var izraisīt acu kairinājumu. Izvairieties no saskares ar acīm. Nejaušas saskares gadījumā ar acīm, skalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja kairinājums nepāriet, konsultēties ar ārstu. Uzreiz pēc apstrādes izvairīties no pārmērīgas ārstēto dzīvnieku aiztikšanas un glaudīšanas. Kaķu kailā ēdē ir infekcioza cilvēkiem, tāpēc cērpot un ar šampūnu mazgājot inficētus kaķus ieteicams vilkt cimdus un nosegt rokas.

Lai, mazgājot kaķi ar šampūnu, izvairītos no ilgstošas saskares ar šampūnu, rūpīgi nomazgāt un nožāvēt rokas. Neberzēt rokas.

Grūsnība un laktācija:

Nav ieteicams lietot šīs veterinārās zāles kopā ar grizeofulvīnu grūsnām kaķenēm, jo grizeofulvīna lietošana grūsnības laikā ir kontrindicēta.

Skatīt arī punktu "Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām".

7. Blakusparādības

Suņi, kaķi:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Eritēma lietošanas vietā ^a , nieze lietošanas vietā ^a Ādas reakcija (nieze, apsārtums)
---	---

^a Tikai suņiem ar atopiju vai kaķiem ar alerģisku ādas slimību.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdz, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē www.pvd.gov.lv

8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Lietošanai uz ādas.

Suņi: mazgāt ar šampūnu divas reizes nedēļā, līdz simptomi mazinās, un pēc tam reizi nedēļā vai pēc nepieciešamības, lai kontrolētu stāvokli, atbilstoši veterinārārsta ieteikumiem.

Kaķi: mazgāt ar šampūnu divas reizes nedēļā, vismaz tik ilgi, kamēr apamatojuma paraugā, kas paņemts ar zobu suku nav atrodams *M. canis*. Maksimālajam ārstēšanas periodam nevajadzētu pārsniegt 16 nedēļas. Atkarībā no apmatojuma veida un garuma apsvērt dzīvnieka apmatojuma noskūšanas lietderību pirms ārstēšanas.

9. Ieteikumi pareizai lietošanai

Pilnībā saslapināt dzīvnieku ar tīru ūdeni un uzklāt šīs veterinārās zāles vairākās vietās uz dzīvnieka un iemasēt apmatojumā, īpaši ap lūpām, zem astes un starp kāju pirkstiem.

Lietot pietiekami daudz šampūna, lai saziepētu visu ādu un apmatojumu. Ļaut dzīvniekam pastāvēt 10 minūtes, pēc tam noskalot ar tīru ūdeni un ļaut dabiski nožūt siltā vietā, kur nav caurvēja. Ar 250 ml pudeli pietiek aptuveni 8-16 apstrādes reizēm 15 kg smagam sunim vai 5-10 apstrādes reizēm 25 kg smagam sunim, vai 25 apstrādes reizēm kaķim atkarībā no apmatojuma biezuma.

10. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neuzglabāt temperatūrā virs 30 °C.
Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši.

12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

13. Veterināro zāļu klasifikācija

Recepšu veterinārās zāles.

14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi

V/MRP/10/0002

Iepakojuma lielums: 250 ml

15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontakthinformācija:

Tirdzniecības atļaujas turētājs:
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Dānija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Genera d.d.
Svetonedeljska cesta 2
Kalinovica
10436 Rakov Potok
Horvātija

Vietējie pārstāvji un kontakthinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:
A/S Dimedium Latvija
Ozolu iela 28
Jaunmārupe, Mārupes novads
LV-2166, Latvija
+371 676 10001

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar tirdzniecības atļaujas turētāja vietējo pārstāvi.

17. Cita informācija

Malaseb® šampūns ir izstrādāts pēc Malaseb® tirdzniecības nosaukuma īpašnieka Dermcare- Vet Pty Ltd (Austrālija) licences.