

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

SEDAZIN, 20 mg/ml injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

ksilazino hidrochlorido, 23,3 mg (atitinka 20 mg ksilazino);

pagalbinių medžiagų iki 1 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Galvijai, arkliai, šunys ir katės.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Galvijams, arkliams, šunims ir katėms sedacijai sukelti, skausmui mažinti, raumenims atpalaiduoti bei premedikacijai.

Skyrus ksilaziną sujaudintiems gyvūnams, palengvėja jų tyrimas, vaistų sudavimas bei trumpalaikių chirurginių procedūrų atlikimas.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti gyvūnams, esant širdies aritmijai, hipotenzijai ir šokui.

Negalima naudoti gyvūnams, esant kvėpavimo sutrikimams.

Negalima naudoti patelėms vėlesnėse vaikingumo stadijose, išskyrus gimdymo metu.

Negalima naudoti sergantiems cukriniu diabetu gyvūnams (ksilazinas mažina insulino kiekį).

Negalima naudoti esant virškinimo trakto nepraeinamumui šunims ir katėms.

Naudoti atsargiai esant traukuliams, ūminiam inkstų bei kepenų funkcijų nepakankamumui.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Arkliams

Ksilazinas slopina žarnyno peristaltiką, todėl esant diegliams ksilaziną galima naudoti tik kai analgetinės medžiagos yra neefektyvios. Reikėtų vengti naudoti ksilaziną arkliams, sutrikus aklosios žarnos funkcijoms. Atsargiai vaitą reikia naudoti linkusiems sirgti laminitu. Arkliams, sergantiems kvėpavimo organų ligomis ar sutrikus jų funkcijoms, gali išsivystyti pavojingas gyvybei dusulys. Rekomenduotina skirti kiek įmanoma mažesnes dozes.

Šunims ir katėms

Ksilazinas slopina žarnyno peristaltiką, todėl rekomenduotina jo nenaudoti prieš skrandžio bei plonųjų žarnų rentgenografinį tyrimą, nes susikaupusios dujos gali iškreipti tyrimo rezultatus.

Plokščiasnukiams (brachicefaliniams) šunims, sergantiems kvėpavimo organų ligomis ar sutrikus jų funkcijoms, gali išsivystyti pavojingas gyvybei dusulys.

Galvijams

Ksilazinas slopina prieskrandžių motoriką, todėl galvijai gali išpusti. Rekomenduotina likus keliolikai valandų iki ksilazino naudojimo galvijams neduoti pašaro ir vandens.

Panaudojus ksilaziną, atsirūgimo, kosulio ir rijimo refleksai susilpnėja, todėl būtina stebėti prabundantį gyvulį ir jį laikyti gulintį ant krūtinės.

Galvijams rekomenduotina skirti mažas ir vidutines dozes.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Dozuojant reikia atsižvelgti į rūšinį gyvulių jautrumą.

Norint išvengti perdozavimo, būtina apskaičiuoti dozę, kuo tiksliau nustatant gyvulio svorį.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

4.6. Nepalankios reakcijos

Kvėpavimo funkcijos susilpnėjimas su lydinčia acidoze. Stambiams gyvuliams gali būti bradikardija, hipotenzija, ataksija, arkliais – gausus prakaitavimas, dažnesnis šlapinimasis.

Atrajotojams gali pasireikšti didžiojo prieskrandžio atonija, vidurių pūtimas, seilėtėkis, viduriavimas ir bradikardija.

Panaudojus ksilaziną, po 3–5 min. katės, dažniau nei šunys, gali pradėti vemti. Šunys ir katės kartais gali viduriuoti.

Sušvirkštus į raumenis ar po oda, gali atsirasti vietinės reakcijos, kurios paprastai pranyksta po 48 val.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Negalima vaisto naudoti vėliausioje vaikingumo stadijoje, nes ksilazinas gali sukelti išsimetimą.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Centrinę nervų sistemą slopinantys vaistai (analgetikai, anestetikai) sustiprina ksilazino poveikį.

Kardiodepresinis poveikis sustiprėja, o kvėpavimo sistemos darbas ir hipotenzinis poveikis gali susilpnėti. Todėl su opioidais ksilaziną naudoti reikia apdairiai.

Negalima ksilazino naudoti kartu su tiobarbitūratais ir halotanu, nes širdies ritmo sutrikimai suintensyvėja.

Ksilazino negalima naudoti kartu su adrenalinu ir kitais simpatinę nervų sistemą stimuliuojančiais vaistais ar netrukus po šių vaistų naudojimo, nes gali sukelti širdies aritmiją.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vaistą reikia švirkšti į raumenis, į veną ar po oda.

Galvijai	0,25–1,5 ml/100 kg kūno svorio (50–300 µg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis 0,08–0,5 ml/100 kg kūno svorio (16–100 µg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į veną
----------	--

Arkliai	7,5–15 ml/100 kg kūno svorio (1,5–3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis 3–5 ml/100 kg kūno svorio (0,6–1 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į veną
Šunys	0,15 ml/kg kūno svorio (3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis, po oda ar į veną
Katės	0,15 ml/kg kūno svorio (3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis ar po oda

Į veną vaistą reikia švirkšti lėtai, prieš tai jį pašildžius iki kūno temperatūros.
Dėl širdies aritmijos vaistą reikia naudoti kartu su atropinu.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Perdozavus sustiprėja nepalankių reakcijų poveikis: atsiranda kvėpavimo sustojimo bei kolapso pavojus, gali atsirasti traukulių priepuoliai.

Ksilazino poveikis dalinai gali būti nuslopintas naudojant α_2 -adrenoreceptorių antagonistus: į veną švirkščiant 0,1–0,2 mg/kg kūno svorio johimbino arba 0,5–1,0 mg/kg kūno svorio tolazolino.

4.11. Išlauka

Galvijienai ir arklienai – 0 parų.

Šunims ir katėms – netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: hipnozinės ir sedacinės medžiagos.

ATCvet kodas: QN05CM92.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Ksilazinas yra tiazino darinys. Jo raminantis ir skausmą malšinantis poveikis atsiranda dėl α_2 -adrenoreceptorių stimuliavimo centriniuose nervų sistemoje. Ksilazinas atpalaiduoja skeleto raumenis, nes slopina impulsų sklaidimą neuronais nugaros smegenyse.

Sušvirkštus į raumenis, ksilazinas pradeda veikti po 5–10 min., į veną – po 3–5 min.

Priklausomai nuo konkretaus gyvulio, skausmą malšinantis poveikis išlieka 10–15 min., raminantis – 0,5–4 val. Į raumenis sušvirkštas vaistas veikia ilgiau.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Sušvirkštas į raumenis ksilazinas greitai absorbuojamas į kraują. Pusinio pasiskirstymo laikas yra trumpas (1,2–6 min.), pusinės eliminacijos laikas siekia 20–50 min.

Ksilazinui būdingas didelis paskirstymo tūris. Sušvirkštus ksilazino į veną ar į raumenis, didelė jo koncentracija visuose organuose ir audiniuose pasiekama per keletą minučių.

Paskirstymo fazėje didžiausia ksilazino koncentracija būna inkstuose ir CNS.

Sušvirkštus vaistą, po kelių minučių didelė ksilazino koncentracija pasiekama taip pat kasoje, skydliaukėje, kepenyse.

Sušvirkšto į veną ksilazino pusinio pasiskirstymo laikas šunims ir katėms neviršija 6 min.

Metabolizmo tyrimais nustatyta, kad ksilazinas greitai metabolizuojamas I biotransformacijos stadijoje dalyvaujant kepenų monooksigenazių sistemai. Jis yra hidroksilinamas ir II biotransformacijos fazėje sujungtas su uridino difosfato gliukurono rūgštimi (angl. UDPGA) išskiriama į šlapimą.

Ksilazinas ir jo metabolitai pakankamai greitai išsiskiria iš organizmo. Nepriklausomai nuo naudojimo būdo, ksilazino pusinės eliminacijos laikas paprastai būna ne ilgesnis nei 3 val.

Sušvirkštus veršeliams bei pieninėms karvėms į raumenis ksilazino hidrochlorido 0,3 ir 0,6 mg/kg kūno svorio, po 8 val. kraujo plazmoje ksilazino neaptikta.

Daugiausia ksilazino pasišalina su šlapimu (apie 70 %) ir šiek tiek mažiau su išmatomis (apie 30 %).

Įrodyta, kad daugiausiai 1 proc. vaisto išskiriama su šlapimu nepakitusioje formoje.

Veršeliams skyrus ksilazino 0,2 ir 0,5 mg/kg kūno svorio, į šlapimą jis išskiriamas iki 6 val. , o jo metabolitai – iki 10 val. (ksilazino ir jo metabolitų nustatymo metodo jautrumas – 1,5 µg/l). Tyrimais, kuriuose buvo naudojamas radioaktyviai žymėtas ksilazinas, nustatyta, kad nei ksilazinas, nei jo metabolitai nesikaupia organizme.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Metilo parahidroksibenzoatas, natrio chloridas, injekcinis vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.
Negalima sušaldyti.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo hidrolitinio stiklo buteliukai po 20 ml ar 50 ml, užkimšti brombutilo gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais, kartoninėse dėžutėse po 1 vnt.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Biowet - Puławy Sp. z o.o.,
ul. Arciucha 2,
24-100 Puławy,
Lenkija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1890/001-002

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009-10-21.
Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2014-11-03.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2014-11-03

ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

SEDAZIN, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

ksilazino hidrochlorido 23,3 mg (atitinka 20 mg ksilazino).

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

20 ml

50 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys, katės, galvijai ir arkliai.

6. INDIKACIJA (-OS)

Galvijams, arkliams, šunims ir katėms sedacijai sukelti, skausmui mažinti, raumenims atpalaiduoti bei premedikacijai.

Skyrus ksilazina sujaudintiems gyvūnams, palengvėja jų tyrimas, vaistų sudavimas bei trumpalaikių chirurginių procedūrų atlikimas.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinę lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki
Atidarius būtina sunaudoti per 28 d.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.
Negalima sušaldyti.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Biowet - Puławy Sp. z o.o.,
ul. Arciucha 2,
24-100 Puławy,
Lenkija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1890/001
LT/2/09/1890/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
BUTELIUKAS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

SEDAZIN, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Ksilazino hidrochlorido, 23,3 mg. (atitinka 20 mg ksilazino).

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

50 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti į raumenis, į veną ar po oda.

5. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 28 d.

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
SEDAZIN, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą
Biowet - Puławy Sp. z o.o.,
ul. Arciucha 2,
24-100 Puławy,
Lenkija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

SEDAZIN, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:
ksilazino hidrochlorido 23,3 mg (atitinka 20 mg ksilazino);

pagalbinių medžiagų iki 1 ml.

4. INDIKACIJA (-OS)

Galvijams, arkliams, šunims ir katėms sedacijai sukelti, skausmui mažinti, raumenims atpalaiduoti bei premedikacijai.

Skyrus ksilazina sujaudintiems gyvūnams, palengvėja jų tyrimas, vaistų sudavimas bei trumpalaikių chirurginių procedūrų atlikimas.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti gyvūnams, esant širdies aritmijai, hipotenzijai ir šokui.

Negalima naudoti gyvūnams, esant kvėpavimo sutrikimams.

Negalima naudoti patelėms vėlesnėse vaikingumo stadijose, išskyrus gimdymo metu.

Negalima naudoti sergantiems cukriniu diabetu gyvūnams (ksilazinas mažina insulino kiekį).

Negalima naudoti esant virškinimo trakto nepraeinamumui šunims ir katėms.

Naudoti atsargiai esant traukuliams, ūminiam inkstų bei kepenų funkcijų nepakankamumui.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Kvėpavimo funkcijos susilpnėjimas su lydinčia acidoze. Stambiems gyvūnams gali būti bradikardija, hipotenzija, ataksija, arkliams – gausus prakaitavimas, dažnesnis šlapinimasis.

Atrajotojams gali pasireikšti didžiojo prieskrandžio atonija, vidurių pūtimas, seilėtėkis, viduriavimas ir bradikardija.

Panaudojus ksilazina, po 3–5 min. katės, dažniau nei šunys, gali pradėti vemti. Šunys ir katės kartais gali viduriuoti.

Sušvirkštus į raumenis ar po oda, gali atsirasti vietinės reakcijos, kurios paprastai pranyksta po 48 val.

Pastebėjus bet koki sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, arkliai, šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAI KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti į raumenis, į veną ar po oda.

Galvijai	0,25–1,5 ml/100 kg kūno svorio (50–300 µg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis 0,08–0,5 ml/100 kg kūno svorio (16–100 µg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į veną
Arkliai	7,5–15 ml/100 kg kūno svorio (1,5–3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis 3–5 ml/100 kg kūno svorio (0,6–1 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į veną
Šunys	0,15 ml/kg kūno svorio (3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis, po oda ar į veną
Katės	0,15 ml/kg kūno svorio (3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis ar po oda

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Į veną vaistą reikia švirkšti lėtai, prieš tai jį pašildžius iki kūno temperatūros.
Dėl širdies aritmijos vaistą reikia naudoti kartu su atropinu.

10. IŠLAUKA

Galvijienai ir arklienai– 0 parų.
Šunims ir katėms – netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.
Negalima sušaldyti.
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius buteliuką, – 28 d.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Arkliams

Ksilazinas slopina žarnyno peristaltiką, todėl esant diegliams ksilaziną galima naudoti tik kai analgetinės medžiagos yra neefektyvios. Reikėtų vengti naudoti ksilaziną arkliams, sutrikus aklosios žarnos funkcijoms. Atsargiai vaitą reikia naudoti linkusiems sirgti laminitu. Arkliams, sergantiems kvėpavimo organų ligomis ar sutrikus jų funkcijoms, gali išsivystyti pavojingas gyvybei dusulys. Rekomenduotina skirti kiek įmanoma mažesnes dozes.

Šunims ir katėms

Ksilazinas slopina žarnyno peristaltiką, todėl rekomenduotina jo nenaudoti prieš skrandžio bei plonųjų žarnų rentgenografinį tyrimą, nes susikaupusios dujos gali iškreipti tyrimo rezultatus.

Plokščiasnukiams (brachicefaliniams) šunims, sergantiems kvėpavimo organų ligomis ar sutrikus jų funkcijoms, gali išsivystyti pavojingas gyvybei dusulys.

Galvijams

Ksilazinas slopina prieskrandžių motoriką, todėl galvijai gali išpusti. Rekomenduotina likus keliolikai valandų iki ksilazino naudojimo galvijams neduoti pašaro ir vandens.

Panaudojus ksilaziną, atsirūgimo, kosulio ir rijimo refleksai susilpnėja, todėl būtina stebėti prabundantį gyvulį ir jį laikyti gulintį ant krūtinės.

Galvijams rekomenduotina skirti mažas ir vidutines dozes.

Dozuojant reikia atsižvelgti į rūšinį gyvulių jautrumą.

Norint išvengti perdozavimo, būtina apskaičiuoti dozę, kuo tiksliau nustatant gyvulio svorį.

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Negalima vaisto naudoti vėliausioje vaikingumo stadijoje, nes ksilazinas gali sukelti išsimetimą.

Centrinę nervų sistemą slopinantys vaistai (analgetikai, anestetikai) sustiprina ksilazino poveikį.

Kardiodepresinis poveikis sustiprėja, o kvėpavimo sistemos darbas ir hipotenzinis poveikis gali susilpnėti. Todėl su opioidais ksilaziną naudoti reikia apdairiai.

Negalima ksilazino naudoti kartu su tiobarbitūratais ir halotanu, nes širdies ritmo sutrikimai suintensyvėja.

Ksilazino negalima naudoti kartu su adrenalinu ir kitais simpatinę nervų sistemą stimuliuojančiais vaistais ar netrukus po šių vaistų naudojimo, nes gali sukelti širdies aritmiją.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2014-11-03

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.