

NOTICE

1. Nom du médicament vétérinaire

Regumate 4 mg/ml solution orale pour porcs

2. Composition

Par ml de solution orale :

Substance active :

Altrénogest 4,0 mg

Excipients :

Butylhydroxytoluène 0,07 mg

Hydroxyanisole butylé 0,07 mg

Solution limpide et jaune.

3. Espèces cibles

Porc (truie, nullipare).

4. Indications d'utilisation

Synchronisation œstrale des truies nullipares cycliques.

Synchronisation œstrale chez les truies primipares.

Augmentation du nombre de porcelets nés vivants à la prochaine portée chez les truies primipares.

5. Contre-indications

Ne pas utiliser chez les animaux mâles.

Ne pas utiliser chez les truies gestantes et les truies présentant une infection utérine.

6. Mises en gardes particulières

Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles :

Respectez scrupuleusement la posologie et la durée du traitement. Il est donc recommandé d'enregistrer le début du traitement pour chaque truie nullipare et/ou primipare. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une nutrition et un traitement individuels. En cas d'hébergement collectif, il est recommandé de laisser d'abord manger les animaux pendant un certain temps, puis d'ajouter le médicament vétérinaire à l'alimentation pour chaque truie nullipare et/ou primipare apart.

Une dose trop faible du médicament vétérinaire peut provoquer la formation de kystes au niveau des ovaires.

Les aliments non consommés doivent être retirés avec les autres aliments résiduels et ne doivent pas être donnés à d'autres animaux.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être ne doivent pas administrer le médicament vétérinaire.

Les femmes en âge de procréer doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Le médicament vétérinaire ne doit pas être manipulé par des personnes présentant des tumeurs progestérone-dépendantes ou des troubles thromboemboliques connus ou suspectés.

Évitez tout contact avec la peau et les yeux.

En cas de déversement accidentel sur la peau, il doit être immédiatement lavé à l'eau et au savon.

En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes.

Consultez un médecin.

Lors de l'utilisation du médicament vétérinaire, des vêtements de protection individuelle, tels que des gants résistant aux produits chimiques (par exemple des gants en nitrile) et une combinaison de travail, doivent être portés.

Le médicament vétérinaire peut pénétrer à travers des gants en latex ou d'autres types de gants poreux.

L'absorption à travers la peau peut être encore plus importante lorsque la peau est recouverte d'un matériau occlusif.

Se laver les mains après le traitement et avant de manger.

Effets d'une exposition répétée :

Une absorption accidentelle répétée peut entraîner une perturbation du cycle menstruel, des crampes utérines ou abdominales, une augmentation ou une diminution des menstruations, une prolongation de la grossesse ou des maux de tête.

Gestation et lactation :

Ne pas utiliser durant la gestation et la lactation.

Incompatibilités majeures :

Aucune connue.

Précautions particulières concernant la protection de l'environnement :

Lors de l'épandage du fumier d'animaux traités, la distance minimale par rapport aux eaux de surface, prévue par les réglementations nationales ou locales, doit être strictement respectée, car le fumier peut contenir de l'altrénogest qui peut avoir un effet néfaste sur le milieu aquatique.

7. Effets indésirables

Porc (cochettes sexuellement matures) :

Non connus.

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament. Si vous constatez des effets indésirables, même ceux ne figurant pas sur cette notice, ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez contacter en premier lieu votre vétérinaire. Vous pouvez également notifier tout effet indésirable au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en utilisant les coordonnées figurant à la fin de cette notice, ou par l'intermédiaire de votre système national de notification.

8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d'administration

Dosage : 5 ml.

Mode d'administration : Utiliser dans l'alimentation.

Truies primipares :

5 ml par voie orale avec de la nourriture pendant trois jours, à partir du jour du sevrage.

L'entrée en chaleur des truies primipares après le sevrage est fréquemment irrégulière.

La synchronisation des chaleurs chez les truies primipares peut être obtenue par l'administration orale de 5 ml du médicament vétérinaire pendant 3 jours consécutifs, à compter du jour du sevrage. La plupart des truies primipares entrent en chaleur 4 à 7 jours après la fin des trois jours de traitement et peuvent être inséminées. Cette méthode entraîne une augmentation du nombre de porcelets nés vivants dans la portée suivante et contribue à améliorer la productivité.

Truies nullipares cycliques :

Une dose de 5 ml avec de la nourriture doit être administrée à chaque truie nullipare pendant 18 jours consécutifs. L'administration peut commencer à tout moment pendant le cycle. Le résultat du traitement n'est pas influencé par le moment auquel le traitement est commencé.

La plupart des animaux entrent en œstrus le 5ème ou le 6ème jour après l'arrêt du traitement. Le traitement doit donc être débuté 23 jours avant la date à laquelle on souhaite que les premières truies nullipares soient en chaleur. Lorsque les animaux entrent en œstrus, ils peuvent être inséminés.

9. Indications nécessaires à une administration correcte

Ne pas agiter avant utilisation.

Bouteille de 1 litre et 540 ml :

Les bouteilles de 1 litre et 540 ml sont fournies avec un gobelet doseur de 25 ml dans lequel le dosage correct (5 ml) peut être mesuré.

10. Temps d'attente

Viande et abats: 9 jours.

11. Précautions particulières de conservation

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament vétérinaire ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 540 ml : 2 ans ;

1 litre : 3 ans.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire (bouteille) : 90 jours.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette après Exp.

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. Précautions particulières d'élimination

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Le médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car altrénogest peut mettre les poissons et autres organismes aquatiques en danger.

Utiliser des dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable. Ces mesures devraient contribuer à protéger l'environnement.

Demandez à votre vétérinaire ou à votre pharmacien comment éliminer les médicaments dont vous n'avez plus besoin.

13. Classification des médicaments vétérinaires

Médicament vétérinaire soumis à ordonnance.

14. Numéros d'autorisation de mise sur le marché et présentations

BE-V346446

Bouteille multidose de 540 ml et de 1 litre en aluminium, avec gobelet gradué.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

15. Date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois

Novembre 2024

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données de l'Union sur les médicaments (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Coordonnées

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Pays-Bas

Fabricant responsable de la libération des lots :

Intervet Productions S.A., Rue de Lyons, 27460 Igoville, France

Représentants locaux et coordonnées pour notifier les effets indésirables présumés :

MSD Animal Health Belgium

Tél: + 32 (0)2 370 94 01