

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

BRONIPRA-ND/IBD

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada dosis de vacuna (0,5 ml) contiene:

#### **Sustancias activas:**

Virus de la Enfermedad de Newcastle, inactivado cepa La Sota 1/1024 (*)	IHA	1/16-
Virus de la Bronquitis Infecciosa, inactivado cepa H52 (**)	SN:	2,4 - 16
Virus de la Enfermedad de Gumboro, inactivado cepa W2512: 13500(***)	ELISA:	357 -

(\*) IHA= Título de anticuerpos obtenido mediante inhibición de la hemoaglutinación.

(\*\*) SN = Título de anticuerpos anti IBV expresado en unidades sueroneutralizantes.

(\*\*\*) ELISA = Título de anticuerpos anti IBDV expresado en unidades ELISA.

#### **Adyuvante:**

Parafina líquida..... 224,50 mg

#### **Excipiente:**

Timerosal..... 0,05 mg

Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable.

### 4. DATOS CLÍNICOS

#### 4.1 Especies de destino

Aves, (gallinas ponedoras y reproductoras).

#### 4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Inmunización activa para prevenir la Bronquitis Infecciosa, la Enfermedad de Newcastle y la Enfermedad de Gumboro en gallinas ponedoras y reproductoras.

#### 4.3 Contraindicaciones

No procede

#### 4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino

No procede

#### 4.5 Precauciones especiales de uso

## **Precauciones especiales para su uso en animales**

Vacunar únicamente animales sanos.

### **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales**

#### **-Advertencias para el Usuario:**

Este producto contiene un aceite mineral. Su inyección accidental (autoinyección) puede provocar dolor agudo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o en un dedo y, ocasionalmente, podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona con urgencia atención médica.

En caso de inyectarse accidentalmente este producto, busque urgentemente atención médica, incluso si se ha inyectado una cantidad muy pequeña y lleve el prospecto consigo.

Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, solicite de nuevo atención médica.

#### **-Advertencias para el Médico:**

Este producto contiene un aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede causar una inflamación intensa, que podría ocasionar una necrosis isquémica e, incluso, la pérdida del dedo.

Es necesaria la atención médica experta e INMEDIATA, y puede ser preciso practicar tempranamente una incisión e irrigar la zona, especialmente si está afectada la yema del dedo o un tendón.

## **4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)**

Si la inoculación por vía subcutánea no es correcta y se realiza por vía intradérmica, puede producirse un edema regional de evolución favorable.

## **4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta**

Puede utilizarse durante la puesta.

## **4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

## **4.9 Posología y vía de administración**

La posología es de 1 dosis de 0,5 ml / ave.

El método de administración es por inyección intramuscular en la pechuga o subcutánea en la parte dorsal media del cuello.

En general, es aconsejable vacunar las pollitas reproductoras antes de la puesta (18 semanas), aunque bajo prescripción facultativa, la vacuna puede administrarse en cualquier momento durante la cría y recria, revacunando antes de la puesta (18 semanas).

Al ser una vacuna envasada en frascos multidosis es conveniente emplear toda la vacuna una vez empezado el frasco.

Agitar antes de usar.

Usar material estéril para su administración.  
Administrar la vacuna cuando esté a una temperatura de unos +15°C a +25°C.

#### **4.10 Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario**

La administración de más de dos dosis de vacuna puede provocar la aparición de un pequeño nódulo que persiste durante algunos días.

#### **4.11 Tiempo(s) de espera**

Cero días

### **5. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS**

Código ATCvet: QI01AA08

Grupo: (Avian infectious bronchitis virus vaccine + Avian infectious bursal (Gumboro) disease virus vaccine + Newcastle disease virus / paramyxovirus vaccine).

Para estimular la inmunidad activa frente a la Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Newcastle y Enfermedad de Gumboro.

### **6. DATOS FARMACÉUTICOS**

#### **6.1 Lista de excipientes**

Parafina líquida  
Polisorbato-80  
Monooleato de sorbitan  
Macrogol oleato  
Timerosal

#### **6.2 Incompatibilidades**

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos.

#### **6.3 Período de validez**

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años.  
Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato.

#### **6.4 Precauciones especiales de conservación**

Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). Proteger de la luz. No congelar.

#### **6.5 Naturaleza y composición del envase primario**

Viales de plástico de polietileno de alta densidad de 250 ml (500 dosis) y 500 ml (1000 dosis), tapones de elastómero polimérico tipo I y cápsulas de cierre de aluminio.

#### Formatos:

Caja con un vial de 500 dosis  
Caja con un vial de 1000 dosis

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

**6.6 Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

**7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Laboratorios Hipra, S.A.  
Avda. la Selva, 135.  
17170 Amer (Girona) España.  
Tel. (972) 430660 - Fax (972) 430661.  
E-mail: [hipra@hipra.com](mailto:hipra@hipra.com)

**8. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2297 ESP

**9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN O DE LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN**

Fecha de la primera autorización: 16/09/1988

Fecha de la última renovación: 30/03/2011

**10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO**

Mayo 2011

**PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO**

**Condiciones de dispensación:** Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**Condiciones de administración:** Administración bajo control o supervisión del veterinario