

## **OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

LIVACOX T, zawiesina doustna dla kur

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda dawka zawiera: **Substancje czynne:**

<i>Eimeria acervulina</i> , szczep Ch-p-72-89	300-500 oocyst
<i>Eimeria tenella</i> , szczep CH-E-A	300-500 oocyst
<i>Eimeria maxima</i> , szczep J-MN 82/88	300-500 oocyst

**Substancje pomocnicze:**

Chloramina B (1% roztwór)

### 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna

### 4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 x 10 ml (10x 1000 dawek)

10 x 50 ml (10 x 5000 dawek)

### 5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kura (*Gallus domesticus*), 1-10 dniowe kurczęta.

### 6. WSKAZANIA LECZNICZE

Zapobieganie kokcydiozie wywołanej przez *E. acervulina*, *E. maxima* i *E. tenella* u kur hodowanych w klatkach i na ściółce.

Utrzymująca się przez całe życie odporność przeciw w/w gatunkom kokcydiów rozwija się w ciągu 10-14 dni po szczepieniu.

### 7. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

W wodzie do picia lub przez rozpylenie. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

### 8. OKRES KARENCJI

Zero dni.

### 9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

### 10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP):

Zużyć natychmiast po rozcieńczeniu.

**11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze +2 do +8°C. Chronić przed światłem.  
Nie zamrażać. Unikać narażenia na wysokie temperatury (40°C i więcej).

**12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE**

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

**13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY**

Wyłącznie dla zwierząt.  
Wydawany z przepisu lekarza - Rp.  
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

**14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

BIOPHARM, Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs, a.s.  
Pohori-Chotoun 90, 254 49 Jilove u Prahy  
Czechy

**16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

182/95

**17. NUMER SERII**

Nr serii:

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**Butelka / 10 ml, 50 ml**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

LIVACOX T, zawiesina doustna dla kur

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)**

Każda dawka zawiera:

**Substancje czynne:** 300-500 atenuowanych oocyst kokcydiów *Eimeria acervulina*, *Eimeria tenella* i *Eimeria maxima*

**Substancje pomocnicze:**

Chloramina B (1% roztwór)

**3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
DAWEK**

10 ml = 1000 dawek

50 ml = 5000 dawek

**4. DROGA(-I) PODANIA**

W wodzie do picia lub przez rozpylenie. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**5. OKRES KARENCJI**

Zero dni.

**6. NUMER SERII**

Nr serii:

**7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

EXP:

Zużyć natychmiast po rozcieńczeniu.

**8. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

Na opakowaniu znajdują się dodatkowe informacje:

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

BIOPHARM, Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs, a.s.

Pohori-Chotoun 90, 254 49 Jilove u Prahy

Czechy

Doustna, trójwalentna, żywa atenuowana szczepionka dla kur przeciw kokcydiozie.

Przechowywać od +2 do +8°C. Nie zamrażać.