

PRILOG I.

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA PROIZVODA

1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

Felpreva otopina za nakapavanje za male mačke (1 - 2,5 kg)

Felpreva otopina za nakapavanje za srednje velike mačke (> 2,5 - 5 kg)

Felpreva otopina za nakapavanje za velike mačke (> 5 - 8 kg)

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatne tvari:

Svaki aplikator za nakapavanje sadrži:

Felpreva otopina za nakapavanje	Volumen jedinične doze [ml]	Tigolaner [mg]	Emodepsid [mg]	Prazikvantel [mg]
za male mačke (1 - 2,5 kg)	0,37	36,22	7,53	30,12
za srednje velike mačke (> 2,5 - 5 kg)	0,74	72,45	15,06	60,24
za velike mačke (> 5,0 - 8 kg)	1,18	115,52	24,01	96,05

Pomoćne tvari:

Kvalitativni sastav pomoćnih tvari i drugih sastojaka	Kvantitativni sastav ako su te informacije bitne za pravilnu primjenu veterinarskog lijeka
Butilhidroksianizol (E320)	2,63 mg/ml
Butilhidroksitoluen (E321)	1,10 mg/ml
Izopropiliden glicerol	
Laktatna kiselina	

Bistro žuta do crvena otopina.

Tijekom skladištenja može doći do promjene boje. Ta pojava ne utječe na kvalitetu proizvoda.

3. KLINIČKI PODATCI

3.1 Ciljne vrste životinja

Mačke.

3.2 Indikacije za primjenu za svaku ciljnu vrstu životinja

Za mačke s mješovitim parazitskim infestacijama/infekcijama ili rizikom od njih. Veterinarski lijek isključivo je indiciran kada su ektoparaziti, cestode i nematode ciljani istovremeno.

Ektoparaziti

- Za tretiranje infestacija buhama (*Ctenocephalides felis*) i krpeljima (*Ixodes ricinus*, *Ixodes holocyclus*) kod mačaka koje pruža neposrednu i trajnu aktivnost ubijanja buha u trajanju od 13 tjedana.
- Veterinarski lijek može se primjenjivati kao dio strategije liječenja za kontrolu dermatitisa

- uzrokovanog alergijom na buhe (FAD).
- Za liječenje blagih do umjerenih slučajeva notoedričke šuge (*Notoedres cati*).
- Za liječenje infestacija ušnim grinjama (*Otodectes cynotis*)

Gastrointestinalni oblici (nematode)

Za liječenje infekcija s:

- *Toxocara cati* (adultni i nezreli adultni stadiji, L4 i L3)
- *Toksaskaris leonina* (adultni i nezreli adultni stadiji i L4)
- *Ancylostoma tubaeforme* (adultni i nezreli adultni stadiji i L4)

Plućni crvi (nematode)

Za liječenje infekcija s:

- *Aelurostrongylus abstrusus* (adultni stadiji)
- *Troglostrongylus brevior* (adultni stadiji)

Trakavice (cestode)

Za liječenje infekcija trakavicama:

- *Dipylidium kaninum* (adultni i nezreli adultni stadiji)
- *Taenia taeniaeformis* (adultni stadiji)

3.3 Kontraindikacije

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

3.4 Posebna upozorenja

Ektoparaziti se moraju početi hraniti na domaćinu da bi postali izloženi tigolaneru, stoga se ne može isključiti rizik od prijenosa vektorskih bolesti.

Otpornost parazita na bilo koju vrstu antiparazitika uključujući u fiksnoj kombinaciji može se razviti nakon česte, ponovljene primjene antiparazitika ovih klasa pod specifičnim okolnostima. Primjena ovog veterinarskog lijeka treba se temeljiti na procjeni svakog pojedinog slučaja i na lokalnim epidemiološkim podacima o trenutačnoj osjetljivosti ciljnih vrsta kako bi se ograničila mogućnost buduće rezistencije.

Ako odmah nakon tretmana životinju šamponirate ili uronite u vodu, to može smanjiti učinkovitost proizvoda. Stoga se tretirane životinje ne smiju kupati dok se otopina ne osuši.

3.5 Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza za neškodljivu primjenu u ciljnih vrsta životinja:

U nedostatku dostupnih podataka, ne preporučuje se tretiranje mačića mlađih od 10 tjedana ili težine manje od 1 kg.

Ovaj veterinarski lijek namijenjen je topikalnoj primjeni i ne smije se primijeniti ni na bilo koji drugi način, primjerice oralno.

Nanesite samo na neoštećenu kožu. Primijeniti kao što je opisano u odjeljku 3.9 kako bi spriječili da životinja liže i proguta veterinarski lijek. Izbjegavati da tretirane mačke i druge mačke u domaćinstvu ližu mjesto primjene dok je mokro. Za znakove zabilježene nakon gutanja (npr. lizanjem), vidjeti odjeljak 3.6.

Proizvod može nadražiti oči. Ako dođe do slučajnog kontakta s okom, odmah isperite oči čistom vodom. U slučaju nadražaja oka, potražite savjet veterinara.

Nema podataka vezanih za primjenu veterinarskog lijeka na bolesnim i oslabljenim životinjama tako da se veterinarski lijek treba koristiti samo na temelju procjene koristi i rizika za te životinje.

Akutni znakovi upale pluća mogu se pojaviti nakon liječenja kao rezultat upalnog odgovora domaćina

na smrt plućnih crva *T. brevior*, osobito kod mladih mačaka.

Veterinarski lijek ne smije se primjenjivati u intervalima kraćim od 8 tjedana. Zbog aktivnosti proizvoda protiv buha i krpelja u razdoblju od 3 mjeseca s kliničkog stajališta, primjena proizvoda nije indicirana u intervalima kraćim od tri mjeseca.

Nema dostupnih podataka o neškodljivosti u ciljnih životinja za više od 4 uzastopna tretiranja te je vjerojatna akumulacija tigolanera. Ponovljeni tretmani trebali bi biti ograničeni na ograničene pojedinačne situacije prema procjeni koristi i rizika od strane odgovornog veterinara. Pogledajte odjeljke 3.10 i 4.3.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarski lijek u životinja

Veterinarski lijek može izazvati neurološke simptome i može privremeno povišiti razinu glukoze u krvi nakon slučajnog gutanja.

Nemojte pušiti, jesti niti piti za vrijeme primjene. Operite ruke nakon primjene.

Iskorišteni aplikatori trebaju se odmah odložiti te se ne bi smjeli ostaviti unutar pogleda i dohvata djece.

U slučaju nehotičnog kontakta sadržaja aplikatora s kožom, odmah isprati kožu sapunom i vodom.

Veterinarski lijek može nadražiti oči. Ako veterinarski lijek slučajno dođe u oči, treba ih dobro isprati s puno vode.

Ako se simptomi na koži ili očima nastave ili u slučaju nehotičnog gutanja, posebno kod djece, odmah potražite savjet liječnika i pokažite mu uputu o veterinarskom lijeku ili etiketu.

Budući da su u laboratorijskih životinja opisani određeni fetotoksični učinci, nakon izlaganja tigolaneru i emodepsidu, trudnice i žene koje namjeravaju zatrudnjeti trebaju nositi rukavice kako bi se izbjegao izravan kontakt s proizvodom.

Trudnice trebaju izbjegavati kontakt s mjestom primjene tijekom prva 24 sata nakon primjene proizvoda i sve dok tretirano područje više ne bude uočljivo. Djecu držite podalje od tretiranih životinja tijekom prva 24 sata nakon primjene proizvoda. Treba paziti da se djeci ne dopusti dugotrajan intenzivan kontakt s tretiranim mačkama sve dok tretirano područje više ne bude uočljivo. Preporučuje se životinje tretirati navečer. Na dan liječenja, ne smije se dopustiti da liječene životinje spavaju u istom krevetu sa svojim vlasnikom, osobito djecom i trudnicama.

Posebne mjere opreza za zaštitu okoliša:

Nije primjenjivo.

Ostale mjere opreza:

Veterinarski lijek može zaprljati ili oštetiti određene materijale, uključujući kožu, tkanine, plastiku i glazirane površine. Prije nego što omogućite kontakt s takvim materijalima, dopustite da se mjesto primjene osuši.

3.6 Štetni događaji

Mačke:

Često (1 do 10 životinja / 100 tretiranih životinja):	Promjene dlake (npr. kostriješenje) ¹
Rijetko (1 do 10 životinja / 10 000 tretiranih životinja):	Reakcija na mjestu primjene (npr. češanje, eritem, gubitak dlake, upala) ²
Vrlo rijetko	Poremećaji probavnog trakta (npr. prekomjerno

(< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):	slinjenje, povraćanje) ^{2,3} Neurološki poremećaji (npr. ataksija, tremor) Agitacija ⁴ , vokalizacija ⁴ Nedostatak apetita
---	--

¹ Kozmetički učinci, privremeni, na mjestu primjene

² Blago i prolazno

³ Nakon lizanja mjesta primjene odmah nakon tretiranja.

⁴ Nakon lizanja, u individualnim slučajevima

Važno je prijaviti štetne događaje. Time se omogućuje kontinuirano praćenje neškodljivosti veterinarskog lijeka. Prijave treba poslati, po mogućnosti putem veterinara, nositelju odobrenja za stavljanje u promet ili njegovom lokalnom predstavniku ili nacionalnom nadležnom tijelu putem nacionalnog sustava za prijavljivanje. Odgovarajuće podatke za kontakt možete pronaći u uputi o veterinarskom lijeku.

3.7 Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Graviditet i laktacija:

Fetotoksični učinci opisani su kod laboratorijskih životinja nakon izlaganja tigolaneru i emodepsidu. Neškodljivost ovog veterinarskog lijeka nije utvrđena kod mačaka za vrijeme graviditeta i laktacije stoga se njegova primjena ne preporučuje u tih životinja.

3.8 Interakcija s drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcije

Emodepsid je supstrat za P-glikoprotein. Istodobna primjena s drugim tvarima koje su supstrati/inhibitori P-glikoproteina (npr. ivermektin i drugi antiparazitski makrociklični laktoni, eritromicin, prednizolon i ciklosporin) može pojačati farmakokinetičke interakcije lijekova.

3.9 Putovi primjene i doziranje

Primjena nakapavanjem. Samo za vanjsku primjenu.

Kako bi se osiguralo ispravno doziranje, potrebno je što točnije odrediti tjelesnu težinu.

Doziranje

Preporučene minimalne doze su 14,4 mg tigolanera/kg tjelesne težine, 3 mg emodepsida/kg tjelesne težine, 12 mg prazikvantela/kg tjelesne težine odgovara 0,148 ml proizvoda/kg tjelesne težine.

Tjelesna težina mačke (kg)	Veličina aplikatora koja se koristi: Felpreva otopina za nakapavanje	Volumen jedinične doze (ml)	Tigolaner (mg/kg TT)	Emodepsid (mg/kg TT)	Prazikvantel (mg/kg TT)
1 - 2,5	za male mačke	0,37	14,5 - 36,2	3 - 7,5	12 - 30,1
2,6 - 5	za srednje velike mačke	0,74	14,5 - 27,9	3 - 5,8	12 - 23,2
5,1 - 8	za velike mačke	1,18	14,4 - 22,7	3 - 4,7	12 - 18,8
> 8	Upotrijebite odgovarajuću kombinaciju aplikatora				

Raspored tretiranja

Tretiranje je indicirano samo kada su istovremeno ciljani ektoparaziti, cestode i nematode. Ako nema mješovitih infekcija ili rizika od mješovitih infekcija, treba primijeniti odgovarajući antiparazitski lijek uskog spektra.

Buhe i krpelji

Veterinarski lijek ostaje aktivan protiv buha i krpelja u razdoblju od 13 tjedana. Ako je potrebno ponovno liječenje unutar 13 tjedana nakon primjene, treba koristiti odgovarajući proizvod uskog spektra.

Grinje

Za tretiranje ušnih grinja (*Otodectes cynotis*) i notoedričke šuge (*Notoedres cati*) treba primijeniti jednokratnu dozu veterinarskog lijeka.

Uspjeh liječenja i potrebu za ponovnim liječenjem odgovarajućim antiparazitskim proizvodom uskog spektra, treba odrediti veterinar koji provodi tretiranje nakon 4 tjedna.

Zbog pojedinačnih slučajeva preživjelih ušnih grinja i posljedičnog rizika od novog ciklusa otokarioze, veterinar bi trebao potvrditi uspješno liječenje 1 mjesec nakon primjene.

Gastrointestinalne nematode i trakavice

Za liječenje oblića i trakavica treba primijeniti jednu dozu veterinarskog lijeka. Potreba i učestalost ponovnog liječenja treba biti u skladu sa savjetom veterinara koji propisuje lijek i uzeti u obzir lokalnu epidemiološku situaciju kao i način života mačke.

Ako je potrebno ponovno liječenje unutar 3 mjeseca nakon primjene, treba koristiti odgovarajući proizvod uskog spektra.

Plućni crvi

Za tretiranje protiv plućnog crva *Aelurostrongylus abstrusus* i *Troglostrongylus brevior*, preporučuje se jedan tretman veterinarskim lijekom, nakon čega slijedi drugi tretman u razmaku od dva tjedna otopinom za nakapavanje za mačke koja sadrži 21,4 mg/ml emodepsida i 85,8 mg/ml prazikvantela jer ne postoji veterinarski lijek koji sadrži emodepsid kao jedinu djelatnu tvar.

Način primjene

Škarama (1) otvorite blister koji ima zaštitu za djecu. Razdvojite folije (2) i uklonite aplikator za nakapavanje iz ambalaže (3).



Držite aplikator u uspravnom položaju (4), zaokrenite i skinite poklopac (5) i upotrijebite suprotan kraj poklopca kako biste slomili zaštitnu foliju (6).



Razdijelite krzno na vratu mačke na dnu lubanje dok koža ne bude vidljiva (7). Stavite vrh aplikatora na kožu i čvrsto pritisnite nekoliko puta kako biste ispraznili sadržaj izravno na kožu (7). Primjena na bazi lubanje smanjit će mogućnost da mačka liže proizvod.



3.9 Simptomi predoziranja (i, ako je primjenjivo, hitni postupci i antidoti)

Nakon primjene 4 uzastopna tretmana do 5 puta maksimalne preporučene doze u mačića, počevši u dobi od 10 tjedana i odraslih mačaka, kod nekih mužjaka primijećeno je smanjenje težine štitnjače. Kod odraslih mačaka uočeno je prolazno povišenje jetrenih enzima (AST, ALT), praćeno multifokalnim oštećenjem jetre u jedne jedinke, u skupini s visokom dozom (5x) i povišenje kolesterola u svim skupinama koje su predozirane (3x, 5x). Nisu bili opaženi sustavni klinički znakovi. U skupini s visokom dozom (5x), pojavili su se slučajevi lokalnih reakcija na mjestu primjene (alopecija, eritem, hiperplazija epidermisa i/ili upalni infiltrati).

Nije poznat antidot.

3.10 Posebna ograničenja za primjenu i posebni uvjeti primjene, uključujući ograničenja primjene antimikrobnih i antiparazitskih veterinarskih lijekova kako bi se ograničio rizik od razvoja rezistencije

Nije primjenjivo.

3.11 Karencije

Nije primjenjivo.

4. FARMAKOLOŠKI PODATCI

4.1 ATCvet kôd: QP52AA51

4.2 Farmakodinamika

Tigolaner pripada kemijskoj klasi bispirazola. Tigolaner djeluje kao snažan inhibitor receptora neurotransmitera gama-aminobuterne kiseline (GABA). Tigolaner iskazuje veću funkcionalnu snagu za blokadu receptora insekata/akarina u usporedbi s receptorima sisavaca *in vitro*. On je akaricid i insekticid i učinkovit je protiv krpelja (*Ixodes ricinus*, *I. holocyclus*), buha *Ctenocephalides felis*) i grinja (*Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*) na mačkama.

Buhe na životinji prisutne prije primjene ugibaju u roku od 12 sati. Kod nove zaraze buhama, početak učinkovitosti je unutar 8 sati tijekom 2 mjeseca nakon primjene lijeka i unutar 24 sata nakon toga. Buhe i krpelji trebaju se pričvrstiti na domaćina i započeti hranjenje, kako bi mogli biti izloženi tigolaneru. Krpelji *Ixodes ricinus* koji su već na životinji prije primjene, ugibaju unutar 24 sata. Pri novoj infestaciji krpeljima *Ixodes ricinus*, oni ugibaju unutar 48 sati tijekom 13 tjedana.

Emodepsid je polusintetički spoj koji pripada kemijskoj skupini depsipeptida. Djelotvoran je protiv svih faza oblića (askarida i ankilostoma). U ovom proizvodu, emodepsid je odgovoran za učinkovitost protiv *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Aelurostrongylus abstrusus* i *Troglostrongylus brevior*.

Djeluje na neuromišićnom spoju stimulacijom presinaptičkih receptora iz skupine receptora sekretina, što rezultira paralizom i smrću parazita.

Prazikvantel je derivat pirazinoizokinolina učinkovit protiv trakavica *Dipylidium caninum* i *Taenia taeniaeformis*.

Prazikvantel se brzo apsorbira preko površine parazita i djeluje prvenstveno promjenom Ca^{++} propusnosti membrana kod parazita. To rezultira teškim oštećenjem kutikule, kontrakcije i paralize, poremećajem metabolizma i u konačnici dovodi do smrti parazita.

4.3 Farmakokinetika

Nakon jednokratne topikalne primjene veterinarskog lijeka na mačke, maksimalne koncentracije tigolanera u plazmi od 1,35 mg/l postignute su 12 dana nakon doziranja. Koncentracije tigolanera u plazmi opadale su sporije uz srednji poluživot od 24 dana. Emodepsid je postigao maksimalne koncentracije u plazmi od 0,044 mg/l 1,5 dan nakon doziranja.

Koncentracije emodepsida u plazmi opadale su uz srednji poluživot od 14,5 dana. Prazikvantel je postigao maksimalne koncentracije u plazmi od 0,048 mg/l već 5 sati nakon doziranja. Koncentracije prazikvantela u plazmi opadale su uz srednji poluživot od 10 dana. Individualne varijacije u koncentracijama u plazmi i poluživotu uočene su za sve tri tvari. Za tigolaner je pokazano značajno povećanje poluživota nakon ponovljenog doziranja, što je rezultiralo akumulacijom tigolanera nakon 4 uzastopna tretmana u mačaka.

Tigolaner i emodepsid slabo se metaboliziraju i uglavnom se izlučuju u izmetu. Bubrežni klirens je manje važan put eliminacije. Prazikvantel prolazi kroz značajan metabolizam u jetri i samo se tragovi izlučuju podjednako urinom i izmetom.

5. FARMACEUTSKI PODACI

5.1 Glavne inkompatibilnosti

Nisu poznate.

5.2 Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarskog lijeka kad je zapakiran za prodaju: 3 godine.

5.3. Posebne mjere pri čuvanju

Ovaj veterinarski lijek ne zahtijeva nikakve posebne temperature uvjete čuvanja.

Aplikator čuvajte u aluminijskom blisteru radi zaštite od vlage.

5.4 Vrsta i sastav unutarnjeg pakiranja

Bijeli polipropilenski aplikator s polipropilenskim poklopcem u aluminijskom blisteru.

Blister pakiranja u kartonskoj kutiji koja sadrže 1, 2, 10 ili 20 aplikatora (0,37 ml svaki).

Blister pakiranja u kartonskoj kutiji koja sadrže 1, 2, 10 ili 20 aplikatora (0,74 ml svaki).

Blister pakiranja u kartonskoj kutiji koja sadrže 1, 2, 10 ili 20 aplikatora (1,18 ml svaki).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5.5 Posebne mjere opreza u pogledu zbrinjavanja veterinarskih lijekova ili otpadnih materijala nastalih primjenom takvih proizvoda

Veterinarski lijekovi ne smiju se odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Veterinarski lijek ne smije dospjeti u vodene tokove jer tigolaner, emodepsid i prazikvantel mogu biti

opasni za ribe i druge vodene organizme.

Koristite programe vraćanja proizvoda za sve neiskorištene veterinarske lijekove ili otpadne materijale nastale njihovom primjenom u skladu s lokalnim propisima i svim nacionalnim sustavima prikupljanja primjenjivima na dotični veterinarski lijek.

6. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Vetoquinol S.A.

7. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/21/277/001-012

8. DATUM PRVOG ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11/11/2021

9. DATUM POSLJEDNJE REVIZIJE SAŽETKA OPISA SVOJSTAVA

{MM/GGGG}

10. KLASIFIKACIJA VETERINARSKIH LIJEKOVA

Veterinarski lijek izdaje se na veterinarski recept.

Detaljne informacije o ovom veterinarskom lijeku dostupne su u [Unijinoj bazi podataka o proizvodima](https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hr) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hr>).

PRILOG II.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Nema.

PRILOG III.

**OZNAČIVANJE I UPUTA O
VETERINARSKOM LIJEKU**

A. OZNAČIVANJE

PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kartonska kutija

1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

Felpreva otopina za nakapavanje za male mačke (1 - 2,5 kg)

Felpreva otopina za nakapavanje za srednje velike mačke (> 2,5 - 5 kg)

Felpreva otopina za nakapavanje za velike mačke (> 5 - 8 kg)

2. DJELATNE TVARI

Svaki aplikator za nakapavanje sadržava:

36,22 mg tigolanera/7,53 mg emodepsida/30,12 mg prazikvantela

72,45 mg tigolanera/15,06 mg emodepsida/60,24 mg prazikvantela

115,52 mg tigolanera/24,01 mg emodepsida/96,05 mg prazikvantela

3. VELIČINA PAKIRANJA

0,37 ml

0,74 ml

1,18 ml

1 aplikator

2 aplikatora

10 aplikatora

20 aplikatora

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke

1 - 2,5 kg

> 2,5 - 5 kg

> 5 - 8 kg

5. INDIKACIJE**6. PUTOVI PRIMJENE**

Primjena nakapavanjem.

7. KARENCIJE**8. ROK VALJANOSTI**

Exp. {mm/gggg}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Aplikator čuvajte u aluminijskom blisteru radi zaštite od vlage.

10. RIJEČI „PRIJE PRIMJENE PROČITAJTE UPUTU O VETERINARSKOM LIJEKU”

Prije primjene pročitajte uputu o veterinarskom lijeku.

11. RIJEČI „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

12. RIJEČI „ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

13. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Vetoquinol S.A.

14. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET)

EU/2/21/277/001 (36,22 mg + 7,53 mg + 30,12 mg, 1 aplikator)
EU/2/21/277/002 (36,22 mg + 7,53 mg + 30,12 mg, 2 aplikatora)
EU/2/21/277/003 (36,22 mg + 7,53 mg + 30,12 mg, 10 aplikatora)
EU/2/21/277/004 (36,22 mg + 7,53 mg + 30,12 mg, 20 aplikatora)

EU/2/21/277/005 (72,45 mg + 15,06 mg + 60,24 mg, 1 aplikator)
EU/2/21/277/006 (72,45 mg + 15,06 mg + 60,24 mg, 2 aplikatora)
EU/2/21/277/007 (72,45 mg + 15,06 mg + 60,24 mg, 10 aplikatora)
EU/2/21/277/008 (72,45 mg + 15,06 mg + 60,24 mg, 20 aplikatora)

EU/2/21/277/009 (115,52 mg + 24,01 mg + 96,05 mg, 1 aplikator)
EU/2/21/277/010 (115,52 mg + 24,01 mg + 96,05 mg, 2 aplikatora)
EU/2/21/277/011 (115,52 mg + 24,01 mg + 96,05 mg, 10 aplikatora)
EU/2/21/277/012 (115,52 mg + 24,01 mg + 96,05 mg, 20 aplikatora)

15. BROJ SERIJE

Lot {broj}

**OSNOVNI PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM
PAKIRANJIMA**

Blister

1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

Felpreva 1 - 2,5 kg
Felpreva > 2,5 - 5 kg
Felpreva > 5 - 8 kg



2. KVANTITATIVNI PODATCI O DJELATNIM TVARIMA

36.22 mg tigolaner/7.53 mg emodepside/30.12 mg praziquantel (EN)
72.45 mg tigolaner/15.06 mg emodepside/60.24 mg praziquantel (EN)
115.52 mg tigolaner/24.01 mg emodepside/96.05 mg praziquantel (EN)

3. BROJ SERIJE

Lot {broj}

4. ROK VALJANOSTI

Exp. {mm/gggg}

Logotip društva Vetoquinol

**OSNOVNI PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM
PAKIRANJIMA**

Aplikator za nakapavanje

1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

Felpreva 1 - 2,5 kg
Felpreva > 2,5 - 5 kg
Felpreva > 5 - 8 kg



2. KVANTITATIVNI PODATCI O DJELATNIM TVARIMA

0,37 ml
0,74 ml
1,18 ml

3. BROJ SERIJE

Lot {broj}

4. ROK VALJANOSTI

Exp. {mm/gggg}

Logotip društva Vetaquinol

B. UPUTA O VETERINARSKOM LIJEKU

UPUTA O VETERINARSKOM LIJEKU

1. Naziv veterinarskog lijeka

Felpreva otopina za nakapavanje za male mačke (1 - 2,5 kg)

Felpreva otopina za nakapavanje za srednje velike mačke (> 2,5 - 5 kg)

Felpreva otopina za nakapavanje za velike mačke (> 5 - 8 kg)

2. Sastav

Svaki aplikator za nakapavanje sadrži:

Felpreva otopina za nakapavanje	Volumen jedinичne doze [ml]	Tigolaner [mg]	Emodepsid [mg]	Prazikvantel [mg]
za male mačke (1 - 2,5 kg)	0,37	36,22	7,53	30,12
za male mačke (> 2,5 - 5 kg)	0,74	72,45	15,06	60,24
za velike mačke (> 5 - 8 kg)	1,18	115,52	24,01	96,05

Pomoćne tvari:

Butilhidroksianizol (E320) 2,63 mg/ml

Butilhidroksitoluen (E321) 1,10 mg/ml

Bistro žuta do crvena otopina.

Tijekom skladištenja može doći do promjene boje. Ta pojava ne utječe na kvalitetu proizvoda.

3. Ciljne vrste životinja

Mačke.

4. Indikacije za primjenu

Za mačke s mješovitim parazitskim infekcijama/infestacijama ili rizikom od njih. Veterinarski lijek isključivo je indiciran kada su ektoparaziti, cestode i nematode ciljani istovremeno.

Ektoparaziti

- Za tretiranje infestacija buhama (*Ctenocephalides felis*) i krpeljima (*Ixodes ricinus*, *Ixodes holocyclus*) kod mačaka koje pruža neposrednu i trajnu aktivnost ubijanja buha u trajanju od 13 tjedana. Veterinarski lijek može se primjenjivati kao dio strategije liječenja za kontrolu dermatitisa uzrokovanog alergijom na buhe (FAD).
- Za liječenje blagih do umjerenih slučajeva notoedričke šuge (uzrokovane s *Notoedres cati*).
- Za liječenje infestacija ušnim grinjama (*Otodectes cynotis*)

Gastrointestinalni oblići (nematode)

- Za liječenje infekcija s:
- *Toxocara cati* (adultni i nezreli adultni stadiji, L4 i L3)
- *Toksaskaris leonina* (adultni i nezreli adultni stadiji i L4)
- *Ancylostoma tubaeforme* (adultni i nezreli adultni stadiji i L4)

Plućni crvi (nematode)

- Za liječenje infekcija s:
- *Aelurostrongylus abstrusus* (adultni stadiji)
- *Troglostrongylus brevior* (adultni stadiji)

Trakavice (cestode)

- Za liječenje infekcija trakavicama:
- *Dipylidium kaninum* (adultni i nezreli adultni stadiji)
- *Taenia taeniaeformis* (adultni stadiji)

5. Kontraindikacije

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

6. Posebna upozorenja

Posebna upozorenja:

Ektoparaziti se moraju početi hraniti na domaćinu da bi postali izloženi tigoalaneru, stoga se ne može isključiti rizik od prijenosa vektorskih bolesti.

Otpornost parazita na bilo koju vrstu antiparazitika uključujući u fiksnoj kombinaciji može se razviti nakon česte, ponovljene primjene antiparazitika ovih klasa pod specifičnim okolnostima. Primjena ovog veterinarskog lijeka treba se temeljiti na procjeni svakog pojedinog slučaja i na lokalnim epidemiološkim podacima o trenutačnoj osjetljivosti ciljnih vrsta kako bi se ograničila mogućnost buduće rezistencije.

Ako odmah nakon tretmana životinju šamponirate ili uronite u vodu, to može smanjiti učinkovitost proizvoda. Stoga se tretirane životinje ne smiju kupati dok se otopina ne osuši.

Posebne mjere opreza za neškodljivu primjenu u ciljnih vrsta životinja:

U nedostatku dostupnih podataka, ne preporučuje se tretiranje mačića mlađih od 10 tjedana ili težine manje od 1 kg.

Ovaj veterinarski lijek namijenjen je topikalnoj primjeni i ne smije se primijeniti ni na bilo koji drugi način, primjerice oralno.

Nanesite samo na neoštećenu kožu. Primijenite kako je opisano pod „Savjeti o pravilnoj primjeni”, kako bi se spriječilo da životinja liže i proguta veterinarski lijek. Izbjegavati da tretirane mačke i druge mačke u domaćinstvu ližu mjesto primjene dok je mokro. Za znakove zabilježene nakon gutanja (npr. lizanjem), vidjeti odjeljak „Štetni događaji”.

Proizvod može nadražiti oči. Ako dođe do slučajnog kontakta s okom, odmah isperite oči čistom vodom. U slučaju nadražaja oka, potražite savjet veterinara.

Nema podataka vezanih za primjenu veterinarskog lijeka na bolesnim i oslabljenim životinjama tako da se veterinarski lijek treba koristiti samo na temelju procjene koristi i rizika za te životinje.

Akutni znakovi upale pluća mogu se pojaviti nakon liječenja kao rezultat upalnog odgovora domaćina na smrt plućnih crva *T. brevior*, osobito kod mladih mačaka.

Veterinarski lijek ne smije se primjenjivati u intervalima kraćim od 8 tjedana. Zbog aktivnosti proizvoda protiv buha i krpelja u razdoblju od 3 mjeseca s kliničkog stajališta, primjena proizvoda nije indicirana u intervalima kraćim od tri mjeseca.

Nema dostupnih podataka o neškodljivosti ciljnih životinja za više od 4 uzastopna tretiranja te je akumulacija tigolanera vjerojatna. Ponovljeni tretmani trebali bi biti ograničeni na ograničene pojedinačne situacije prema procjeni koristi i rizika od strane odgovornog veterinara. Pogledajte odjeljak „Predoziranje”.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarski lijek u životinja:

Veterinarski lijek može izazvati neurološke simptome i može privremeno povišiti razinu glukoze u krvi nakon slučajnog gutanja.

Nemojte pušiti, jesti niti piti za vrijeme primjene. Operite ruke nakon primjene.

Iskorišteni aplikatori trebaju se odmah odložiti te se ne bi smjeli ostaviti unutar pogleda i dohvata djece.

U slučaju nehotičnog kontakta sadržaja aplikatora s kožom, odmah isprati kožu sapunom i vodom.

Veterinarski lijek može nadražiti oči. Ako veterinarski lijek slučajno dođe u oči, treba ih dobro isprati s puno vode.

Ako se simptomi na koži ili očima nastave ili u slučaju nehotičnog gutanja, posebno od strane djece, odmah potražite savjet liječnika i pokažite mu uputu o veterinarskom lijeku ili etiketu.

Budući da su u laboratorijskim životinja opaženi određeni fetotoksični učinci, nakon izlaganja tigolaneru i emodepsidu, trudnice i žene koje namjeravaju zatrudnjeti trebaju nositi rukavice kako bi se izbjegao izravan kontakt s proizvodom.

Trudnice trebaju izbjegavati kontakt s mjestom primjene tijekom prva 24 sata nakon primjene proizvoda i sve dok tretirano područje više ne bude uočljivo. Djecu držite podalje od tretiranih životinja tijekom prva 24 sata nakon primjene proizvoda. Treba paziti da se djeci ne dopusti dugotrajan intenzivan kontakt s tretiranim mačkama sve dok tretirano područje više ne bude uočljivo. Preporučuje se životinje tretirati navečer. Na dan liječenja, ne smije se dopustiti da liječene životinje spavaju u istom krevetu sa svojim vlasnikom, osobito djecom i trudnicama.

Ostale mjere opreza:

Veterinarski lijek može zaprljati ili oštetiti određene materijale, uključujući kožu, tkanine, plastiku i glazirane površine. Prije nego što omogućite kontakt s takvim materijalima, dopustite da se mjesto primjene osuši.

Graviditet i laktacija:

Fetotoksični učinci opisani su kod laboratorijskih životinja nakon izlaganja tigolaneru i emodepsidu. Neškodljivost ovog veterinarskog lijeka nije utvrđena kod mačaka za vrijeme graviditeta i laktacije stoga se njegova primjena ne preporučuje u tih životinja.

Interakcija s drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcije:

Emodepsid je supstrat za P-glikoprotein. Istodobna primjena s drugim tvarima koje su supstrati/inhibitori P-glikoproteina (npr. ivermektin i drugi antiparazitski makrociklični laktoni, eritromicin, prednizolon i ciklosporin) može pojačati farmakokinetičke interakcije lijekova.

Predoziranje:

Nakon primjene 4 uzastopna tretmana do 5 puta maksimalne preporučene doze u mačica počevši u dobi od 10 tjedana i odraslih mačaka, kod nekih mužjaka primijećeno je smanjenje težine štitnjače. Kod odraslih mačaka uočeno je prolazno povišenje jetrenih enzima (AST, ALT), praćeno multifokalnim oštećenjem jetre u jedne jedinke, u skupini s visokom dozom (5x) i povišenje kolesterola u svim skupinama koje su predozirane (3x, 5x). Nisu bili opaženi sustavni klinički znakovi. U skupini s visokom dozom (5x), pojavili su se slučajevi lokalnih reakcija na mjestu primjene (alopecija, eritem, hiperplazija epidermisa i/ili upalni infiltrati).

Nije poznat antidot.

7. Štetni događaji

Mačke:

Često (1 do 10 životinja / 100 tretiranih životinja):	Promjene dlake (npr. kostriješenje) ¹
Rijetko (1 do 10 životinja / 10 000 tretiranih životinja):	Reakcija na mjestu primjene (npr. češanje, crvenilo, gubitak dlake, upala) ²
Vrlo rijetko (< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):	Poremećaji probavnog trakta (npr. prekomjerno slinjenje, povraćanje) ^{2,3} Neurološki poremećaji (npr. nekoordiniranost, tremor) Agitacija ⁴ , vokalizacija ⁴ Nedostatak apetita ⁴

¹ Kozmetički učinci, privremeni, na mjestu primjene

² Blago i prolazno

³ Nakon lizanja mjesta primjene odmah nakon tretiranja

⁴ Nakon lizanja, u individualnim slučajevima

Važno je prijaviti štetne događaje. Time se omogućuje kontinuirano praćenje neškodljivosti proizvoda. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, čak i onu koja nije navedena u ovoj uputi o veterinarskom lijeku, ili mislite da veterinarski lijek nije djelovao, obratite se prvo veterinaru. Štetne događaje možete prijaviti i nositelju odobrenja za stavljanje u promet ili njegovom lokanom predstavniku koristeći se podacima za kontakt na kraju ove upute ili putem nacionalnog sustava za prijavljivanje: {podatci o nacionalnom sustavu}.

8. Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, putovi i način primjene

Primjena nakapavanjem. Samo za vanjsku primjenu.

Doziranje

Preporučene minimalne doze su 14,4 mg tigolanera/kg tjelesne težine, 3 mg emodepsida/kg tjelesne težine, 12 mg prazikvantela/kg tjelesne težine što je ekvivalentno 0,148 ml veterinarskog lijeka/kg tjelesne težine.

Tjelesna težina mačke (kg)	Veličina aplikatora koja se koristi: Felpreva otopina za nakapavanje	Volumen jedinične doze (ml)	Tigolaner (mg/kg TT)	Emodepsid (mg/kg TT)	Prazikvantel (mg/kg TT)
1,0 - 2,5	za male mačke	0,37	14,5 - 36,2	3 - 7,5	12 - 30,1
2,6 - 5,0	za srednje velike mačke	0,74	14,5 - 27,9	3 - 5,8	12 - 23,2
5,1 - 8,0	za velike mačke	1,18	14,4 - 22,7	3 - 4,7	12 - 18,8
> 8,0	Upotrijebite odgovarajuću kombinaciju aplikatora				

Raspored tretiranja

Tretiranje je indicirano samo kada su istovremeno ciljani ektoparaziti, cestode i nematode. Ako nema mješovitih infekcija ili rizika od mješovitih infekcija, treba primijeniti odgovarajući antiparazitski lijek uskog spektra.

Buhe i krpelji

Veterinarski lijek ostaje aktivan protiv buha i krpelja u razdoblju od 13 tjedana. Ako je potrebno ponovno liječenje unutar 13 tjedana nakon primjene, treba koristiti odgovarajući proizvod uskog spektra.

Grinje

Za liječenje ušnih grinja (*Otodectes cynotis*) i notoedričke šuge (*Notoedres cati*), potrebno je primijeniti jednokratnu dozu veterinarskog lijeka.

Uspjeh liječenja i potrebu za ponovnim liječenjem odgovarajućim antiparazitskim proizvodom uskog spektra, treba odrediti veterinar koji provodi tretiranje nakon 4 tjedna.

Zbog pojedinačnih slučajeva preživjelih ušnih grinja i posljedičnog rizika od novog ciklusa otokarioze, veterinar bi trebao potvrditi uspješno liječenje 1 mjesec nakon primjene.

Gastrointestinalne nematode i trakavice

Za liječenje oblića i trakavica treba primijeniti jednu dozu veterinarskog lijeka. Potreba i učestalost ponovnog liječenja treba biti u skladu sa savjetom veterinara koji propisuje lijek i uzeti u obzir lokalnu epidemiološku situaciju kao i način života mačke.

Ako je potrebno ponovno liječenje unutar 3 mjeseca nakon primjene, treba koristiti odgovarajući proizvod uskog spektra.

Plućni crvi

Za tretiranje protiv plućnog crva *Aelurostrongylus abstrusus* i *Troglostrongylus brevior*, preporučuje se jedan tretman veterinarskim lijekom, nakon čega slijedi drugi tretman u razmaku od dva tjedna otopinom za nakapavanje za mačke koja sadrži 21,4 mg/ml emodepsida i 85,8 mg/ml prazikvantela jer ne postoji veterinarski lijek koji sadrži emodepsid kao jedinu djelatnu tvar.

9. SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Škarama (1) otvorite blister koji ima zaštitu za djecu. Razdvojite folije (2) i uklonite aplikator za nakapavanje iz ambalaže (3).



Držite aplikator u uspravnom položaju (4), zaokrenite i skinite poklopac (5) i upotrijebite suprotan kraj poklopca kako biste slomili zaštitnu foliju (6).



Razdjelite krzno na vratu mačke na dnu lubanje dok koža ne bude vidljiva (7). Stavite vrh aplikatora

na kožu i čvrsto pritisnite nekoliko puta kako biste ispraznili sadržaj izravno na kožu (7). Primjena na bazi lubanje smanjit će mogućnost da mačka liže proizvod.



10. Karencije

Nije primjenjivo.

11. Posebne mjere čuvanja

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj veterinarski lijek ne zahtijeva nikakve posebne temperaturne uvjete čuvanja.

Aplikator čuvajte u aluminijskom blisteru radi zaštite od vlage.

Ne koristite ovaj veterinarski lijek nakon isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi i kutiji nakon Exp. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

12. Posebne mjere za zbrinjavanje

Veterinarski lijekovi ne smiju se odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Ovaj veterinarski lijek ne smije dospjeti u vodene tokove jer tigolaner, emodepsid i prazikvantel mogu biti opasni za ribe i druge vodene organizme.

Koristite programe vraćanja proizvoda za sve neiskorištene veterinarske lijekove ili otpadne materijale nastale njihovom primjenom u skladu s lokalnim propisima i svim nacionalnim sustavima prikupljanja. Te bi mjere trebale pomoći u zaštiti okoliša.

Pitajte veterinara ili ljekarnika kako odlagati veterinarske lijekove koji vam više nisu potrebni.

13. Klasifikacija veterinarskih lijekova

Veterinarski lijek izdaje se na veterinarski recept,

14. Brojevi odobrenja za stavljanje u promet i veličine pakiranja

EU/2/21/277/001-012

Bijeli polipropilenski aplikator s polipropilenskim poklopcem u aluminijskom blisteru.

Blister pakiranja u kartonskoj kutiji koja sadrže 1, 2, 10 ili 20 aplikatora (0,37 ml svaki).

Blister pakiranja u kartonskoj kutiji koja sadrže 1, 2, 10 ili 20 aplikatora (0,74 ml svaki).

Blister pakiranja u kartonskoj kutiji koja sadrže 1, 2, 10 ili 20 aplikatora (1,18 ml svaki).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

15. Datum posljednje revizije upute o veterinarskom lijeku

{MM/GGGG}

Detaljne informacije o ovom veterinarskom lijeku dostupne su u [Unijinoj bazi podataka o proizvodima \(https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hr\)](https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hr).

16. Podatci za kontakt:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francuska

Proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

VETOQUINOL BOWET Sp. z o.o.
Żwirowa 140
66-400 Gorzów Wlkp.,
Poljska

Lokalni predstavnici i podatci za kontakt za prijavu sumnji na štetne događaje:

België/Belgique/Belgien

Vetoquinol NV/SA
Galileilaan 11/401
BE-2845 Niel
Tél/Tel: +32 3 877 44 34

Lietuva

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Prancūzija
Tel: +33 3 84 62 55 55

Република България

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Франция
Тел: +33 3 84 62 55 55

Luxembourg/Luxemburg

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
France
Tél/Tel: +33 3 84 62 55 55

Česká republika

Vetoquinol s.r.o.
Walterovo náměstí 329/3
CZ 158 00 Praha 5
Tel: + 420 703 147 085

Magyarország

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Franciaország
Tel.: +33 3 84 62 55 55

Danmark

Equidan Vetline
Baggeskærvej 56
DK - 7400 Herning
Tlf: +45 96 81 40 00

Malta

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Franza
Tel: +33 3 84 62 55 55

Deutschland

Vetoquinol GmbH
Reichenbachstraße 1
DE-85737 Ismaning
Tel: +49 89 999 79 74 0

Eesti

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Prantsusmaa
Tel: +33 3 84 62 55 55

Ελλάδα

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Γαλλία
Τηλ: +33 3 84 62 55 55

España

Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A.
Carretera de Fuencarral, nº 24, Edificio Europa
ES-28108 Madrid
Tel: +34 914 90 37 92

France

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
France
Tél: +33 3 84 62 55 55

Hrvatska

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francuska
Tel: +33 3 84 62 55 55

Ireland

Vetoquinol Ireland Limited
12 Northbrook Road
D06 E8W5 Dublin 6- IE
Tel: +44 1280 814 500

Ísland

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Frakkland
Sími: +33 3 84 62 55 55

Nederland

Vetoquinol B.V.
Postbus 9202
NL-4801 LE Breda
Tel: +31 10 498 00 79

Norge

VetPharma A/S
Ravnsborgveien 31
N-1395 Hvalstad
Tlf: +47 66 98 60 40

Österreich

Vetoquinol Österreich GmbH
Gußhausstraße 14/5
A-1040 Wien
Tel: +43 1 416 39 10

Polska

Vetoquinol Biowet Sp.z.o.o
Kosynierów Gdyńskich
PL - 13-14 Gorzów Wielkopolski
Tel.: +48 95 728 55 00

Portugal

Vetoquinol Unipessoal Lda.
Rua Amílcar Cabral nº7, 3ºPiso, Sala 5
Aigualva
PT-2735-534 Aigualva-Cacém
Tel: +351 961 224 942

România

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Franța
Tel: +33 3 84 62 55 55

Slovenija

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francija
Tel: +33 3 84 62 55 55

Slovenská republika

Vetoquinol s.r.o.
Walterovo náměstí 329/3
CZ 158 00 Praha 5
Tel: + 420 703 147 085

Italia

Vetoquinol Italia S.r.l.
Via Luigi Galvani 18
Forlì, FC
IT-CAP 47122
Tel: +39 0543 46 24 11

Suomi/Finland

ORION PHARMA Eläinlääkkeet
PL/PB 425,
FI-20101 Turku/Åbo
Puh/Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Γαλλία
Τηλ: +33 3 84 62 55 55

Sverige

Vetoquinol Scandinavia AB
Box 9
SE-265 21 ÅSTORP
Tel: +46 42 676 03

Latvija

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francija
Tel: +33 3 84 62 55 55

United Kingdom (Northern Ireland)

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
France
Tel: +33 3 84 62 55 55

17. Ostale informacije

Tigolaner pripada kemijskoj klasi bispirazola. Tigolaner djeluje kao snažan inhibitor receptora neurotransmitera gama-aminobuterne kiseline (GABA). Tigolaner iskazuje veću funkcionalnu snagu za blokadu receptora insekata/akarina u usporedbi s receptorima sisavaca. To je akaricid i insekticid i učinkovit je protiv krpelja (*Ixodes ricinus*, *I. holocyclus*), buha (*Ctenocephalides felis*) i grinja (*Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*) na mačkama.

Buhe na životinji prisutne prije primjene ugibaju u roku od 12 sati. Kod nove zaraze buhama, početak učinkovitosti je unutar 8 sati tijekom 2 mjeseca nakon primjene lijeka i unutar 24 sata nakon toga. Buhe i krpelji trebaju se pričvrstiti na domaćina i započeti hranjenje, kako bi mogli biti izloženi tigolaneru. Krpelji *Ixodes ricinus* koji su već na životinji prije primjene, ugibaju unutar 24 sata. Pri novoj infestaciji krpeljima *Ixodes ricinus*, oni ugibaju unutar 48 sati tijekom 13 tjedana.

Emodepsid je polusintetički spoj koji pripada kemijskoj skupini depsipectida. Djelotvoran je protiv svih faza oblića (askarida i ankilostoma). U ovom proizvodu, emodepsid je odgovoran za učinkovitost protiv *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Aelurostrongylus abstrusus* i *Troglostrongylus brevior*.

Djeluje na neuromišićnom spoju stimulacijom presinaptičkih receptora iz skupine receptora sekretina, što rezultira paralizom i smrću parazita.

Prazikvantel je derivat pirazinoizokinolina učinkovit protiv trakavica *Dipylidium caninum* i *Taenia taeniaeformis*.

Prazikvantel se brzo apsorbira preko površine parazita i djeluje prvenstveno promjenom Ca^{++} propusnosti membrana kod parazita. To rezultira teškim oštećenjem kutikule, kontrakcije i paralize, poremećajem metabolizma i u konačnici dovodi do smrti parazita.

[Informacije koje treba staviti na vrh upute o veterinarskom lijeku]

Poštovani vlasniče mačke,

Vašoj je mački propisan proizvod Felpreva, odobreni veterinarski lijeka za mačke. Ova uputa o veterinarskom lijeku sadrži vrijedne informacije za korištenje i primjenu proizvoda Felpreva. Pažljivo pročitajte ovu uputu o veterinarskom lijeku i slijedite upute.