

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

TUBOSTRZYKAWKA DOWYMIENIOWA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Rilexine DC 375 mg zawiesina dowymieniowa dla krów w okresie zasuszenia

cefaleksyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Każda tubostrzykawka dowymieniowa o pojemności 8 g zawiera:
Cefaleksyna 375 mg (co odpowiada 500 mg cefaleksyny benzatynowej)

**3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
DAWEK**

8 g

4. DROGA(-I) PODANIA

Podanie dowymieniowe

5. OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne: 4 dni

Mleko:

- 12 godzin po wycieleniu, gdy okres zasuszenia jest dłuższy niż 42 dni
- 42,5 dnia po podaniu produktu, gdy okres zasuszenia wynosi 42 dni lub mniej

6. NUMER SERII

Lot: {numer}

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP: {miesiąc/rok}

8. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

**PUDEŁKO TEKSTUROWE ZAWIERAJĄCE 12, 24 LUB 60 TUBOSTRZYKAWEK
DOWYMIIENIOWYCH I CHUSTECZEK DO OCZYSZCZANIA STRZYKÓW**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Rilexine DC 375 mg zawiesina dowymieniowa dla krów w okresie zasuszenia

cefaleksyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tubostrzykawka dowymieniowa o pojemności 8 g zawiera:
Cefaleksyna 375 mg (co odpowiada 500 mg cefaleksyny benzatynowej)

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina dowymieniowa

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

8 g

12 tubostrzykawk dowymieniowych i 12 chusteczek do oczyszczania strzyków
24 tubostrzykawki dowymieniowe i 24 chusteczki do oczyszczania strzyków
60 tubostrzykawk dowymieniowych i 60 chusteczek do oczyszczania strzyków

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie zasuszenia)

6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

Jednorazowe podanie dowymieniowe

Przed rozpoczęciem podawania produktu należy krowę dokładnie wydoić. Przed podaniem produktu leczniczego należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować strzyki, używając do tego celu dołączonej chusteczki do oczyszczania strzyków, oraz należy uważać, aby nie zanieczyścić końcówki strzykawki. Podać całą zawartość strzykawki do każdej ćwiartki gruczołu mlekowego. Po podaniu wymasować. Po podaniu produktu zaleca się zanurzenie strzyku w atestowanym płynie odkażającym. Nie doić po podaniu produktu.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne: 4 dni

Mleko:

- 12 godzin po wycieleniu, gdy okres zasuszenia jest dłuższy niż 42 dni
- 42,5 dnia po podaniu produktu, gdy okres zasuszenia wynosi 42 dni lub mniej

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Penicyliny i cefalosporyny mogą w niektórych przypadkach powodować silne reakcje alergiczne. Ostrzeżenia dla użytkowników znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP): {miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC

1ère avenue – 2065m – LID

06516 Carros
FRANCJA

16. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia:

17. NUMER SERII

Nr serii (Lot): {numer}