

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Propalin 40 mg/ml, sirupas šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml sirupo yra:

veikliosios medžiagos:

fenilpropanolamino 40,28 mg
(prilygsta 50 mg fenilpropanolamino hidrochlorido)

pagalbinių medžiagų:

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p

3. VAISTO FORMA

Sirupas.

Bespalvis arba šiek tiek gelsvai rudas tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Kalėms gydyti, esant šlapimo nelaikymui dėl šlaplės sfinkterio nepakankamumo. Vaisto veiksmingumas nustatytas tik kalėms, kurioms atlikta ovariohisterektomija.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti netinkamo šlapinimosi atvejais, susijusiais su elgsena. Negalima naudoti šunims, kurie gydomi neselektyviais monoaminooksidazės inhibitoriais. Negalima naudoti, jei yra žinoma, kad gyvūnui yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4. Specialieji išpėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Dėl labai mažų dozių ir siekiant išvengti perdozavimo pavojaus, gyvūną reikia pasverti ir laikytis rekomenduojamų dozių.

Fenilpropanolaminas, simpatikomimetinio poveikio vaistas, gali paveikti širdies-kraujagyslių sistemą, ypač kraujospūdį ir širdies susitraukimų dažnį, todėl turėtų būti apdairiai naudojamas gyvūnams, sergantiems širdies-kraujagyslių ligomis.

Atsargumo turi būti imtasi gydant gyvūnus, sergančius sunkiu inkstų ar kepenų nepakankamumu, cukriniu diabetu, hiperadrenokorticismu, glaukoma, hipertirodizmu ir kitomis medžiagų apykaitos ligomis.

Prieš pradėdant gydymą, turėtų būti įvertinti kalių iki 1 metų amžiaus anatomiciniai trūkumai, turintys įtakos šlapimo nelaikymui.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nurijus per didelę dozę, fenilpropanolamino hidrochloridas yra toksiškas. Nepalankus poveikis pasireiškia svaiguliu, galvos skausmu, pykinimu, nemiga ar neramumu ir padidėjusiu kraujospūdžiu. Žymus perdozavimas gali būti mirtinas, ypač vaikams.

Norint išvengti atsitiktinio nurijimo, vaistą reikia saugoti nuo vaikų. Naudojus vaistą, visuomet reikia užsukti saugų dangtelį.

Atsitiktinai nurijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį.

Vaisto atsitiktinai patekus ant odos, užterštą vietą reikia plauti vandeniu su muilu. Naudojus vaistą, reikia nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus į akis, jas reikia plauti švariu vandeniu apie 15 min. ir kreiptis į gydytoją.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Simpatikomimetiniai vaistai labai retai gali sukelti labai įvairius nepalankius reiškinius, daugelis kurių primena pernelyg didelį simpatinės nervų sistemos stimuliavimą (tokius kaip, poveikis širdies susitraukimų dažniui (tachikardija) ir kraujospūdžiui (padidėjęs kraujospūdis) ir kuris gali sukelti proteinuriją.

Labai retais atvejais gali būti svaigulys, apetito stoka, sutrikęs širdies ritmas, kolapsas, agresija, padidėjęs aktyvumas (nerimas), padidėjęs troškulys, gausus šlapinimasis, koordinacijos sutrikimas, traukuliai ir padidėjusio jautrumo reakcijos.

Retai buvo panešta apie vandeningą viduriavimą/skystas išmatas, vėmimą ir apatiją.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Negalima naudoti vaikingoms kalėms ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Vaistą apdairiai naudoti su kitais simpatikomimetinio poveikio, anticholinerginiais vaistais, tricikliniais antidepresantais ir specifiniais B tipo monoaminooksidazės inhibitoriais.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Sušerti.

Rekomenduojama dozė yra 1 mg fenilpropanolamino 1 kg kūno svorio t.y. 0,1 ml sirupo 5 kg kūno svorio (t.y. pateikto švirkšto nustatytas gradavimas 5 kg), 3 kartus per dieną su ėdesiu.

Absorbcija geresnė, vaistą skyrus neėdusiam šuniui.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Sveikiems šunims, sugirdžius iki 5 kartų didesnę, negu rekomenduotina, dozę, šalutinis poveikis nepastebėtas. Tačiau, perdozavus fenilpropanolamino, gali išryškėti pernelyg stiprios simpatinės nervų sistemos stimuliacijos simptomai. Taikomas simptominis gydymas. Stipriai perdozavus, tinka alfa-adrenoblokatoriai. Tačiau jokių konkrečių rekomendacijų dėl vaistų ar dozių nėra.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: endogeninių simpatikomimetinių aminų analogai.
ATCvet kodas: QG04BX91.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Fenilpropanolaminas yra simpatikomimetinė medžiaga. Klinikinis fenilpropanolamino poveikis šlapimo nelaikymui pagrįstas α -adrenoreceptorių stimuliavimu. Tai padidina ir stabilizuoja uždaromąjį spaudimą šlaplėje, kurią inervuoja daugiausia adrenerginiai nervai. Fenilpropanolaminas yra D ir L enantiomerų racematas.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Šuns organizme fenilpropanolamino vidutinis pusinės eliminacijos laikas yra apie 3 val., o didžiausia koncentracija plazmoje būna praėjus maždaug 1 val. po sugirdymo. Duodant 1 mg/kg dozę 3 kartus per dieną daugiau negu 15 d. iš eilės, vaisto kaupimasis audiniuose nepastebėtas. Jei vaistas duodamas alkanam šuniui, biologinis prieinamumas žymiai padidėja.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Nesikristalizuojantis sorbitolio tirpalas (70%).

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 3 mėn.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje siekiant apsaugoti nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Didelio tankio polietileno buteliukai su mažo tankio polietileno adapteriais švirkštui ir polipropileningais vaikų neatidaromais uždoriais, kartoninėse dėžutėse su 1,5 ml graduotais mažo tankio polietileno / polistireno švirkštais.

Pakuotės dydžiai:

30 ml buteliukas kartoninėje dėžutėje su 1,5 ml švirkštu.

100 ml buteliukas kartoninėje dėžutėje su 1,5 ml švirkštu.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Prancūzija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/05/1675/001-002

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2005-01-17

Perregistravimo data 2008-06-30

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2023-10-30

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PROPALIN 40 mg/ml, sirupas šunims
Phenylpropanolaminum

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Fenilpropanolamino (hidrochlorido) 40,28 mg

3. VAISTO FORMA

Sirupas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

30 ml
100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti su ėdesiu.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}
Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 3 mėn.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje siekiant apsaugoti nuo šviesos.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Prancūzija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/05/1675/001
LT/2/05/1675/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**BUTELIUKAS (100 ml)****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

PROPALIN 40 mg/ml, sirupas šunims
Phenylpropanolaminum

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Fenilpropanolamino (hidrochlorido) 40,28 mg

3. VAISTO FORMA

Sirupas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)**7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS**

Sušerti su ėdesiu.

8. IŠLAUKA**9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA**

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}
Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 3 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje siekiant apsaugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA
--

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Prancūzija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/05/1675/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
BUTELIUKAS (30 ml)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PROPALIN 40 mg/ml, sirupas šunims

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Phenylpropanolaminum (ut hydrochloridum) 40,28 mg/ml.

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

30 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Sušerti su ėdesiu.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}
Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 3 mėn.

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad us. vet.

INFORMACINIS LAPELIS
PROPALIN 40 mg/ml, sirupas šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą
Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PROPALIN 40 mg/ml, sirupas šunims
Fenilpropanolaminas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml sirupo yra:

veikliosios medžiagos:
fenilpropanolamino 40,28 mg
(pilygsta 50 mg fenilpropanolamino hidrochlorido)

pagalbinių medžiagų: q.s.

Bespalvis arba šiek tiek gelsvai rudas tirpalas.

4. INDIKACIJA (-OS)

Kalėms gydyti, esant šlapimo nelaikymui dėl šlaplės sfinkterio nepakankamumo. Vaisto veiksmingumas nustatytas tik kalėms, kurioms atlikta ovariohisterektomija.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti netinkamo šlapinimosi atvejais, susijusiais su elgsena. Negalima naudoti šunims, kurie gydomi neselektyviais monoaminooksidazės inhibitoriais. Negalima naudoti jei yra žinoma, kad gyvūnui yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Simpatikomimetiniai vaistai labai retai gali sukelti labai įvairius nepalankius reiškinius, daugelis kurių primena pernelyg didelį simpatinės nervų sistemos stimuliaciją (tokius kaip, poveikis širdies susitraukimų dažniui (tachikardija) ir kraujospūdžiui (padidėjęs kraujospūdis), kuris gali sukelti proteinuriją.

Labai retais atvejais gali būti svaigulys, apetito stoka, sutrikęs širdies ritmas, kolapsas, agresija, padidėjęs aktyvumas (nerimas), poliurija (padidėjęs troškulys), poliurija (gausus šlapinimasis), ataksija (koordinacijos sutrikimas), traukuliai ir padidėjusio jautrumo reakcijos.

Retai buvo panešta apie vandeningą viduriavimą/skystas išmatas, emesis (vėmimą) ir apatiją.

Pastebėjus bet koki šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet koki šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Sušerti.

Rekomenduojama dozė yra 1 mg fenilpropanolamino 1 kg kūno svorio, t.y. 0,1 ml sirupo 5 kg kūno svorio (t.y. pateikto švirkšto nustatytas gradavimas 5 kg), 3 kartus per dieną su ėdesiu. Absorbcija geresnė, vaistą skyrus neėdusiam šuniui.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje siekiant apsaugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės. Galiojimo pabaigos data – paskutinė nurodyto mėnesio diena.

Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius talpyklą – 3 mėnesiai.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Dėl labai mažų dozių ir siekiant išvengti perdozavimo pavojaus, gyvūną reikia pasverti ir laikytis rekomenduojamų dozių.

Fenilpropanolaminas, simpatikomimetinio poveikio vaistas, gali paveikti širdies-kraujagyslių sistemą, ypač kraujospūdį ir širdies susitraukimų dažnį, todėl turėtų būti apdairiai naudojamas gyvūnams, sergantiems širdies-kraujagyslių ligomis.

Atsargumo turi būti imtasi gydant gyvūnus, sergančius sunkiu inkstų ar kepenų nepakankamumu, cukriniu diabetu, hiperadrenokorticismu, glaukoma, hipertirodizmu ir kitomis medžiagų apykaitos ligomis.

Prieš pradedant gydymą, turėtų būti įvertinti kalių iki 1 metų amžiaus anatominiai trūkumai, turintys įtakos šlapimo nelaikymui.

Nurijus per didelę dozę, fenilpropanolamino hidrochloridas yra toksiškas. Nepalankus poveikis pasireiškia svaiguliu, galvos skausmu, pykinimu, nemiga ar neramumu ir padidėjusiu kraujospūdžiu. Žymus perdozavimas gali būti mirtinas, ypač vaikams.

Norint išvengti atsitiktinio nurijimo, vaistą reikia saugoti nuo vaikų. Naudojus vaistą, visuomet reikia užsukti saugų dangtelį.

Atsitiktinai nurijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį.

Vaistui atsitiktinai patekus ant odos, užterštą vietą reikia plauti vandeniu su muilu. Naudojus vaistą reikia nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus į akis, jas reikia plauti švariu vandeniu apie 15 min. ir kreiptis į gydytoją.

Vaikingumas ir laktacija

Negalima naudoti vaikingoms kalėms ir laktacijos metu.

Vaistą naudoti apdairiai su kitais simpatikomimetinio poveikio, anticholinerginiais vaistais, tricikliniais antidepresantais ir specifiniais B tipo monoaminooksidazės inhibitoriais.

Sveikiems šunims, sugirdžius iki 5 kartų didesnę, negu rekomenduotina, dozę, šalutinis poveikis nepastebėtas. Tačiau, perdozavus fenilpropanolamino, gali išryškėti pernelyg stiprios simpatinės nervų sistemos stimuliacijos simptomai. Taikomas simptominis gydymas. Stipriai perdozavus, tinka alfa-adrenoblokatoriai. Tačiau jokių konkrečių rekomendacijų dėl vaistų ar dozių nėra.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2023-10-30

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Farmakodinaminės savybės. Fenilpropanolaminas yra simpatikomimetinė medžiaga. Klinikinis fenilpropanolamino poveikis šlapimo nelaikymui pagrįstas α -adrenoreceptorių stimuliavimu. Tai padidina ir stabilizuoja uždromąjį spaudimą šlaplėje, kurią inervuoja daugiausia adrenerginiai nervai. Fenilpropanolaminas yra D ir L enantiomerų racematas.

Farmakokinetinės savybės. Šuns organizme fenilpropanolamino vidutinis pusinės eliminacijos laikas yra apie 3 val., o didžiausia koncentracija plazmoje būna praėjus maždaug 1 val. po sugirdymo. Duodant 1 mg/kg dozę 3 kartus per dieną daugiau negu 15 d. iš eilės, vaisto kaupimasis audiniuose nepastebėtas. Jei vaistas duodamas alkanam šuniui, biologinis prieinamumas žymiai padidėja.

Pakuotės dydžiai:

30 ml buteliukas kartoninėje dėžutėje su 1,5 ml švirkštu.

100 ml buteliukas kartoninėje dėžutėje su 1,5 ml švirkštu.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.