

BIJSLUITER

1. Naam van het diergeneesmiddel

HORSEMINTH, Pasta voor oraal gebruik bij paarden en pony's

2. Samenstelling

Pyranteli embonas (= pyrantelum 152,3 mg) - Polysorbatum 80 - Propyl. parahydroxybenzoas - Methyl. parahydroxybenzoas - Sorbitolum 70 per centum cristallisabile - Natr. alginas - Aqua purificata pro 1 g.

3. Doeldiersoort(en)

Paarden en pony's.

4. Indicaties voor gebruik

Behandeling van gastro-intestinale parasitosen veroorzaakt door de volwassen vorm van nematoden zoals:

Grote palissadeworm :

- Strongylus vulgaris
- Strongylus equinus
- Strongylus edentatus
- Triodontophorus spp.

Kleine palissadeworm: - Cyathostominae

Spoelworm : - Parascaris equorum

Oxyuren : - Oxyuris equi

5. Contra-indicaties

Geen.

6. Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen:

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoort(en):

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Vermijd elk contact met de huid. Handen of elk ander deel van het lichaam wassen na contact met het diergeneesmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu:

Niet van toepassing.

Dracht en lactatie:

Het diergeneesmiddel kan in alle veiligheid worden toegediend aan drachtige of zogende merries.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen bekend.

Overdosering:
Pyrantel heeft een extreem brede veiligheidsmarge. Een overdosering geeft dus geen enkel neveneffect.

Belangrijke onverenigbaarheden:
Geen bekend.

7. Bijwerkingen

Geen.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk. Op deze manier kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden bewaakt. Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt, neem dan in eerste instantie contact op met uw dierenarts. U kunt bijwerkingen ook melden aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen met behulp van de contactgegevens aan het einde van deze bijsluiter of via uw nationale meldsysteem.

8. Dosering voor elke diersoort, toedieningswijzen en toedieningswegen

- De dosering bedraagt 6,6 mg pyrantel base per kg lichaamsgewicht.
- De inhoud van de spuit (3.96 g pyrantel base) is geschikt voor de behandeling van een paard van ongeveer 600 kg.

Behandelingsschema

- Veulens van 2 tot 8 maanden: het vermifugum om de 4 weken toedienen
- Paarden van meer dan 8 maanden: het vermifugum om de 6 à 8 weken toedienen.

N.B. Het verdient aanbeveling de paarden het vermifugum toe te dienen op het einde van de winter, 3 tot 4 dagen vóór ze op het weiland te laten grazen, en de behandeling om de 4 tot 6 weken te herhalen tijdens de zomer en herfstperiode.

- Zogende merries: Het vermifugum toedienen 3 tot 4 dagen vóór de merries naar het weiland gebracht worden. Daarna de toediening om de 3 à 4 weken herhalen tot in de herfst.
- Het diergeneesmiddel wordt in één enkele gift oraal toegediend.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

1. Naargelang het gewicht van het te behandelen dier, de mobiele ring instellen op één van de standen van de gewichtsschaalverdeling bedrukt op de zuiger.
2. Verwijder de beschermkap dat zich bevindt op de spuit.
3. Het is aangeraden de pasta op de bovenzijde van de tong aan te brengen. Breng de spuit in de mond van het dier ter hoogte van de mondhoeken. Richt de spuit naar achter en druk op de zuiger, de pasta wordt zo op de tongbasis aangebracht.
Deze methode voorkomt normaal elke teruggave van het product. Het is mogelijk het dier te helpen bij slikken door zijn kop met de hand omhoog te houden.
4. Als enkel een deel van de pasta gebruikt werd, de beschermkap terugplaatsen en de spuit bewaren in een koele en droge ruimte met het oog op het hergebruiken van het product.

Het diergeneesmiddel kan in alle veiligheid worden toegediend aan paarden en pony's van gelijk welke leeftijd. Geen enkele bijwerking is gemeld.

Bijkomende behandelingen kunnen nodig zijn bij dieren die in plaatsen gehouden worden waar een herinfectie mogelijk is.

10. Wachtijd(en)

Nul dagen.

11. Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bescherm tegen licht,

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar

12. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Maak gebruik van terugnameregelingen voor de verwijdering van ongebruikte diergeneesmiddelen of uit het gebruik van dergelijke middelen voortvloeiend afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften en nationale inzamelingssystemen die van toepassing zijn. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.

13. Indeling van het diergeneesmiddel

Diergeneesmiddel vrij van voorschrift.

14. Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen en verpakkingsgrootten

BE-V108875

Doos met 1 spuit van 26 g.

15. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

Februari 2023

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar in de diergeneesmiddelendatabank van de Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Contactgegevens

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Zoetis Belgium

rue Laid Burniat, 1

B-1348 Louvain-La-Neuve

Lokale vertegenwoordigers en contactgegevens voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen:

Zoetis Belgium SA

Mercuriusstraat 20

1930 Zaventem

België

Tel: +32 (0) 800 99 189