

PODATKI NA ZUNANJI IN STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml, zunanja ovojnina in stična ovojnina

1250 ml, zunanja ovojnina in stična ovojnina

50 ml, zunanja ovojnina

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Tyljet 200 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče
tilozin

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

En ml vsebuje 200.000 IE tilozina (kar ustreza približno 200 mg).

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

50 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo in prašiči

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

[Stična ovojnina]

Prašiči: IM. Govedo: IM ali IV.

[Zunanja ovojnina]

Prašiči: intramuskularna uporaba.

Govedo: intramuskularna uporaba ali počasna intravenska uporaba.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo: Meso in organi: 28 dni. Mleko: 108 ur.

Prašiči: Meso in organi: 16 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Odprto zdravilo porabite v 28 dneh do __/__/__

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Ne zamrzujte.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Ni zahtevano na stični ovojnini

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Tyljet 200 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče
tilozin

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

En ml vsebuje 200.000 IE tilozina (kar ustreza približno 200 mg).

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Prašiči: IM. Govedo: IM ali IV.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo: Meso in organi: 28 dni. Mleko: 108 ur.

Prašiči: Meso in organi: 16 dni.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh do __/__/__
EXP

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.