

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

500 Dosen, Flasche zu 150 ml.
10 x 500 Dosen, 10 Flaschen zu je 150 ml.
1000 Dosen, Flasche zu 300 ml.
10 x 1000 Dosen, 10 Flaschen zu je 300 ml.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

GALLIMUNE ND+IB+EDS+ART emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis zu 0,3 ml enthält

Inaktiviertes Newcastle-Krankheit-Virus, Stamm Ulster 2C	≥ 50 PD ₅₀
Inaktiviertes Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm Mass41	≥ 18 HAH.E.
Inaktiviertes Egg Drop Syndrom-Virus (EDS76), Stamm V127	≥ 180 HAH.E.
Inaktiviertes Puten Rhinotracheitis-Virus (swollen head syndrom), Stamm VCO3	$\geq 0,76$ ODD

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

0,3 ml/d
500 Dosen(150 ml)
10 x 500 Dosen(10 x 150 ml)
1 000 Dosen(300 ml)
10 x 1 000 Dosen(10 x 300 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Elterntiere und Junghennen)

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.
Vor Gebrauch gut schütteln.

7. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren .

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER
AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V353884

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

500 Dosen, 150 ml
1000 Dosen, 300 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

GALLIMUNE ND+IB+EDS+ART emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes dosis

Inaktiviert:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Newcastle-Krankheit-Virus, Stamm Ulster 2C | ≥ 50 PD ₅₀ |
| - Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm Mass41 | ≥ 18 HAH.E. |
| - Egg Drop Syndrom-Virus (EDS76), Stamm V127 | ≥ 180 HAH.E. |
| - Puten Rhinotracheitis-Virus, Stamm VCO3, | $\geq 0,76$ ODD |

0,3 ml/d

500 Dosen

1000 Dosen

3. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Elterntiere und Junghennen)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp.: {TT/MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}