

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(a használati utasítás a 6x1 ml-es kiszerelés esetében a kihajtható kartondoboz belső oldalára van nyomtatva)

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Intervet International B.V. (Wim de Körverstraat 35. 5831 AN Boxmeer, Hollandia).

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Intervet Productions s.r.l. (Via Nettunense Km.20,300 – 04011 Aprilia (LT), Olaszország)

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Ex-Spot A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Permetrin (cisz:transz 40:60), 715 mg/ml

4. JAVALLATOK

Kutyák bolha (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) és kullancs (*Ixodes ricinus* és *Rhipicephalus sanguineus*) fertőzöttségének kezelésére és megelőzésére. Az Ex-Spot elpusztítja a bolhákat és kullancsokat, és egyben védeltséget biztosít az újbóli fertőződéssel szemben a kezeléstől számított 4 hétig. Egy kezelés 2 hétig biztosít riasztó (repellenes hatást) és 10 napig rovarirtó hatást a lepkeszúnyogokkal (*Phlebotomus perniciosus*) szemben.

5. ELLENJAVALLATOK

2 hetesnél fiatalabb kutyakölykökön tilos a használata.

Macskákön tilos alkalmazni!

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával, vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Ritka esetben előfordulhat, hogy a kezelt állaton enyhe bőrirritáció jelentkezik az alkalmazást követően.

Ilyen esetben a kutya samponos lemosása után forduljunk állatorvoshoz.

Egyéb lehetséges mellékhatások: remegés, ataxia, hányás, görcsök.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Kizárólag ráceppentéses (spot-on) alkalmazásra.

Nyissuk ki a tasakot és vegyük ki belőle a pipettát.



1. lépés: A könnyű kezelés érdekében a kezelni kívánt állatnak állnia kell. Az egyik kezünkkel tartjuk a pipettát hegyével felfelé úgy, hogy az az arcunkkal ellentétes irányba álljon, a másik kezünkkel hajtsuk hátra a pipetta hegyét a fóliás rész irányába.



2. lépés: Kutyán a két lapockacsont között hajtsuk szét a szőrzetet, amíg a bőr láthatóvá válik. Helyezzük a pipetta hegyét a bőrre és enyhe nyomással juttassuk a pipetta teljes tartalmát közvetlenül a bőrre.



15 kg-nál kisebb tömegű kutyák esetében a lapockák között a szőrt hajtsuk szét, hogy a bőr láthatóvá váljék, majd cseppentsünk 1 ml Ex-Spot-ot (1 pipetta tartalmát) közvetlenül a bőrre.



15 kg-nál nagyobb tömegű kutyák esetében két pipetta Ex-Spot szükséges. Az első pipettát az előzőhöz hasonlóan, a második pipettát pedig a fartő tájékánál cseppentsük a bőrfelületre.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A készítményt nem kell a bőrbe bedörzsölni.

Egyetlen kezelés 28 napos védelmet nyújt, azonban ha a kutya megázik, vagy megfürdetik, ez az idő lerövidülhet. A kezelés biztonsággal megismételhető 7 nap múlva.

Egy kezelés 2 hétig biztosít riasztó (repellenes hatást) és 10 napig rovarirtó hatást a lepkeszúnyogokkal (*Phlebotomus perniciosus*) szemben. Ügyeljünk arra, hogy az oldat a bőrfelületre, és ne a szőrre kerüljön! Csak ép bőrfelületen alkalmazzuk!

Ajánlott a kezelt állatok tartózkodási- és fekvőhelyének tisztítása, inszekticid szerrel való kezelése.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől elzárva tartandó.

Fénytől védve, 25°C alatt tárolandó.

Hűtőben nem tárolható. Fagyástól óvni kell.

A tubust ne távolítsuk el a kartonborítékról.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejáratási időn belül szabad felhasználni!

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Egy-egy kullancs megtapadása nem zárható ki.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

A macskák érzékenyek a permetrinre, a kezelés hatására toxikus tünetek léphetnek fel.

Ha a kutyát macskával együtt tartjuk, a kezelés után (amíg a szer fel nem szívódik), különítsük el az állatokat egymástól, nehogy a készítményt a macska lenyalogassa. Vigyázzunk, hogy az együtt tartott kutyák se tudják egymásról, vagy magukról lenyalogatni a készítményt.

Kizárólag külsőleg alkalmazható.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

Kerüljük el, hogy a szer bőrre vagy a szembe jusson. Alkalmazás után mossunk kezet. A bőrre került készítményt azonnal bő vízzel mossuk le.

Az alkalmazás során gumikesztyű viselése ajánlott, főleg, ha egyszerre több kutyát kezelünk.

Alkalmazás után a kezelés helyét 3-6 órán át ne érintsük. Ajánlott este kezelni az állatot. A kezelt kutyák ne aludjanak együtt emberrel, főleg ne gyerekekkel.

Vemhesség és laktáció idején történő alkalmazás

Laboratóriumi állatokon elvégzett teratológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a permetrinnek nincs magzatkárosító hatása vemhes szukákon alkalmazva.

Gyógyszerkölsönhatások

Nem alkalmazható együtt egyéb inszektidicikkel, mint piretroidok, szerves foszforsavészterek vagy karbamátok.

Túladagolás

Az ajánlott dózis négyszeresével kezelt kutyáknál sem jelentkeztek nemkívánatos tünetek.

Inkompatibilitások

Nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Halakra és méhekre a készítmény különösen mérgező! A készítmény vagy csomagolóanyaga nem kerülhet természetes vizekbe. A kutyákat a kezelést követő 12 órán belül ne engedjük úszni. A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2023. március 10.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK