

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
(Škatla za vialo 100 ml)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BUSCOPAN compositum raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje 4,00 mg skopolaminijevega butilbromida in 500,00 mg natrijevega metamizolata.

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, govedo, prašiči, psi.

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Konji: i.v.

Govedo, psi: i.v. ali i.m.

Prašiči: i.m.

7. KARENCA

Karenca:

Konji: Meso in organi: 9 dni

Govedo: Meso in organi: 9 dni (i.v.), 15 dni (1x i.m.), 18 dni (2x i.m.);

Mleko: 4 dni

Prašiči: Meso in organi: 15 dni

Psi: Ni smiselno.

Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0050/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**(Viala 100 ml)****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

BUSCOPAN compositum raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVINE

En ml vsebuje 4,00 mg skopolaminijevega butilbromida in 500,00 mg natrijevega metamizolata.

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, govedo, prašiči, psi.

4. POTI UPORABE

Konji: i.v.

Govedo, psi: i.v. ali i.m.

Prašiči: i.m.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Konji:	Meso in organi:	9 dni
Govedo:	Meso in organi:	9 dni (i.v.), 15 dni (1x i.m.), 18 dni (2x i.m.);
	Mleko:	4 dni
Prašiči:	Meso in organi:	15 dni
Psi:	Ni smiselno.	

Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odrpno zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}