

MARKĒJUMS
V/DCP/20/0065

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste (24 injektori, 48 injektori, 96 injektori)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

PERMAWAY 600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem
Cloxacillinum (benzathinum)



2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Kloksacilīns (benzatīna formā) 600 mg/injektorā

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

24 injektori ievadīšanai tesmenī
48 injektori ievadīšanai tesmenī
96 injektori ievadīšanai tesmenī

5. MĒRĶA SUGAS

Piena govīs (cietstāves periodā).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienreizējai ievadīšanai tesmenī.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas

Pienam: intervāls starp atnešanos un ārstēšanu ir vismaz 42 dienas: 4 dienas pēc atnešanās.

Intervāls starp atnešanos un ārstēšanu ir mazāks par 42 dienām: 46 dienas pēc ārstēšanas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Vétoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/20/0065

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**Injektors 3,6 g.****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

PERMAWAY 600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī **liellopiem**
Cloxacillinum (benzathinum)

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

Cloxacillinum (ut benzathinum) 600 mg/injektorā

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

3,6 g

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Vienreizējai ievadīšanai tesmenī.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas

Pienam: intervāls starp ārstēšanu un atnešanos ir vismaz 42 dienas: 4 dienas pēc atnešanās.

Intervāls starp ārstēšanu un atnešanos ir mazāks par 42 dienām: 46 dienas pēc ārstēšanas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Ad us. vet. [tikai daudzvalodu iepakojumam]