

Gebrauchsinformation

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Pharmazeutischer Unternehmer:

ZIEGLER GmbH Homöopathika ad us. vet.
Ötzer Str. 10
86672 Thierhaupten

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Echina-logoplex
Flüssige Verdünnung zur Injektion

Für Tiere
Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Homöopathisches Arzneimittel

Injektionsflaschen mit 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion.
Unverkäufliches Muster mit 10 ml.

Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

10 g (=10 ml) Flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten:

Wirkstoffe:

Echinacea Dil. D4	1,00 g
Aconitum napellus Dil. D4	0,40 g
Apis mellifica Dil. D4	0,40 g
Lachesis Dil. D8	1,00 g

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

Natriumchlorid	0,09 g
Wasser für Injektionszwecke	7,11 g

Anwendungsgebiet(e)

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Wechselwirkungen

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Echina-logoplex gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Gegenanzeigen

Aufgrund des Bestandteils Echinacea muss Echina-*logoplex* bei fortschreitenden Systemerkrankungen mit Vorsicht angewendet werden. Hierzu zählen unter anderem:

Chronische Virusinfektionen wie z.B. Leukose oder FIV, Autoimmunerkrankungen wie z.B. Rheuma oder Lupus erythematodes, Diabetes mellitus.

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler oder Bienengift.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von Echina-logoplex bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart(en)

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Erwachsene Pferde und Rinder: 10 ml pro Tier

Kälber, Schweine: 5 ml pro Tier

Schafe, Ziegen: maximal 3 ml pro Tier

Ferkel: maximal 0,2 ml/kg Körpergewicht, insgesamt nicht mehr als 3 ml pro Tier

Hunde: maximal 0,2 ml/kg Körpergewicht, insgesamt nicht mehr als 5 ml pro Tier

Katzen: maximal 0,2 ml/kg Körpergewicht, insgesamt nicht mehr als 1 ml pro Tier

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf ist die angegebene Dosierung nach 24 Stunden zu wiederholen.

Die Verabreichung des Medikamentes sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen.

Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können.

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wartezeit

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege	Essbare Gewebe	0 Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege	Milch	0 Tage

Besondere Lagerungshinweise:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Nicht konserviert. Nach Anbruch in der Flasche verbleibende Reste sind zu verwerfen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

...

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 400782.00.00

Stand der Information: