

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

(24 intramamárních aplikátorů, 48 intramamárních aplikátorů, 96 intramamárních aplikátorů)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PERMAWAY 600 mg intramamární suspenze pro skot
Cloxacillinum (jako benzathini cloxacillinum)



2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Cloxacillinum (jako benzathini cloxacillinum) 600mg / intramamární aplikátor

3. LÉKOVÁ FORMA

Intramamární suspenze

4. VELIKOST BALENÍ

24 intramamárních aplikátorů
48 intramamárních aplikátorů
96 intramamárních aplikátorů

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice v období zapařlosti)

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Jednorázové intramamární podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 28 dnů

Mléko: Interval mezi léčbou a otelením je 42 dnů a více: 4 dny po otelení
Interval mezi léčbou a otelením je méně než 42 dnů: 46 dní po léčbě

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po otevření spotřebujte ihned.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vetoquinol s. r. o.,
Walterovo náměstí 329/3,
158 00 Praha 5,
Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/005/21-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Intramamární aplikátor 3,6 g

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PERMAWAY 600 mg intramamární suspenze pro skot
Cloxacillinum (jako benzathini cloxacillinum)



2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Cloxacillinum (jako benzathini cloxacillinum) 600mg / intramamární aplikátor

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

3,6 g

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Jednorázové intramamární podání

5. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 28 dnů

Mléko: Interval mezi léčbou a otelením je 42 dnů a více: 4 dny po otelení
Interval mezi léčbou a otelením je méně než 42 dnů: 46 dní po léčbě

6. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po otevření spotřebujte ihned.

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.