

MARKĒJUMS
V/NRP/15/0018

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste ar 4 injektoriem
Kaste ar 20 injektoriem

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Linkidrum 750 mg gels ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm
Lincomycin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens injektors (5 g) satur:
Aktīvā viela: 750 mg linkomicīna (atbilst 850 mg linkomicīna hidrohlorīda)

3. ZĀĻU FORMA

Gels ievadīšanai tesmenī.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

4 injektori
20 injektori

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govīs).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai tesmenī.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.
Pienam: 84 stundas (7 slaukšanas reizes).

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano dell'Emilia

Bologna

Itālija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/15/0018

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

5 g injektors

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Linkidrum 750 mg gels ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm
Lincomycin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

750 mg linkomicīna (atbilst 850 mg linkomicīna hidrohlorīda)

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5 g

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai tesmenī.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.
Pienam: 84 stundas (7 slaukšanas reizes).

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.