

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton 250 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eprizero 5 mg/ml Lösung zum Übergießen

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml Lösung enthält:

Wirkstoff:

Eprinomectin 5 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 ml

1 L

2,5 L

5 L

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (zur Fleischproduktion und zur Milchproduktion)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Lösung zum Übergießen.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 10 Tage

Milch: 0 Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 8-01161

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett 250 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eprizero 5 mg/ml Lösung zum Übergießen

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml Lösung enthält:

Wirkstoff:

Eprinomectin 5 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind (zur Fleischproduktion und zur Milchproduktion)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lösung zum Übergießen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 10 Tage

Milch: 0 Stunden

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}