

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Dexafort suspenzija za injiciranje za govedo, konje, pse in mačke

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

deksametazonfenilpropionat 2,67 mg (kar ustreza 2,0 mg deksametazona)
natrijev deksametazonfosfat 1,32 mg (kar ustreza 1,0 mg deksametazona)

3. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, konji, psi, mačke

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Konji, govedo: 0,06 mg/kg telesne mase (0,02 ml/kg) intramuskularno
Psi, mačke: 0,15 mg/kg telesne mase (0,05 ml/kg) intramuskularno ali subkutano
Zdravljenje lahko po 7 dneh ponovimo.

7. KARENCAGovedo:

Meso in organi: 53 dni

Mleko: 11 molž

Konji:

Meso in organi: 47 dni

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 2 leti.

Načeto zdravilo uporabite v roku 28 dni.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi od 15 °C do 25 °C. Zaščitite pred svetlobo. Shranjujte na suhem mestu. Shranjujte v pokončnem položaju.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0087/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Dexafort suspenzija za injiciranje za govedo, konje, pse in mačke

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

deksametazonfenilpropionat 2,67 mg (kar ustreza 2,0 mg deksametazona)
natrijev deksametazonfosfat 1,32 mg (kar ustreza 1,0 mg deksametazona)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, konji, psi, mačke

4. POTI UPORABE

Konji, govedo: 0,06 mg/kg telesne mase (0,02 ml/kg) intramuskularno
Psi, mačke: 0,15 mg/kg telesne mase (0,05 ml/kg) intramuskularno ali subkutano
Zdravljenje lahko po 7 dneh ponovimo.

5. KARENCAGovedo:

Meso in organi: 53 dni

Mleko: 11 molž

Konji:

Meso in organi: 47 dni

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 2 leti.

Načeto zdravilo uporabite v roku 28 dni.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi od 15 °C do 25 °C. Zaščitite pred svetlobo. Shranjujte na suhem mestu.
Shranjujte v pokončnem položaju.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}