

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lidor 20 mg/ml Injektionslösung

Lidocain

2. WIRKSTOFF(E)

Lidocain 20 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

5 x 50 ml

5 x 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Hunde, Katzen

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur subkutanen, intraartikulären, (intra-)okularen, perineuralen and epiduralen Anwendung.

7. WARTEZEITENWartezeiten:

Pferde

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 3 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VetViva Richter (logo)

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V525386

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Durchsichtige 100-ml-, 250-ml-Durchstechflasche aus Glas Typ II mit Brombutyl-Gummistopfen und Aluminiumkappe

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lidor 20 mg/ml Injektionslösung

Lidocain

2. WIRKSTOFF(E)

Lidocain 20 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Hunde, Katzen

4. ARTEN DER ANWENDUNG

s.c., intraartikulär, (intra-)okular, perineural, epidural

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 3 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VetViva Richter (logo)

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

100 ml

250 ml

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Durchsichtige 50-ml-Durchstechflasche aus Glas Typ II mit Brombutyl-Gummistopfen und Aluminiumkappe

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lidor



Pferde, Hunde, Katzen

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Lidocain 20 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis

50 ml

VetViva Richter (logo)