

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:

Ingelvac Ery ενέσιμο γαλάκτωμα για χοίρους

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

LABORATORIOS SYVA, S.A.U.
Av. Párroco Pablo Diez, 49-57
24010 LEÓN
ΙΣΠΑΝΙΑ

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

LABORATORIOS SYVA, S.A.U.
Parque Tecnológico de León
Av. Portugal s/n
Parcelas M15-M16
24009 LEÓN
ΙΣΠΑΝΙΑ

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ingelvac Ery ενέσιμο γαλάκτωμα για χοίρους

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε δόση των 2 ml περιέχει:

Δραστική ουσία:

Αδρανοποιημένο *Erysipelothrix rhusiopathiae*, ορότυπος 2, στέλεχος SE-9 7,4 – 61,0 μονάδες ELISA*

* Ορολογική απόκριση σε εμβολιασμένους ποντικούς όπως καθορίζεται από την ELISA σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 0064

Ανοσοενισχυτικές ουσίες:

Montanide ISA 201 VG	0,91 g
----------------------	--------

Έκδοχο:

Thiomersal	0,2 mg
------------	--------

Λευκό ομοιογενές γαλάκτωμα, στο οποίο δεν παρατηρείται διαχωρισμός φάσεων.

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για την ενεργή ανοσοποίηση των χοίρων, με σκοπό τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων (δερματικές αλλοιώσεις και πυρετός) της ερυσιπέλας των χοίρων, που προκαλείται από το *Erysipelothrix rhusiopathiae*, ορότυπος 2, όπως παρατηρήθηκε υπό συνθήκες πειραματικής πρόκλησης σε οροαρνητικούς χοίρους.

Εγκατάσταση ανοσίας: 3 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σχήματος εμβολιασμού.
Διάρκεια ανοσίας: 5 μήνες.

5. ANTENΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Τοπική ερυθρότητα μπορεί να εμφανιστεί εντός 24 ωρών μετά τον εμβολιασμό, η οποία συνήθως υποχωρεί χωρίς καμία θεραπεία σε λιγότερο από 10 ημέρες, αλλά περιστασιακά μπορεί να επιμείνει έως και 43 ημέρες.

Τοπική αύξηση της θερμοκρασίας στο σημείο της ένεσης μπορεί να εμφανιστεί την ημέρα της χορήγησης, η οποία υποχωρεί αυτόματα εντός 24 ωρών, αν και περιστασιακά μπορεί να επιμείνει έως και 31 ημέρες.

Τοπικός πόνος στο σημείο της ένεσης μπορεί να εμφανιστεί την ημέρα της χορήγησης, ο οποίος συνήθως υποχωρεί χωρίς καμία θεραπεία πριν από τις 4 ημέρες. Περιστασιακά, μπορεί να επιμείνει έως και 33 ημέρες.

Ήπιο έως μέτριο οίδημα (περιστασιακά $\geq 5,1$ cm) και οζίδια (≤ 5 cm) μπορεί να εμφανιστούν την ημέρα του εμβολιασμού στο σημείο της ένεσης, τα οποία συνήθως υποχωρούν χωρίς καμία θεραπεία σε λιγότερο από 17 ημέρες, αλλά περιστασιακά μπορεί να επιμείνουν έως και 38 ημέρες (οίδημα) ή 69 ημέρες (οζίδια).

Παροδική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (μέση αύξηση 0,85 °C, μέγιστη αύξηση 2,45 °C) μπορεί να εμφανιστεί εντός 6 ωρών μετά τον εμβολιασμό, η οποία όμως υποχωρεί αυτόματα εντός 24 ωρών χωρίς καμία γνωστή επίπτωση στην υγεία ή την παραγωγικότητα του ζώου.

Αυτές οι αντιδράσεις παρατηρήθηκαν υπό πειραματικές συνθήκες και υπό συνθήκες πεδίου.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Παροδική απάθεια μπορεί να εμφανιστεί εντός 6 ωρών μετά τον εμβολιασμό, η οποία υποχωρεί χωρίς θεραπεία εντός 24 ωρών. Αυτό παρατηρήθηκε υπό πειραματικές συνθήκες και υπό συνθήκες πεδίου.

Σε μια μελέτη πεδίου, παρατηρήθηκαν αντιδράσεις τύπου υπερευαισθησίας που επηρέασαν την αναπνοή και προκάλεσαν μυϊκή δυσκαμψία, η οποία υποχώρησε χωρίς θεραπεία εντός λίγων λεπτών.

Μη συνηθισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Γενικευμένο οίδημα στον αυχένα μπορεί να εμφανιστεί εντός δύο ημερών μετά τον εμβολιασμό, το οποίο υποχωρεί χωρίς θεραπεία εντός 13 ημερών. Αυτό παρατηρήθηκε υπό πειραματικές συνθήκες και υπό συνθήκες πεδίου.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

Εναλλακτικά κάντε χρήση του εθνικού συστήματος αναφοράς
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Τηλ: 213 2040213
Email: vetpharmacovigilance@eof.gr

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι.

8. ΛΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ενδομυϊκή χρήση.

Χορηγήστε μία δόση των 2 ml ενδομυϊκά στους αυχενικούς μυς, σε χοίρους από την ηλικία των 12 εβδομάδων σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

Αρχικό σχήμα εμβολιασμού: δύο ενδομυϊκές ενέσεις μίας δόσης, με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων.

Σχήμα επανεμβολιασμού: μία ενδομυϊκή ένεση μίας δόσης τουλάχιστον κάθε 5 μήνες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμβολιασμό έγκυων ζώων, ωστόσο εάν ο εμβολιασμός πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αρχικό σχήμα εμβολιασμού, χορηγήστε την πρώτη δόση πριν από το ζευγάρισμα ή τη γονιμοποίηση.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση και περιοδικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμβολιασμού.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μηδέν ημέρες.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C – 8°C).

Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στο φιαλίδιο μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 10 ώρες.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου:

Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:

Δεν ισχύει.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Προς τον χρήστη:

Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν περιέχει παραφινέλαιο. Σε περίπτωση τυχαίας ένεσης/αυτοένεσης μπορεί να προκληθεί έντονος πόνος και εξοίδηση, ιδιαιτέρως αν η ένεση γίνει σε άρθρωση ή σε δάκτυλο. Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απώλεια του δακτύλου, εάν δεν παρασχεθεί άμεση ιατρική φροντίδα. Αν κατά λάθος σας χορηγηθεί αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, ακόμα και αν η ποσότητα είναι πολύ μικρή, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, έχοντας μαζί σας το φύλλο οδηγιών χρήσης. Εάν ο πόνος επιμένει για περισσότερο από 12 ώρες μετά την ιατρική εξέταση, ζητήστε και πάλι ιατρική συμβουλή.

Προς τον ιατρό:

Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν περιέχει παραφινέλαιο. Τυχαία ένεση με αυτό το προϊόν, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, ενδεχομένως να προκαλέσει έντονη εξοίδηση, η οποία, μπορεί π.χ. να έχει ως αποτέλεσμα ισχαιμική νέκρωση, ακόμα και απώλεια δακτύλου. Απαιτείται η ΑΜΕΣΗ εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα και ενδεχομένως πρόωπη διάνοιξη και έκπλυση της περιοχής που έγινε η ένεση, ιδιαιτέρως όταν αφορά τη ράγα του δακτύλου ή τον τένοντα.

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη θειομερσάλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.

Εγκυμοσύνη και γαλουχία:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας, σύμφωνα με τις συστάσεις της ενότητας Δοσολογία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από την χρήση του εν λόγω εμβολίου με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρμακο. Η απόφαση για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από τη χορήγηση οποιουδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμάκου, θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση υπερβολικής δόσης του εν λόγω εμβολίου.

Ασυμβατότητες:

Να μην αναμειγνύεται με άλλο κτηνιατρικό φάρμακο.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασία:

Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο που περιέχει 100 ml.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.