

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Polipropilenska posoda, kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

MAQS mravljična kislina 68,2 g, trak za čebeljo družino za medonosne čebele

2. NAVEDBA UČINKOVINE

Učinkovina: Vsak trak za čebeljo družino vsebuje: mravljična kislina 68,2 g

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Trak za čebeljo družino

4. VELIKOST PAKIRANJA

Polipropilenske posode, ki vsebujejo 2 vrečici po 2 trakova.
Polipropilenske posode, ki vsebujejo 10 vrečic po 2 trakova.

Kartonska škatla, ki vsebuje 2 vrečici v plastičnem ovoju (4 trakovi).
Kartonska škatla, ki vsebuje 10 vrečic v plastičnem ovoju (20 trakov).
Kartonska škatla, ki vsebuje 30 vrečic v plastičnem ovoju (60 trakov).

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Medonosna čebela

6. INDIKACIJE

Zdravljene varoze, ki jo povzroča vrsta pršice *Varroa destructor* pri medonosnih čebelah (*Apis mellifera*).

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.
Za uporabo v panju.

8. KARENCA

Karenca

Med: Nič dni.

Med 7-dnevnim obdobjem zdravljenja ne točite medu.

9. POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Bodite pozorni, da med nameščanjem zdravila čim manj vznemirjate čebeljo družino.

Zdravite istočasno vse čebelje družine v čebelnjaku. Uporabljajte v skladu z lokalnimi priporočili za zdravljenje, če so ta na voljo.

Naravna rodnost in umrljivost je 1.000 do 2.000 čebel na dan spomladi in poleti. Pod stresom zdravljenja je možno da čebele, ki so zaradi starosti ali bolezni oslabele, tiste, ki bi običajno umrle zunaj panja, podležejo in jih je mogoče opaziti okrog vhoda v panj.

Zdravilo se sme uporabljati le kot del integriranega programa za nadzor varoze. Priporočljivo je mesečno spremljanje količine foretičnih pršic, ki se nahajajo na odraslih čebelah v obdobju vzreje čebelje zalege in zdravite, ko je dosežen lokalni prag.

Da bi dosegli potrebno učinkovitost, zdravila ne uporabite če so zunanje najvišje temperature na dan uporabe izven območja 10 – 29,5°C.

- To zdravilo za uporabo v veterinarski medicini draži kožo in oči. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami. Pri ravnanju in uporabi zdravila nosite običajna zaščitna oblačila za čebelarjenje. Vedno imejte pripravljeno vodo v delovnem dosegu.
- V primeru nenamernega stika z očmi, oči takoj spirajte s čisto tekočo vodo 10 minut, poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodila za uporabo.
- Izogibajte se stiku s kožo tako, da nosite kemično odporne rokavice (EN 374). V primeru nenamernega stika s kožo, izpostavljena mesta takoj sperite z vodo in če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
- Izogibajte se vdihavanju hlapov. Ovojnino zdravila in ovoj traku odstranjujte samo zunaj tako, da ju držite v smeri pihanja vetra. V primeru nenamernega vdihavanja pojdite na svež zrak in če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
- Med uporabo zdravila preprečite dostop otrokom.
- Med uporabo in nameščanjem zdravila ne jejte, ne pijte ali kadite.
- Po vsaki uporabi si roke takoj umijte z vodo in milom.
- Osebe z znano preobčutljivostjo na mravljično ali oksalno kislino naj zdravilo za uporabo v veterinarski medicini dajejo previdno.

Druga opozorila

To zdravilo je korozivno. Preprečite stik zdravila s kovinskimi površinami.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: MM/LLLL

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte na suhem mestu.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Polipropilensko posodico ali polietilensko vrečko shranjujte tesno zaprto v kartonski škatli, da vsebino zaščitite pred kontaminacijo ali preprečite razlitje zdravila.

Shranjujte tesno zaprto v originalni ovojnini, v dobro prezračevanem prostoru, stran od žveplene kisline, močnih oksidantov (npr. dušikove kisline, peroksidov, perkloratov, kloritov) in virov vžiga.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Traku ali uporabljene ovojnine ne odlagajte v ribnike, vodne poti in jarke. Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

13. NAVODILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

NOD Apiary Ireland Ltd.,
Tullow Industrial Estate,
Tullow, Co Carlow
R93 W0D8
Irski

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0464/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: XX-XXX-X

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Vrečica

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

MAQS mravljična kislina 68,2 g, trak za čebeljo družino za medonosne čebele

2. KOLIČINA UČINKOVINE

Vsak trak vsebuje: mravljična kislina 68,2 g

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

Vsebuje 1 odmerek (2 trakova)

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za uporabo v panju.

Navodila za odpiranje vrečke

Trakova z zdravilom previdno odstranite iz vrečke tako, da vrečko na eni strani prerežete, dvignete tesnilo, da plastika odstopi od traku, in preprežete vzdolž roba tesnila po celotni dolžini vrečke. Previdno ločite trakova. **NE ODSTRANJUJTE PAPIRNIH OVOJEV** (Ti delujejo kot stenj (t.j. nadzorujejo hitrost izločanja učinkovine).

5. KARENCA

Karenca

Med: Nič dni.

Med 7-dnevnim obdobjem zdravljenja ne točite medu.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot: XX-XXX-X

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: MM/LLLL

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

9. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

NOD Apiary Ireland Ltd.,
Tullow Industrial Estate,
Tullow, Co Carlow
R93 W0D8
Irska

10. BESEDILO, KI OZNAČUJE NAVODILO ZA UPORABO
--

Za celotna navodila in opozorila pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo.