

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g, intramaminė suspensija galvijams

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename 4 g intramaminiam švirkšte yra:

veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):

sunkiojo bismuto subnitrato 2,6 g;

pagalbinių medžiagų:

indigokarmino aliuminio kraplakas E132 0,02 g.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Intramaminė suspensija.

Mėlyna suspensija.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu).

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Apsaugoti nuo naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu.

Karvėms, kurios tikėtina neserga subklinikiniu mastitu, vaistą galima naudoti užtrūkusių karvių priežiūrai ir mastito kontrolei.

Karvių, kurios bus gydomos šiuo veterinariniu vaistu, atranka turi būti vykdoma remiantis veterinariniu klinikiniu vertinimu. Atrankos kriterijai gali būti paremti pavienių karvių sergamumo mastitu ir ląstelių skaičiaus istorija arba pripažintais subklinikinio mastito tyrimais ar bakteriologinių mėginių tyrimais.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu. Žr. 4.7 p. Karvėms, kurioms užtrūkinimo metu nustatytas subklinikinis mastitas, vaisto vieno naudoti negalima. Negalima naudoti karvėms, kurioms užtrūkinimo metu nustatytas klinikinis mastitas.

Negalima naudoti esant žinomam padidėjusiam jautrumui veikliajai (-iosioms) medžiagai (-oms) ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Pagal gerą klinikinę praktiką reikia reguliariai stebėti užtrūkusias karves, ar nėra klinikinio mastito požymių. Jei vaistu užkimštame ketvirtyje išsivysto klinikinis mastitas, prieš pradedant tinkamą gydymą, paveiktą ketvirtį reikia išmelžti rankomis. Užteršimo pavojui sumažinti švirkšto negalima merkti į vandenį. Švirkštą naudoti tik vieną kartą. Naudojant vaistą, svarbu griežtai laikytis aseptikos reikalavimų, kadangi šis vaistas neturi antimikrobinių savybių. Po šio vaisto naudojimo negalima naudoti jokio kito intramaminiio vaisto. Karvėms, kurios gali sirgti subklinikinio mastitu, šį vaistą galima naudoti prieš tai pažeistam tešmens ketvirčiui gydyti naudojant užtrūkusioms karvėms tinkamus antibiotikus.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

Kartu su intramaminiu vaistu tiekiamose valomosiose servetėlėse yra izopropilo alkoholio. Jei žinoma ar įtariama, kad dėl izopropilo alkoholio pasireikš odos sudirginimas, reikia užsimauti apsaugines pirštines. Reikia vengti kontakto su akimis, nes izopropilo alkoholis gali sukelti akių sudirginimą.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinoma.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas

Galima naudoti vaikingumo metu. Apsiveršiavus vaisto kamštį gali praryti veršelis. Veterinarinio vaisto nurijimas veršeliui yra saugus ir nesukelia jokio nepalankaus poveikio.

Laktacija

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti laktacijos metu. Atsitiktinai panaudojus karvei laktacijos metu, galima pastebėti nedidelį (iki 2 kartų) laikiną somatinių ląstelių skaičiaus padidėjimą. Tokiu atveju vaisto kamštį reikia išmelžti rankomis, jokių papildomų atsargumo priemonių taikyti nereikia.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudoti tik į tešmenį.

Vieno švirkšto su vaistu turinį sušvirkšti į kiekvieną tešmens ketvirtį iš karto po paskutinio laktacijos periodo melžimo (užtrūkinimo metu). Po vaisto sušvirkštimo spenio ar tešmens masažuoti negalima.

Norint sumažinti mastito atsiradimo po vaisto sušvirkštimo riziką, švirkšti reikia apdairiai, kad į spenį nepatektų patogeninių mikroorganizmų.

Svarbu kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti spenį chirurginiu spiritu arba alkoholiu impregnuotomis servetėlėmis. Speniai turi būti valomi, kol ant servetėlių nesimatys nešvarumų. Prieš sušvirkščiant vaistą, reikia palaukti, kol speniai apdžius. Sušvirkšti reikia laikantis

aseptikos reikalavimų ir stengtis neužteršti švirkšto galiuko. Po švirkštimo rekomenduojama naudoti tinkamą spenių mirkalą arba purškalą.

Esant žemai temperatūrai, vaistą galima pašildyti šiltoje aplinkoje iki kambario temperatūros, kad būtų lengviau sušvirkšti.

4.10 Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Karvėms skyrus dvigubai didesnę nei rekomenduojama vaisto dozę, jokio nepalankaus poveikio nepasireiškė.

4.11 Išlauka

Skerdienai ir subproduktams – 0 parų.
Pienui – 0 val.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: įvairūs vaistai speniams ir tešmeniui.
ATCvet kodas: QG52X.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Sušvirkštus vaistą į kiekvieną tešmens ketvirtį, sukuriamas fizinis barjeras, saugantis nuo bakterijų patekimo, todėl sumažėja naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu dažnumas.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Bismuto subnitratas neabsorbuojamas iš pieno liaukų, tačiau veikia kaip kamštis spenyje, kol nepašalinamas fiziškai (įrodyta su karvėmis, kurių užtrūkimo laikotarpis truko iki 100 dienų).

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Skystasis parafinas,
aliuminio distearatas / tristearatas,
koloidinis silicio dioksidas, bevandenis,
indigokarmino aliuminio kraplakas E132.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 36 mėn.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

4 g polietileninis intramaminis švirkštas su stūmokliu ir polietileniniu dviejų dalių dangteliu.

Kartoninė dėžutė su 20 švirkštų ir 20 valomųjų servetėlių.

Polietileninis kibirėlis su 60 švirkštų ir 60 valomųjų servetėlių.

Polietileninis kibirėlis su 120 švirkštų ir 120 valomųjų servetėlių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Univet Ltd
Tullyvin
Cootehill
Co. Cavan
Airija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/17/2435/001-003

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

2017-12-20

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2020-08-05

11. DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė arba polietilėninis kibirėlis

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g, intramaminė suspensija galvijams

Bismuto subnitratas, sunkusis

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekviename 4 g intramaminiam švirkšte yra 2,6 g sunkiojo bismuto subnitrato.

3. VAISTO FORMA

Intramaminė suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

20 x 4 g

60 x 4 g

120 x 4 g

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu).

6. INDIKACIJA (-OS)

Apsaugoti nuo naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Naudoti tik į tešmenį.

Esant žemai temperatūrai, vaistą galima pašildyti šiltoje aplinkoje iki kambario temperatūros, kad būtų lengviau sušvirkšti.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 0 parų,
pienui – 0 val.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.
Po šio vaisto naudojimo negalima naudoti jokio kito intramaminio vaisto.
Tik vienkartiniam naudojimui.
Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS
--

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA
--

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Univet Ltd
Tullyvin
Cootehill
Co. Cavan
Airija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/17/2435/001

LT/2/17/2435/002

LT/2/17/2435/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Užpildytas mažo tankio polietileno švirkštas su lygiu, smailėjančiu hermetiškai užsandarintu antgaliu.

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g, intramaminė suspensija galvijams
Sunkiojo bismuto subnitrato 2,6 g

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS**3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)****4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

Naudoti tik į tešmenį.

5. IŠLAUKA

Išlauka:
skerdienai ir subproduktams – 0 parų,
pienui – 0 val.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g intramaminė suspensija galvijams

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE
ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR
ADRESAS**

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Univet Ltd
Tullyvin
Cootehill
Co. Cavan
Airija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g, intramaminė suspensija galvijams

Bismuto subnitratas, sunkusis

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vaistas yra mėlyna suspensija. Kiekviename 4 g intramaminiam švirkšte yra 2,6 g sunkiojo bismuto subnitrato.

Pagalbinė medžiaga
Indigokarmino aliuminio kraplakas E132

4. INDIKACIJA (-OS)

Veterinarinis vaistas yra skirtas apsaugoti nuo naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu.

Karvėms, kurios tikėtina neserga subklinikinio mastito, vaistą galima naudoti užtrūkusių karvių priežiūrai ir mastito kontrolei. Karvių, kurios bus gydomos šiuo veterinariniu vaistu, atranka turi būti vykdoma remiantis veterinariniu klinikiniu vertinimu. Atrankos kriterijai gali būti paremti pavienių karvių sergamumo mastitu ir ląstelių skaičiaus istorija arba pripažintais subklinikinio mastito tyrimais ar bakteriologinių mėginių tyrimais.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Karvėms, kurioms užtrūkinimo metu nustatytas subklinikinis mastitas, vaisto vieno naudoti negalima.

Negalima naudoti karvėms, kurioms užtrūkinimo metu nustatytas klinikinis mastitas.

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu. Atsitiktinai sušvirkštus karvėms laktacijos metu, galima pastebėti nedidelį (iki 2 kartų) laikiną somatinių ląstelių skaičiaus padidėjimą, tačiau vaisto kamštį galima lengvai išmelžti rankomis ir jokių papildomų atsargumo priemonių taikyti nereikia.

Po šio vaisto naudojimo negalima naudoti jokio kito intramaminio vaisto.

Negalima naudoti esant žinomam padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudoti tik į tešmenį.

Dozė: iš karto po paskutinio laktacijos periodo melžimo (užtrūkinimo metu) į kiekvieną tešmens ketvirtį reikia sušvirkšti vieno švirkšto turinį. Po sušvirkštimo spenio ar tešmens masažuoti negalima.

Naudojimas

Reikia būti atsargiems, kad į spenį nepatektų patogeninių mikroorganizmų. Šiam vaistui sušvirkšti svarbu griežtai laikytis aseptikos reikalavimų, kadangi šis vaistas neturi antimikrobinių savybių. Nesilaikant šių rekomendacijų, gali pasireikšti sunkus mastitas po sušvirkštimo arba netgi ištikti mirtis.

1. Prieš sušvirkščiant vaistą, visus spenius reikia kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti. Kiekvienam gyvuliui gydyti turi būti skirta pakankamai laiko, tai neturi būti derinama su kita gyvulininkystės veikla.
2. Gyvuliai turi būti tinkamai suvaržyti higieniškomis sąlygomis. Švirkštai turi būti švarūs, NEGALIMA jų merkti į vandenį.
3. Kiekvienai karvei gydyti naudoti atskirą švarių vienkartinį pirštinių porą.
4. Pradėti reikia nuo vizualiai švaraus ir sauso spenio ir tešmens. Jei speniai akivaizdžiai nešvarūs, nešvarumus nuo jų nuvalyti reikia tik drėgnomis vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis ir kruopščiai nusausti. Spenius dezinfekuoti greitai veikiančiu spenių mirkymui skirtu dezinfekciniu tirpalu, palaukti 30 sekundžių, tada kiekvieną spenį visiškai nusausti atskiromis vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis. Išmelžti likusį pieną į melžimo puodelį ir išmesti.
5. Kruopščiai dezinfekuoti visą spenio paviršių spiritu / alkoholiu įmirkytais vienkartiniais tamponais. Tyrimais nustatyta, kad efektyviausia priemonė speniams valyti yra pačių pasigaminti tamponai iš švarios, sausos vatos, suvilgytos chirurginiu spiritu (ar tapačia medžiaga). Jei jų neturima, tada galima naudoti pridedamas sterilas servetėles. Pirmiausia reikia nuvalyti toliausiai nuo savęs esančius spenius, kad nebūtų užteršti nuvalyti.
6. Švelniai nuvalyti kiekvieną spenį nauju atskiru, vienkartinio spiritu / alkoholiu įmirkytu tamponu, kol spenio galas ir tamponas bus akivaizdžiai švarūs.
7. Nepirliedžiant antgalio, reikia nuimti dangtelį nuo intramaminio švirkšto. Sušvirkšti švirkšto turinį į spenį, saugant spenio galą nuo užteršimo. Į spenius reikia švirkšti priešinga valymui seka, t. y. pirmiausia gydyti arčiausiai savęs esančius ketvirčius. Vaisto į tešmenį masažuoti negalima.
8. Sušvirkštus naudoti po melžimo naudoti skirtą spenių dezinfekavimo priemonę ir gydytas karves uždaryti į aptvarą, kur jos turėtų pastovėti bent 30 min., kad spenio kanalas užsidarys.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nuoroda gyvūnų laikytojams

Svarbu prieš naudojant šį veterinarinį vaistą perskaityti nurodymus. Itin svarbu naudojant vaistą užtikrinti švarą, kad sumažėtų galimai mirtino mastito po sušvirkštimo pavojus. Visi patarimai dėl spenių valymo prieš švirkščiant vaistą yra nurodyti naudojimo rekomendacijose ir jų reikia laikytis.

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 0 parų.

Pienui – 0 val.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir švirkšto etiketėje po „Tinka iki“. Galiojimo data nurodo paskutinę to mėnesio dieną. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Pagal gerą klinikinę praktiką reikia reguliariai stebėti užtrūkusias karves, ar nėra klinikinio mastito požymių. Jei vaistu užkimštame ketvirtyje išsivysto klinikinis mastitas, prieš pradedant tinkamą gydymą, paveiktą ketvirtį reikia išmelžti rankomis. Užteršimo pavojui sumažinti švirkšto negalima merkti į vandenį. Švirkštą naudoti tik vieną kartą. Naudojant vaistą, svarbu griežtai laikytis aseptikos reikalavimų, kadangi šis vaistas neturi antimikrobinių savybių. Po šio vaisto naudojimo negalima naudoti jokio kito intramaminio vaisto. Karvėms, kurios gali sirgti subklinikiniu mastitu, šį vaistą galima naudoti prieš tai pažeistam tešmens ketvirčiui gydyti naudojant užtrūkusioms karvėms tinkamus antibiotikus.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

Kartu su intramaminio vaisto tiekiamose valomosiose servetėlėse yra izopropilo alkoholio. Jei žinoma ar įtariama, kad dėl izopropilo alkoholio pasireikš odos sudirginimas, reikia užsimauti apsaugines pirštines. Reikia vengti kontakto su akimis, nes izopropilo alkoholis gali sukelti akių sudirginimą.

Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo metu. Apsiveršėlius vaisto kamštį gali praryti veršelis.

Veterinarinio vaisto nurijimas veršeliui yra saugus ir nesukelia jokio nepalankaus poveikio.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti laktacijos metu. Atsitiktinai panaudojus karvei laktacijos metu, galima pastebėti nedidelį (iki 2 kartų) laikiną somatinių ląstelių skaičiaus padidėjimą. Tokiu atveju vaisto kamštį reikia išmelžti rankomis, jokių papildomų atsargumo priemonių taikyti nereikia.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Karvėms skyrus dvigubai didesnę nei rekomenduojama vaisto dozę, jokio nepalankaus poveikio nepasireiškė.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2020-08-05

15. KITA INFORMACIJA

Sušvirkštus vaistą į kiekvieną tešmens ketvirtį, sukuriamas fizinis barjeras, saugantis nuo bakterijų patekimo, todėl sumažėja naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu dažnumas.

Didžioji dalis kamščio pasišalina pirmojo melžimo arba žindymo po apsiveršiavimo metu, tačiau kartais po kelių dienų nedidelius kiekius galima pastebėti kaip dėmes ant filtro. Vaistą atskirti nuo mastito krešulių galima pagal struktūrą ir spalvą.

Karvėms skyrus dvigubai didesnę nei rekomenduojama vaisto dozę, jokio nepalankaus poveikio nepasireiškė. Esant žemai temperatūrai, vaistą galima pašildyti šiltoje aplinkoje iki kambario temperatūros, kad būtų lengviau sušvirkšti.

Apsiveršiavus karvei rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus, padėsiančius užtikrinti efektyvų vaisto pašalinimą, kad kuo mažiau jo likučių patektų į melžimo įrenginį. Vaistui iš spenio pašalinti negalima naudoti melžimo įrenginio.

1. Suimti viršutinę spenio dalį ir prieš pirmąjį melžimą ketvirtį išmelžti 10–12 kartų.
2. Išmelžti krekenas ir patikrinti, ar per pirmuosius kelis melžimus nebus pastebėta vaisto likučių.
3. Po kiekvieno melžimo patikrinti mastito filtrus ir pieno linijos filtrą, ar nėra vaisto likučių.

Pakuotės po 20, 60 ir 120 švirkštų. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Parduodama be recepto.