

ЛИСТОВКА:

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Фенпрадин таблетки за кучета и котки
Fenpradin Dog and Cat Tablets

2. Състав

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Praziquantel 50.0 mg

Fenbendazole 500.0 mg

Таблетки за перорално приложение с кръстосани линии за счупване на четвъртини.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Кучета и котки

4. Показания за употреба

За третиране на смесени паразитни инфекции при кучета и котки, причинени от нематоди и цестоди от следните видове:

Аскариди *Toxocara canis* (незрели, зрели),
Toxocara cati (зрели),
Toxascaris leonina (незрели, зрели);

Анкилостоми *Uncinaria stenocephala* (незрели, зрели),
Ancylostoma caninum (незрели, зрели);

Трихуриди *Trichuris vulpis* (зрели);

Цестоди *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp. и *Mesocestoides* spp.

Фенпрадин таблетки за кучета и котки може да се използва също при контрола на протозои *Giardia* при кучета и на белодробни инфекции с *Aelurostrongylus abstrusus* при котки.

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

Да не се използва при котенца на възраст до 8 седмици.

6. Специални предупреждения

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Тъй като един от най-разпространените цестоди при кучетата и котките (*Dipylidium caninum*) се предава чрез бълхи и има много кратък цикъл на развитие, много важно е да се обръща внимание върху контрола на бълхите за намаляване на инцидентите с този вид и на риска от реинфекция.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Да се измият ръцете след контакт с таблетките.

Ехинококозата представлява риск за човешкото здраве. Тъй като ехинококозата е заболяване, за което трябва да се съобщи в ОИЕ (Световната организация за здраве на животните), компетентните органи трябва да имат разработени специфични насоки за лечение, за последващи действия и за предпазване здравето на хората.

Бременност и лактация:

Да не се превишава посочената доза при третиране на бременни кучета. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар при третиране на бременни кучета срещу нематоди. Не се прилага при бременни котки. Не се прилага при бременни кучета до 39-ти ден от бременността. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар при третиране на бременни кучета през последната третина от бременността, тъй като тератогенните ефекти, причинени от метаболита на fenbendazole - oxfendazole в редки случаи, не могат да се изключат изцяло. Може да се прилага по време на лактация.

Предозиране:

Двете субстанции fenbendazole и praziquantel са с много добра поносимост. След силно превишаване на дозата понякога могат да се появят повръщане и преходна диария. При 3 пъти превишаване над препоръчваната доза са наблюдавани размекнати изпражнения при кучета и скимтене и безпокойство при кученца. При 5 пъти превишаване на препоръчваната доза се наблюдава прекомерно отделяне на слюнка при кучета и кученца. Признаците на предозиране трябва да бъдат лекувани симптоматично. Може да се появи безапетитие след прилагане на високи дози при котки.

7. Неблагоприятни реакции

При третираните животни могат понякога да се проявят повръщане или лека диария във връзка с обезпаразитяването.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия или местния представител на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване:

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Рутинно третиране при възрастни кучета

Фенпрадин таблетки за кучета и котки трябва да се прилагат като еднократно третиране в доза от 5 mg praziquantel и 50 mg fenbendazole на kg телесна маса (еквивалентно на 1 таблетка на 10 kg телесна маса).

Например:

Дребни кучета и кученца на възраст над 6 месеца

0.5-2.5 kg телесна маса	¼ таблетка
2.5-5 kg телесна маса	½ таблетка
6-10 kg телесна маса	1 таблетка.

Средни кучета

11-15 kg телесна маса	1½ таблетки
16-20 kg телесна маса	2 таблетки
21-25 kg телесна маса	2½ таблетки
26-30 kg телесна маса	3 таблетки.

Едри кучета

31-35 kg телесна маса	3½ таблетки
36-40 kg телесна маса	4 таблетки.

Рутинно третиране при възрастни котки

Фенпрадин таблетки за кучета и котки трябва да се прилагат като единично третиране в доза от 5 mg praziquantel и 50 mg fenbendazole на kg телесна маса (еквивалентно на ½ таблетка на 5 kg телесна маса).

Например:

0.5-2.5 kg телесна маса	¼ таблетка
2.5-5 kg телесна маса	½ таблетка.

За рутинен контрол възрастните кучета и котки трябва да се третират веднъж на всеки 3 месеца.

Отбити кученца и котенца на възраст до 6 месеца

Фенпрадин таблетки за кучета и котки трябва да се прилагат като единично третиране в доза от 5 mg praziquantel и 50 mg fenbendazole на kg телесна маса (еквивалентно на ½ таблетка на 5 kg телесна маса). Третирането трябва да се прилага в продължение на три последователни дни.

Бозаещи кученца и кърмещи кучета

За контрол на *Toxocara* е важно малките кученца да се третират редовно с Фенпрадин таблетки за кучета и котки в доза от 5 mg praziquantel и 50 mg fenbendazole на kg телесна маса дневно за три последователни дни (еквивалентно на ½ таблетка на 5 kg телесна маса за 3 дни). Тази схема за третиране трябва да се повтаря през 2-седмични интервали при кученца на възраст от 2 до 12 седмици.

След това се препоръчва Фенпрадин таблетки за кучета и котки да се прилага на интервали от 3 месеца.

Кърмещите кучета трябва да се третират по същото време и със същата честота, както кученцата на възраст до 12 седмици.

След това се препоръчва схемата за третиране на възрастни кучета веднъж на всеки три месеца.

Повишено дозиране при специфични инфекции

За третирането на клинични нематодни и цестодни паразитози при възрастни кучета да се прилага Фенпрадин таблетки за кучета и котки в доза от: 5 mg praziquantel и 50 mg fenbendazole на kg телесна маса дневно за два последователни дни (еквивалентно на 1 таблетка на 10 kg телесна маса за 2 дни).

За третирането на клинични нематодни и цестодни паразитози при възрастни котки и за контрол на белодробни инфекции с *Aelurostrongylus abstrusus* при котки и протозои *Giardia* при кучета да се прилага Фенпрадин таблетки за кучета и котки в доза от: 5 mg praziquantel и 50 mg fenbendazole на kg телесна маса дневно за три последователни дни (еквивалентно на ½ таблетка на 5 kg телесна маса за 3 дни).

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Фенпрадин таблетки за кучета и котки се прилагат перорално, директно или смесени с порция месо, колбас или друга храна. Не са необходими диетични мерки или прилагане на гладно. Резорбцията може да бъде подобрена чрез храна.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да се изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Всеки неизползван ветеринарен лекарствен продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска без лекарско предписание.

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-2707

Размери на опаковките:

Ленти с по 10 таблетки всяка, опаковани по 10 ленти в картонена кутия.
Блистери с 96 таблетки в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

02/2025

15. Дата на последната редакция на текста

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited.

Loughrea,

Co. Galway,

Ireland.

Telephone: +353 (0)91 841788

vetpharmacoviggroup@chanellegroup.ie

За всякаква информация относно този ветеринарен лекарствен продукт, моля, свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за търговия.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП