

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/01/1372

Fatroximin Dry Cow 100mg/5ml suspensija ievadīšanai tesmenī govīm cietstāves periodā

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano dell'Emilia (Bologna), Itālija.

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Fatroximin Dry Cow 100mg/5ml suspensija ievadīšanai tesmenī govīm cietstāves periodā.
Rifaximin

3. AKTĪVĀO) VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens injektors (5 ml) satur-

Aktīvā viela:

Rifaksimīns 100 mg

Palīgvielas: līdz 5ml

4. INDIKĀCIJA(-S)

Subklīniskā mastīta ārstēšanai, mastīta profilaksei govīm cietstāves periodā, kā arī akūta mastīta profilaksei pēc atnešanās.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav novērotas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Govis (cietstāves periodā).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīšanai tesmenī.

Pēc pēdējās slaukšanas reizes vienu *Fatroximin Dry Cow* injektora saturu ievadīt katrā tesmens pupa kanālā.

Rūpīgi izslaukt katru tescens ceturksni, notīrīt un dezinficēt tescens pupus, it īpaši katra tescens pupa kanāla atveri. Noņemt injektora aizsarguzmavu. Injektora kanulu ievadīt pupa kanālā. Pēc tam ievadīt visu injektora saturu. Pēc aplikācijas izņemt kanulu, vienā rokā turot pupu, ar otras rokas īkšķi un rādītājpirkstu masēt pupu virzienā uz augšu. Pēc tam tescens ceturksni masēt ar abām rokām virzienā uz augšu, lai ievadītā suspensija vienmērīgi izplatītos pa visu tescens cisternu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Fatroximin Dry Cow injektors ir aprīkots ar “Twinsert” sistēmu, kas ļauj veikt daļēju vai pilnīgu injektora kanulas ievadīšanu pupa kanālā. Daļēja kanulas ievadīšana samazina infekcijas risku, jo pilnīgas kanulas ievadīšanas gadījumā tiek dilatēti pupa sfinkteri, kas paver iespējas pupa kanālā keratīna slāni esošo un eksogēno baktēriju iekļūšanai pupa cisternā.

Daļēja injektora kanulas ievadīšana (dažu milimetru dziļumā) novērš keratīna slāņa bojājumus un pupa sfinktera dilatāciju.


Pirms injektora aplikācijas, izslaukt tescens ceturksņus, notīrīt un dezinficēt tescens pupus. Noņemt injektora aizsarguzmavu. Injektora kanulu ievadīt pupa kanālā. Pēc tam ievadīt visu injektora saturu.

Pēc aplikācijas izņemt kanulu, vienā rokā turot pupu, ar otras rokas īkšķi un rādītājpirkstu masēt pupu virzienā uz augšu. Pēc tam tescens ceturksni masēt ar abām rokām virzienā uz augšu, lai ievadītā suspensija vienmērīgi izplatītos pa visu tescens cisternu.


Daļēja injektora ievadīšana. Noņem aizsarguzmavu. Ievada injektora saturu pupa kanālā.

Pilnīga injektora ievadīšana. Noņem aizsarguzmavu. Pagriežot atvieno daļējās ievadīšanas adapteri. Noņem adapteri. Ievada injektora saturu pupa kanālā.

Daļēja ievadīšana




Noņem aizsarguzmavu




Ievada injektora saturu pupa vadā


Pilnīga ievadīšana




Noņem aizsarguzmavu



Griežot atvieno daļējās ievadīšanas adapteru



Noņem adapteru



Ievada injektora saturu pupa vadā

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS (-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.

Pienam pirmajā slaukšanas reizē: Nulle stundas.

Dzīvnieku realizējot gaļā, tescens audus nelietot cilvēku uzturā.

Nav paredzēts lietošani laktējošiem dzīvniekiem.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt vēsā, tumšā vietā.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nav.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri:

Kārba ar 4 injektoriem.

Kārba ar 12 injektoriem.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Latvija