

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:**  
ALBENDAZOLE 300 / ANAFASIS, δισκία 300mg/tab για πρόβατα

**1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

ANAFASIS LIMITED  
Σαντορίνης 3 Παλλούριώτισσα 1048  
Λευκωσία, Κύπρος  
E-Mail: [info@anafasis.com](mailto:info@anafasis.com)

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

UPLAB E.P.E.  
10ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας  
Μεταμόρφωση ΑΤΤΙΚΗΣ  
E-Mail: [info@uplab.gr](mailto:info@uplab.gr)

**2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

ALBENDAZOLE 300 / ANAFASIS, δισκία 300mg/tab για πρόβατα  
Albendazole

**3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

Κάθε δισκίο περιέχει:

**Δραστικό(ά) συστατικό(ά):**  
Albendazole ..... 300 mg

**Έκδοχα:**

Lactose–200, Povidone K29/32, Avicel, Primojel, Talk, Magnesium Stearate, Hydrogen Castor Oil, Tartrazine, Sunset Yellow, Brilliant Blue, Ethanol.

**4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Το προϊόν ενδείκνυται για την πρόληψη και θεραπεία της γαστρεντερικής στρογγυλίδωσης, πνευμονικής στρογγυλίδωσης και ταινίωσης, που προκαλούνται από τα παρακάτω παράσιτα:

Παράσιτα των προβάτων κατά των οποίων δρα η αλβενδαζόλη:

Κεστώδη: *Moniezia expansa*  
*Moniezia benedeni*  
Νηματώδη: *Bunostomum trigonocephalum*  
*Chabertia ovina*  
*Trichostrongylous axei*  
*Trichostrongylus colubiformis*  
*Cooperia curticei*  
*Cooperia oncophora*  
*Ostertagia ostertagi*  
*Ostertagia circumcincta*  
*Nematodirus spp.*

*Haemonchus contortus*  
*Dictyocaulus filaria*  
*Cystocaulus ocreatus*

## 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης. Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευασθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

## 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

## 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα.

## 8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για χορήγηση από το στόμα. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι ως εξής:

Πρόβατα: 3,8 - 5 mg/kg Σ.Β.

## 9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ο υπολογισμός του σωματικού βάρους του ζώου θα πρέπει να γίνεται με ακρίβεια.

## 10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 10 ημέρες

Γάλα: 5 ημέρες.

Είναι προτιμότερο τα αντιπαρασιτικά να δίνονται γενικώς κατά την διάρκεια της ξηράς περιόδου.

## 11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά  
Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά {EXP}. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζώής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 24 μήνες.

## 12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

**Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:**

Ο υπολογισμός του σωματικού βάρους του ζώου θα πρέπει να γίνεται με ακρίβεια.

**Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:**

Δεν απαιτούνται.

Η ανθεκτικότητα των παρασίτων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθελμινθικών μπορεί να προκύψει μετά από συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ανθελμινθικού από αυτή την κατηγορία.

**Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:**

Τα άτομα που χειρίζονται το προϊόν θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά από τη χορήγηση του προϊόντος.

Έγκυες γυναίκες και παιδιά δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

**Κύηση και γαλουχία:**

Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης.

**Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:**

Δεν είναι γνωστή καμία.

**Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):**

Οι συνιστώμενες δόσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνονται. Μολαταύτα, χορήγηση δόσης 3,5 έως 5 φορές της συνιστώμενης δεν βρέθηκε ότι προκάλεσε ειδικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

**Ασυμβατότητες:**

Δεν ισχύει.

**13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**15. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Μεγέθη συσκευασίας**

Box x 5 blisters x 10 bolus x 300 mg

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.