

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**KARTONNEN DOOS**

20/50/100/250 ml glazen fles

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

MARBOCYL 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Marbofloxacin.100,0 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Runderen, varkens.

5. INDICATIES

Niet vereist.

6. TOEDIENINGSWEGEN

SC, IM, IV.

Bij runderen:

Behandeling van luchtweginfecties: veroorzaakt door gevoelige stammen van *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*: de aanbevolen dosis is 8 mg/kg lichaamsgewicht (2 ml diergeneesmiddel/25 kg lichaamsgewicht) als een enkelvoudige intramusculaire injectie.

Behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door gevoelige stammen van *Mycoplasma bovis*: de aanbevolen dosis is 2 mg per kg lichaamsgewicht (1 ml diergeneesmiddel per 50 kg lichaamsgewicht) onder de vorm van één dagelijkse subcutane of intramusculaire injectie, gedurende 3 tot 5 opeenvolgende dagen. De eerste injectie kan intraveneus toegediend worden.

Behandeling van acute mastitis:

2 mg per kg (1 ml per 50 kg lichaamsgewicht) onder de vorm van één dagelijkse subcutane of intramusculaire injectie, gedurende 3 opeenvolgende dagen.
De eerste injectie kan ook intraveneus toegediend worden.

Bij varkens:

Behandeling van het Postpartum Dysgalactie Syndroom –PDS– (Metritis Mastitis Agalactie Syndroom):

2 mg per kg (1 ml per 50 kg lichaamsgewicht) onder de vorm van één dagelijkse intramusculaire injectie, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Behandeling bij mestvarkens van luchtweginfecties:

2 mg per kg (1 ml per 50 kg lichaamsgewicht) onder de vorm van één dagelijkse intramusculaire injectie, gedurende 3 tot 5 opeenvolgende dagen.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7. WACHTTIJDEN

Runderen:

Indicatie	Luchtweginfecties		Mastitis
Dosering	2 mg/kg gedurende 3 tot 5 dagen (IV/IM/SC)	8 mg/kg, éénmalige injectie (IM)	2mg/kg gedurende 3 dagen (IV/IM/SC)
Vlees en slachtafval	6 dagen	3 dagen	6 dagen
Melk	36 uur	72 uur	36 uur

Varkens:

Vlees en slachtafval: 4 dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Vóór eerste opening van de primaire verpakking, moet dit diergeneesmiddel niet onder speciale temperaturomstandigheden worden bewaard.

Na eerste opening: niet bewaren boven 25 °C.

Bescherm tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VETOQUINOL NV/SA

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V198511

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket voor 100 en 250 ml flessen

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

MARBOCYL 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Marbofloxacin.100 mg/ml

3. DOELDIERSOORTEN

Runderen, varkens.

4. TOEDIENINGSWEGEN

SC, IM of IV.

Bij runderen:

Bij rundvee bleek de subcutane weg echter plaatselijk beter te worden verdragen dan de intramusculaire weg. Daarom wordt de subcutane weg aanbevolen bij zwaar rundvee. Voor de injecties moet de voorkeur worden gegeven aan de nek.

Behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door gevoelige stammen van *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*: de aanbevolen dosis is 8 mg/kg lichaamsgewicht (2 ml diergeneesmiddel/25 kg lichaamsgewicht) als een enkelvoudige intramusculaire injectie.

Behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door gevoelige stammen van *Mycoplasma bovis*: de aanbevolen dosis is 2 mg per kg lichaamsgewicht (1 ml diergeneesmiddel per 50 kg lichaamsgewicht) onder de vorm van één dagelijkse subcutane of intramusculaire injectie, gedurende 3 tot 5 opeenvolgende dagen. De eerste injectie kan intraveneus toegediend worden.

Behandeling van acute mastitis:

2 mg per kg (1 ml per 50 kg lichaamsgewicht) onder de vorm van één dagelijkse subcutane of intramusculaire injectie, gedurende 3 opeenvolgende dagen.
De eerste injectie kan ook intraveneus toegediend worden.

Bij varkens:

Injecties moeten bij voorkeur in de nek worden toegediend.

Behandeling van het Postpartum Dysgalactie Syndroom –PDS– (Metritis Mastitis Agalactie Syndroom): 2 mg per kg (1 ml per 50 kg lichaamsgewicht) onder de vorm van één dagelijkse intramusculaire injectie, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Behandeling bij mestvarkens van luchtweginfecties:

2 mg per kg (1 ml per 50 kg lichaamsgewicht) onder de vorm van één dagelijkse intramusculaire injectie, gedurende 3 tot 5 opeenvolgende dagen.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Runderen:

Indicatie	Luchtweginfecties		Mastitis
Dosering	2 mg/kg gedurende 3 tot 5 dagen (IV/IM/SC)	8 mg/kg, éénmalige injectie (IM)	2mg/kg gedurende 3 dagen (IV/IM/SC)
Vless en slachtafval	6 dagen	3 dagen	6 dagen
Melk	36 uur	72 uur	36 uur

Varkens:

Vlees en slachtafval: 4 dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Vóór eerste opening van de primaire verpakking, moet dit diergeneesmiddel niet onder speciale temperaturomstandigheden worden bewaard.

Na eerste opening: niet bewaren boven 25 °C.

Bescherm tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VETOQUINOL NV/SA

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket voor 20 en 50 ml flessen

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

MARBOCYL 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.

20 ml

50 ml

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Marbofloxacin.100 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen.