

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

plastenka 50 ml, 100 ml, 200 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

M+PAC emulzija za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Aktivna učinkovina	<u>Vsebnost v 1 ml:</u>
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> , inaktivirana	≥1.47 RE(*)
lahko mineralno olje	0,134 ml
aluminij (v obliki hidroksida)	1,0 mg
tiomersal (konzervans)	0,10 mg
Pomožne snovi:	qs 1ml

(*)Relativna enota je določena glede na referenčno cepivo

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

emulzija za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml
100 ml
200 ml

5. CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Prašiči v reji, starejši od 7 dni

6. INDIKACIJA(E)

Cepivo je namenjeno za aktivno imunizacijo prašičev proti *Mycoplasma hyopneumoniae* z namenom, da se zmanjša pogostost in obseg sprememb na pljučih.

7. NAČIN IN POT UPORABE

im.
Plastenko pred uporabo dobro pretresite.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8. KARENCA

Nič dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno injiciranje je nevarno – pred uporabo preberite navodila za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo porabite v 8 urah.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2°C - 8°C).

Cepivo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali .

Rp - Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nizozemska

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0193/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Številka serije:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

M+PAC emulzija za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Aktivna učinkovina	<u>Vsebnost v 1 ml:</u>
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> , inaktivirana	≥1.47 RE(*)
lahko mineralno olje	0,134 ml
aluminij (v obliki hidroksida)	1,0 mg
tiomersal (konzervans)	0,10 mg
Ekscipiens:	qs 1ml

(*)Relativna enota je določena glede na referenčno cepivo

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

emulzija za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

1× 50 ml, 2×50 ml, 5×50 ml ,10×50ml
1× 100 ml, 2×100 ml, 5×100 ml ,10×100ml
1× 200 ml, 2×200 ml, 5×200 ml ,10×200ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči v reji, starejši od 7 dni

6. INDIKACIJA(E)

Cepivo je namenjeno za aktivno imunizacijo prašičev proti *Mycoplasma hyopneumoniae* z namenom, da se zmanjša pogostost in obseg sprememb na pljučih.

7. NAČIN UPORABE IN DAJANJA

im.
Plastenko pred uporabo dobro pretresite.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo

8. KARENCA

Nič dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno injiciranje je nevarno – pred uporabo preberite navodila za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo porabite v 8 urah.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2°C - 8°C).

Cepivo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali .

Rp - Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nizozemska

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0193/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Številka serije: