

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. Dénomination du médicament vétérinaire

URICYSTYL

2. Composition qualitative et quantitative

Cantharis .	5 CH
Sérum d'Anguille	5 CH
Apis mellifica ..	5 CH
Mercurius corrosivus .	4 CH
Belladonna ..	5 CH
Terebinthina	5 CH
Berberis vulgaris	3 CH
Solidago virga aurea .	3 CH aa

Excipient QSP 1 ml

3. Forme pharmaceutique

Solution orale.

4.1. Espèces cibles

Chiens et chats

4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens et les chats : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles urinaires fonctionnels, en l'absence d'autre pathologie sous-jacente.

4.3. Contre-indications

Non connues.

4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune.

i) Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

ii) Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

iii) Autres précautions

4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez les femelles pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et en lactation.

4.8. Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Non connues.

4.9. Posologie et voie d'administration

Une goutte par kg de poids corporel, selon l'un des schémas suivants :

- troubles aigus : toutes les heures les 3 à 6 premières heures puis matin, midi et soir, jusqu'à disparition des signes.
- troubles chroniques : matin, midi et soir jusqu'à disparition des signes.

Administrer directement dans la bouche de l'animal à l'aide de la pipette graduée ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

4.10. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Non connu.

4.11. Temps d'attente

Sans objet.

5. Propriétés pharmacologiques

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques

6.1. Liste des excipients

6.2. Incompatibilités majeures

Non connues.

6.3. Durée de conservation

5 ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

6.5. Nature et composition du conditionnement primaire

- . Flacon verre type III
- . Capsule polypropylène

6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

7. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

8. Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/2369358 0/2001

Boîte de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette graduée
Boîte de 1 flacon de 125 ml et de 1 pipette graduée

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

9. Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation

15/01/2001 - 24/11/2010

10. Date de mise à jour du texte

30/09/2013