

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

INTROVIT-B-COMPLEX, injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

tiamino hidrochlorido	10 mg,
riboflavino natrio fosfato	5 mg,
piridoksino hidrochlorido	5 mg,
ciankobalamino	0,02 mg,
dekspantenolio	12,5 mg,
nikotinamido	50 mg,
biotino	0,1 mg,
cholino chlorido	10 mg;

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio, natrio citrato, natrio hidrochlorido	iki 1 ml.
---	-----------

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Galvijai, avys, ožkos, arkliai ir kiaulės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Galvijų, avių, ožkų, arklių ir kiaulių organizmui B grupės vitaminais papildyti, esant jų trūkumui, sergant, sveikimo metu ar patyrus stresą (dėl vakcinacijos, transportavimo, didelės drėgmės ar temperatūrų svyravimų).

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina saugotis ir neį(si)švirkšti žmogui. Atsitiktinai prarijus, patekus ant odos ar į akis, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šio vaisto etiketę.

Jautrūs vaisto veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų žmonės turi vengti dirbti su šiuo veterinariniu vaistu. Vaistą būtina naudoti apdairiai, laikantis saugumo reikalavimų. Naudojus preparatą, reikia plauti rankas.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Gali sudirgti injekcijos vieta.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vaistą reikia švirkšti po oda, į raumenis ar lėtai į veną, laikantis aseptikos reikalavimų:

arkliui, galvijui – 10–15 ml tirpalo;

veršeliui, kumeliukui, aviai, ožkai – 5–10 ml,

ožkiukui, ėriukui – 5–8 ml,

kiaulei – 2–10 ml.

Pakartotinai galima švirkšti 2–3 kartus kas savaitę, priklausomai nuo gyvūno klinikinės būklės.

Didesnį vaisto kiekį rekomenduotina švirkšti keliose injekcijos vietose.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Nežinomas.

Negalima viršyti rekomenduotinių dozių.

4.11. Išlauka

0 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: B grupės vitaminų mišinys. ATCvet kodas: QA11EA.

5.1. Farmakodinaminės savybės

B grupės vitaminai yra skirtingos cheminės sandaros organinės medžiagos, kurios yra gyvybiškai būtinos organizmui normaliai funkcionuoti. Šios medžiagos yra biologiškai aktyvios mažomis koncentracijomis, nes reguliuoja ląstelių funkcijas, įeina į kai kurių, angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitą bei nukleorūgščių sintezę reguliuojančių fermentų sistemų sudėtį. B grupės vitaminai veikia kartu ir skatina augimą, reprodukcines savybes, nervų sistemos funkcijas, atsparumą ligoms, palaiko sveiką odą, plunksnas ir kailį bei yra svarbūs daugeliui kitų funkcijų. Vitaminų derinio sudėtinės dalys veikia sinergiškai. Jei vienu metu į organizmą patenka tik vienas ar keli šios grupės vitaminai, gali imti trūkti kitų vitaminų, todėl rekomenduotina vienu metu naudoti visas būtinas grupės medžiagas.

Vitaminas B1 veikia kaip kofermentas skaidant gliukozę ir glikogeną, gabenant acetaldehidus ir tokiu būdu yra svarbus angliavandenių apykaitai ir riebalų rūgščių sintezei.

Vitamins B2 natrio fosfatas yra fosforinamas į kofermentą riboflavin-5-fosfatą ir flavino adenino dinukleotidą (FAD), kuris yra vandenilio recipientas ir donoras, todėl svarbus oksidacijos ir redukcijos reakcijose.

Vitaminas B6 yra verčiamas į piridoksolio fosfatą, kuris yra transaminazių ir dekarboksilazių kofermentas baltymų ir aminorūgščių apykaitoje.

Nikotinamidas verčiamas į būtinuosius kofermentus – nikotinamido adenino dinukleotidą (NAD) ir nikotinamido adenino dinukleotido fosfatą (NADF), kurie svarbūs vandenilio transportavimui (oksidacijos ir redukcijos reakcijose) ir angliavandenių bei riebalų rūgščių biosintzei ir irimui.

Pantotolis arba pantoteno rūgštis verčiamas kofermentu A, kuris yra svarbus angliavandenių ir aminorūgščių apykaitai bei riebalų rūgščių, steroidų ir acetilkofermento A sintezei.

Vitaminas B12 būtinas nukleorūgščių komponentų, eritrocitų sintzei ir propionato apykaitai. Yra svarbus etilo grupių perdavimui, metionino susidarymui, angliavandenių su nelyginiu C skaičiumi oksidacijai ir šakotųjų aminorūgščių katabolizmui.

Biotinas (vitaminas B7) svarbus paverčiant pašaro medžiagas energija, angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitai. Šis vitaminas yra būtinas kailiui, odai, nagams ir nagoms, užtikrina būtiną aminorūgščių kiekį kraujyje ir jų panaudojimą DNR sintzei normaliojo ląstelių dalijimosi metu.

Vitaminas B9 (folio r.) yra reikalingas baltymams ir hemoglobiniui formuotis.

Cholino chloridas veikia karoteno ir vitamino A apykaitą, būtinas nervų sistemai tinkamai funkcionuoti.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Parenteriniai į organizmą patekę vandenyje tirpūs vitaminai pasiskirsto greitai ir visiškai. Vitaminai patenka į visus audinius. Metabolizuojami greitai, perteklius išsiskiria su šlapimu.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Benzilo alkoholis, natrio citratas, natrio hidrochloridas (koreguoti pH), injekcinis vanduo.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai. Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 2 sav.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius reikia laikyti šaldytuve (2–8 °C). Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Rudo stiklo buteliukai po 100 ml, užkimšti guminiiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Terminalo g. 13, Biruliškės
LT-54469, Kauno r.
Lietuva

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/10/2003/001

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2010-12-10.

Perregistravimo data 2015-12-09.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2025-11-14

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

INTROVIT-B-COMPLEX, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

tiamino hidrochlorido	10 mg,
riboflavino natrio fosfato	5 mg,
piridoksino hidrochlorido	5 mg,
ciankobalamino	0,02 mg,
dekspantenolio	12,5 mg,
nikotinamido	50 mg,
biotino	0,1 mg,
cholino chlorido	10 mg.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, avys, ožkos, arkliai ir kiaulės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Galvijų, avių, ožkų, arklių ir kiaulių organizmui B grupės vitaminais papildyti, esant jų trūkumui, sergant, sveikimo metu ar patyrus stresą (dėl vakcinacijos, transportavimo, didelės drėgmės ar temperatūrų svyravimų).

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS
--

Vaistą reikia švirkšti po oda, į raumenis ar lėtai į veną, laikantis aseptikos reikalavimų.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius – 2 sav.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS
--

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius reikia laikyti šaldytuve (2–8 °C). Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA
--

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Terminalo g. 13, Biruliškės
LT-54469, Kauno r.
Lietuva

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/10/2003/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
INTROVIT-B-COMPLEX, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Terminalo g. 13, Biruliškės
LT-54469, Kauno r.
Lietuva

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS,
Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald,
74001 Harjumaa,
ESTIJA

PharmaPark Production OÜ

Nuia tn 2 Tallinn

Harjumaa 11415

Estija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

INTROVIT-B-COMPLEX, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

tiamino hidrochlorido	10 mg,
riboflavino natrio fosfato	5 mg,
piridoksino hidrochlorido	5 mg,
ciankobalamino	0,02 mg,
dekspantenolio	12,5 mg,
nikotinamido	50 mg,
biotino	0,1 mg,
cholino chlorido	10 mg;

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio, natrio citrato, natrio hidrochlorido	iki 1 ml.
---	-----------

4. INDIKACIJA (-OS)

Galvijų, avių, ožkų, arklių ir kiaulių organizmui B grupės vitaminais papildyti, esant jų trūkumui, sergant, sveikimo metu ar patyrus stresą (dėl vakcinacijos, transportavimo, didelės drėgmės ar temperatūrų svyravimų).

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Gali sudirgti injekcijos vieta.

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, avys, ožkos, arkliai ir kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti po oda, į raumenis ar lėtai į veną, laikantis aseptikos reikalavimų:

arkliui, galvijui – 10–15 ml tirpalo;

veršeliui, kumeliukui, aviai, ožkai – 5–10 ml,

ožkiukui, ėriukui – 5–8 ml,

kiaulei – 2–10 ml.

Pakartotinai galima švirkšti 2–3 kartus kas savaitę, priklausomai nuo gyvūno klinikinės būklės.

Didesnį vaisto kiekį rekomenduotina švirkšti keliose injekcijos vietose.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Žr. 12 p.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius reikia laikyti šaldytuve (2–8 °C). Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę – 2 sav.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina saugotis ir neį(si)švirkšti žmogui. Atsitiktinai prarijus, patekus ant odos ar į akis, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šio vaisto etiketę.

Jautrūs vaisto veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų žmonės turi vengti dirbti su šiuo veterinariniu vaistu. Vaistą būtina naudoti apdairiai, laikantis saugumo reikalavimų. Naudojus preparatą, reikia plauti rankas.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Negalima viršyti rekomenduotinių dozių.

Nesuderinamumai

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2025-11-14

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: B grupės vitaminų mišinys. ATCvet kodas: QA11EA.

Pakuotė: rudo stiklo buteliukai po 100 ml, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.