

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Baytril 100 mg/ml Injektionslösung
Enrofloxacin

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml:
Enrofloxacin 100 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml
100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Ziege und Schwein.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Rind:
IV: Essbare Gewebe: 5 Tage.
Milch: 3 Tage.
SC: Essbare Gewebe: 12 Tage.
Milch: 4 Tage.

Schaf:

Essbare Gewebe: 4 Tage.

Milch: 3 Tage.

Ziege:

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: 4 Tage.

Schweine:

Essbare Gewebe: 13 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw. bis: {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V330951

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Glasflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Baytril 100 mg/ml Injektionslösung
Enrofloxacin

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml:
Enrofloxacin 100 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml
100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Ziege und Schwein.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur intravenösen, subkutanen oder intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Rind:
IV: Essbare Gewebe: 5 Tage.
Milch: 3 Tage.
SC: Essbare Gewebe: 12 Tage.
Milch: 4 Tage.

Schaf:

Essbare Gewebe: 4 Tage.

Milch: 3 Tage.

Ziege:

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: 4 Tage.

Schweine:

Essbare Gewebe: 13 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw. bis: {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V330951

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: {Nummer}