

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelka szklana

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Calciglucon (60 mg + 60mg + 30mg + 27mg)/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Substancje czynne:

Magnezu glukonian	60 mg/ml
Wapnia glukonian	60 mg/ml
Magnezu chlorek sześciowodny	30 mg/ml
Wapnia chlorek sześciowodny	27 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koń, bydło, świnia.

4. DROGI PODANIA

Droga podania: dożylnie.

Konie, bydło: 0,5 – 1,0 ml/kg m.c.

Świnie: 2,0 – 5,0 ml kg m.c.

Lek należy wstrzykiwać powoli 25 – 50 ml /min.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Konie, bydło, świnie:

Tkanki jadalne – zero dni.

Bydło:

Mleko – zero godzin.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biowet Puławy Sp. z o.o.

9. NUMER SERII

Lot {numer}

Dodatkowe informacje:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Wyłącznie dla zwierząt

Pozwolenie: 790/99

250 ml