

PROSPECTO:

ALAMYCIN LA 300

Uso veterinario Solución inyectable

Composición cualitativa y cuantitativa

Alamycin LA 300 es una solución inyectable para administración intramuscular que contiene:

Oxitetraciclina (dihidrato)	300 mg/ml
Excipientes	c.s.p.

Propiedades

Con Alamycin LA 300 se consigue una acción prolongada, resultando en una actividad antibacteriana sostenida.

Tras la administración intramuscular de una dosis de 20 mg/kg p.v., los niveles efectivos en sangre persisten durante 3-4 días, que llegan hasta 5-6 días, si la dosis empleada es de 30 mg/kg p.v.

Los niveles máximos en sangre se alcanzan entre las 4 y 6 horas tras la administración, lo que hace a Alamycin LA 300 apropiado para el tratamiento de infecciones agudas.

Alamycin LA 300 contiene el antibiótico bacteriostático de amplio espectro, oxitetraciclina indicado para su uso en el tratamiento de infecciones causadas por, o asociadas con, organismos sensibles a la oxitetraciclina en bovino, ovino y porcino. Son sensibles a la oxitetraciclina un amplio rango de bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo *Bordetella bronchiseptica*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Pasteurella* spp, *Staphylococcus* spp, y *Streptococcus* spp. Ciertos micoplasmas, rickettsias, protozoos y clamidias también son sensibles a la oxitetraciclina.

Especies de destino

Bovino, ovino y porcino

Indicaciones

Alamycin LA 300 está indicado para el control y tratamiento de una amplia gama de infecciones sistémicas, respiratorias, urinarias y locales, causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina.

Indicaciones específicas incluyen pasteurelisis, neumonía, rinitis atrófica, mal rojo, artritis, onfalitis y terapia de apoyo en mastitis.

Posología, modo y vía de administración

Leer las "Precauciones" antes de la administración del producto.

Administración: Intramuscular profunda

La Dosificación general recomendada de Alamycin LA 300 es de 30 mg/kg p.v., para una duración de actividad prolongada, de 5 a 6 días.

Para asegurar una correcta dosificación se debe determinar el peso de los animales previo a su uso.

Dosis máxima recomendada en un sólo punto de inoculación:

Bovino:	15 ml
Ovino:	5 ml
Porcino:	10 ml
Lechones (de 1 día)	0,2 ml
(de 7 días)	0,3 ml
(de 14 días)	0,4 ml
(de 21 días)	0,5 ml
(de más de 21 días)	1 ml

Contraindicaciones

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.

Precauciones

Precauciones especiales de uso: Personas con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas deberían evitar cualquier contacto con el producto.

Precauciones generales:

No diluir Alamycin LA 300. No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas. Si se administra simultáneamente con otros tratamientos, utilizar diferentes puntos de inyección. Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso. Una vez que el frasco se ha perforado por primera vez, el contenido debe usarse en el plazo de 28 días.

Reacciones adversas:

Ocasionalmente puede observarse una leve reacción local de naturaleza transitoria en el punto de inyección. Una doble dosis de la terapéutica en bovino, puede originar una reacción local severa. En muy raras ocasiones se han notificado reacciones de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia (en ocasiones mortal).

Utilización durante la gestación y la lactancia. No se recomienda el uso en hembras gestantes. El uso de tetraciclinas durante el período de desarrollo de dientes y huesos, incluyendo la última parte de la gestación, puede conducir (debido a su potente capacidad quelante del calcio) a decoloración e inhibición del crecimiento óseo.

Tiempo de espera

Carne:

Bovino: 35 días,
Porcino: 28 días,
Ovino: 35 días

Leche:

Bovino: 7 días,
Ovino: 9 días

Otras informaciones

Una vez que el frasco se ha perforado por primera vez, el contenido debe usarse en el plazo de 28 días.

Cuando se expone al aire, el color de la solución puede oscurecerse, sin que esto signifique pérdida de potencia.

Precauciones especiales de conservación

La fecha de caducidad impresa en la etiqueta será solamente garantizada, si el producto se mantiene en el envase original sin abrir, en lugar fresco (por debajo de 25°C), seco y al abrigo de la luz.

Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el medicamento veterinario no utilizado o en su caso los residuos derivados de su utilización

Los envases usados deberán ser eliminados de forma segura para el medio ambiente y de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia.

Presentaciones

Caja con 1 frasco de 100 ml. Caja con 12 frascos de 100 ml.

Caja con 1 frasco de 250 ml. Caja con 12 frascos de 250 ml.

Caja con 1 frasco de 500 ml. Caja con 12 frascos de 500 ml.

Dispensación con receta veterinaria.

Registro nº: 1319 ESP

“Sujeto a prescripción veterinaria”

Titular de la autorización de comercialización

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irlanda

Fabricante responsable de la liberación del lote

Norbrook Manufacturing Ltd

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irlanda

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Irlanda del Norte

Representante local



Laboratorios Karizoo S.A.
P.I. La Borda, Mas Pujades 11-12
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
España