

**I PIELIKUMS**  
**VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS**

## 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Canicaral vet 40 mg tabletes suņiem

## 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur:

### Aktīvā viela:

Karprofēns 40 mg

### Palīgvielas:

| Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs |
|-----------------------------------------------------|
| Laktozes monohidrāts                                |
| Nātrija cietes glikolāts (A tipa)                   |
| Ciete, kukurūzas                                    |
| Talks                                               |
| Celuloze, pulveris                                  |
| Ciete, preželatinēta                                |
| Silīcija dioksīds, koloidālais, bezūdens            |
| Kalcija behenāts                                    |
| Raugs, deaktivēts                                   |
| Mākslīgs liellopu gaļas aromatizētājs               |

Gaiši brūna ar brūniem plankumiem, apaļa un izliekta aromatizēta tablete, ar krustveida dalījuma līnijām vienā pusē.

Tabletes var sadalīt 2 vai 4 vienādās daļās.

## 3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

### 3.1. Mērķsugas

Suņi.

### 3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Skeleta-muskuļu bojājumu un deģeneratīvu locītavu slimību izraisīta iekaisuma un sāpju mazināšanai. Kā turpinājums parenterālai atsāpīnāšanai pēcoperācijas sāpju kontrolē.

### 3.3. Kontrindikācijas

Nelietot kaķiem.

Nelietot grūsnām un laktējošām kucēm.

Nelietot suņiem, jaunākiem par 4 mēnešiem.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

Nelietot suņiem ar sirds, aknu vai nieru slimībām, kā arī, ja pastāv gremošanas trakta čūlas vai asiņošanas iespēja, vai arī, ja ir pierādījumi par asins diskraziju.

### 3.4. Īpaši brīdinājumi

Nav.

### 3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

#### Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām:

Lietošana veciem suņiem var būt saistīta ar papildu risku.

Ja no šādas lietošanas nav iespējams izvairīties, suņiem var būt nepieciešama rūpīga klīniskā kontrole. Nelietot dehidratētiem, hipovolēmiskiem vai hipotensīviem suņiem, jo iespējams paaugstināts nieru toksicitātes risks.

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL) var izraisīt fagocitozes inhibīciju, līdz ar to, ārstējot baktēriju izraisītus iekaisumus, vienlaikus ir jāuzsāk piemērota antibakteriālā terapija.

Tabletes ir aromatizētas. Lai novērstu nejaušu norīšanu, uzglabāt tabletes dzīvniekiem nepieejamā vietā.

Skatīt 3.8. apakšpunktā.

#### Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Pēc rīkošanās ar šīm veterinārajām zālēm mazgāt rokas.

#### Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Nav piemērojami.

### 3.6. Blakusparādības

Suņi:

|                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reti<br>(1 līdz 10 dzīvniekiem/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem):                          | Nieru darbības traucējumi<br><br>Aknu darbības traucējumi <sup>b</sup>                                                                                                   |
| Ļoti reti<br>(<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi): | Vemšana <sup>a</sup> , mīkstas fekālijas <sup>a</sup> , diareja <sup>a</sup> , asinis fekālijās <sup>a</sup><br><br>Letarģija <sup>a</sup> ēstgribas zudums <sup>a</sup> |

<sup>a</sup> Šīs blakusparādības parasti rodas ārstēšanas pirmajā nedēļā un vairumā gadījumu ir pārejošas un izzūd pēc ārstēšanas pārtraukšanas, taču ļoti retos gadījumos var būt smagas vai letālas.

<sup>b</sup> Idiosinkrātisks efekts

Ja rodas blakusparādības, pārtraukt šo veterināro zāļu lietošanu un konsultēties ar veterinārārstu.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam, vai tā vietējam pārstāvim, vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

### 3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

#### Grūsnība un laktācija:

Laboratoriskajos pētījumos žurkām un trušiem tika konstatēta karprofēna fetotoksiska iedarbība, lietojot devas, kas tuvas terapeitiskajai devai.

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā.

Skatīt 3.3. apakšpunktā.

### 3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot vienlaicīgi ar citiem NPL un glikokortikoīdiem vai 24 stundu laikā pēc šo veterināro zāļu lietošanas. Karprofēns izteikti saistās ar plazmas olbaltumvielām un var konkurēt ar citām zālēm ar tikpat labu saistīšanās spēju, kas var radīt toksisku iedarbību.

Izvairīties no potenciāli nefrotoksisku zāļu vienlaicīgas lietošanas.

### 3.9. Lietošanas veids un devas

Iekšķīgai lietošanai.

Lai nodrošinātu pareizu devu un izvairītos no pārdozēšanas, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

*Devas*

2 - 4 mg karprofēna uz kg ķermeņa svara dienā.

Skeleta-muskuļu bojājumu un deģeneratīvu locītavu slimību izraisīta iekaisuma un sāpju mazināšanai: sākuma deva 4 mg karprofēna uz kg ķermeņa svara dienā, ko ievada kā vienu devu vai divas vienādās daļās sadalītas devas, ņemot vērā klīnisko atbildes reakciju, var tikt samazinātas līdz 2 mg karprofēna/kg ķermeņa svara/dienā, ko ievada, kā vienu devu. Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no pacientam novērotās atbildes reakcijas. Lai zāles lietotu ilgāk par 14 dienām, veterinārārstam suns ir regulāri jāpārbauda.

Nepārsniegt ieteicamo devu.

Lai pagarinātu pretsāpju un pretiekaisuma iedarbību pēc operācijas, parenterālu pirmsoperācijas terapiju, kurā izmanto injicējamās karprofēnu saturošās veterinārās zāles, var turpināt ar karprofēna tablešu lietošanu 4 mg/kg ķ.sv./dienā līdz 5 dienām.

Turpmākā tabula ir vadlīnija šo veterināro zāļu lietošanai devā 4 mg uz kg ķermeņa svara dienā.


Tablešu skaits devai 4 mg/kg ķ.sv.

| Ķermeņa svars (kg) | Canicaval vet 40 mg reizi dienā                                                     | Canicaval vet 40 mg divas reizes dienā                                              |                                                                                     | Canicaval vet 160 mg reizi dienā                                                      | Canicaval vet 160 mg divas reizes dienā                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >2,5 kg - 5 kg     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| >5 kg - 7,5 kg     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| >7,5 kg - 10 kg    |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| >10 kg - 12,5 kg   |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| >12,5 kg - 15 kg   |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| >15 kg - 17,5 kg   |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| >17,5 kg - 20 kg   |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| >20 kg - 25 kg     |  |  |  |  |   |
| >25 kg - 30 kg     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| >30 kg - 35 kg     |  |  |  |  |   |
| >35 kg - 40 kg     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| >40 kg - 50 kg     |  |  |  |  |   |
| >50 kg - 60 kg     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |   |

|                |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| >60 kg - 70 kg |  |  |  |  |  |  |
| >70 kg - 80 kg |  |  |  |  |  |  |

 = ¼ tabletes    
 = ½ tabletes    
 = ¾ tabletes    
 = 1 tablete

Lai nodrošinātu precīzu devu, tabletes var sadalīt 2 vai 4 vienādās daļās. Novietojiet tableti uz līdzenas virsmas, lai dalījuma līnijas būtu vērstas uz augšu, bet izliektā (ieapaļā) puse būtu vērsta uz leju.



Puses: spiediet ar īkšķiem uz leju tabletes abas puses.  
Ceturtdaļas: spiediet ar īkšķi tabletes vidū.

### 3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Ārstējot suņus ar karprofēnu devās līdz pat 6 mg/kg ķ.sv. divas reizes dienā 7 dienas (3 reizes vairāk par ieteicamo devu 4 mg/kg ķ.sv.) un 6 mg/kg ķ.sv. reizi dienā vēl 7 dienas (1,5 reizes vairāk par ieteicamo devu 4 mg/kg ķ.sv.), toksicitātes pazīmes nenovēroja.

Specifiska antidota pret karprofēna pārdozēšanu nav, taču ir jāizmanto vispārēja atbalsta terapija, ko lieto NPL pārdozēšanas gadījumā.

### 3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojami.

### 3.12. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

## 4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 4.1. ATĶvet kods: QM01AE91

### 4.2. Farmakodinamiskās īpašības

Karprofēns ir NPL. Tas ir atvasināts no fenilpropionskābes un pieder 2-arilpropionskābes klases NPL. Tas satur hirālo centru ap propionskābes puses C<sub>2</sub>, tādēļ tas pastāv divu stereoizomēru veidā - kā (+)-S un (-)-R enantiomērs. Suņiem hirālā inversija starp enantiomēriem *in-vivo* nenotiek.

Karprofēnam piemīt pretiekaisuma, pretsāpju un pretdrudža iedarbība. Tāpat kā lielākā daļa NPL, karprofēns inhibē arahidonskābes kaskādes enzīmu ciklooksigenāzi. Tomēr karprofēna prostaglandīnu sintēzes inhibīcija ir neliela, salīdzinot ar tā pretiekaisuma un pretsāpju iedarbību. Precīzs karprofēna darbības mehānisms nav zināms.

### **4.3. Farmakokinētiskās īpašības**

Suņiem karprofēna absorbcija pēc iekšķīgas ievadīšanas ir strauja ( $T_{\max} = 2,0$  h).  $C_{\max}$  ir 28,67 µg/ml. Karprofēna izkļedes tilpums ir neliels, un karprofēns labi piesaistās plazmas olbaltumvielām. Karprofēna biotransformācija notiek aknās – veidojas estera glikuronīds un divi 1-O-acil-β-D-glikuronīda diastereoizomēri. Šīs vielas izdalās žultī un tiek izvadītas ar fekālijām.

## **5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA**

### **5.1. Būtiska nesaderība**

Nav piemērojama.

### **5.2. Derīguma termiņš**

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 3 gadi.  
Sadalītu tableti izlietot 3 dienu laikā.

### **5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi**

Neizlietotās tablešu daļas ievietot atvērtajā blisterī, lai pasargātu no gaismas.  
Neatvērtam blisterim nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

### **5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs**

Alumīnija - PA/ALU/PVC blisteris.  
Kartona kastīte ar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 vai 50 blisteriem pa 10 tabletēm.  
Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

### **5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai**

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

## **6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS**

Le Vet. Beheer B.V.

## **7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)**

V/DCP/15/0021

## **8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS**

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 01/07/2015.

## **9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS**

05/2024

## **10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**III PIELIKUMS**  
**MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**



## **A. MARKĒJUMS**

## UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

### Kartona kastīte

#### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Canicaral vet 40 mg tabletes

#### 2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katra tablete satur 40 mg karprofēna

#### 3. IEPAKOJUMA LIELUMS

10 tabletes  
20 tabletes  
30 tabletes  
40 tabletes  
50 tabletes  
60 tabletes  
70 tabletes  
80 tabletes  
90 tabletes  
100 tabletes  
250 tabletes  
500 tabletes

#### 4. MĒRĶSUGAS

Suņi



#### 5. INDIKĀCIJAS

#### 6. LIETOŠANAS VEIDI

Iekšķīgai lietošanai.

#### 7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

#### 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mēnesis/gads}

Sadalītu tableti izlietot 3 dienu laikā.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI</b> |
|-----------------------------------------|

Neizlietotās tablešu daļas ievietot atvērtajā blisterī, lai pasargātu no gaismas.

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”</b> |
|---------------------------------------------------------------------|

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”</b> |
|-------------------------------------------|

Lietošanai dzīvniekiem.

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”</b> |
|-------------------------------------------------------------------|

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS</b> |
|--------------------------------------------|

Le Vet. Beheer B.V.

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI</b> |
|------------------------------------------|

V/DCP/15/0021

|                           |
|---------------------------|
| <b>15. SĒRIJAS NUMURS</b> |
|---------------------------|

Lot {numurs}

**UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA**

**Alu-PA/ALU/PVH blisteri**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Canicaral vet



**2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI**

40 mg/tablete

**3. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**4. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp. {mm/gggg}

## **B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### 1. Veterināro zāļu nosaukums

Canicaral vet 40 mg tabletes suņiem

### 2. Sastāvs

Katra tablete satur:

**Aktīvā viela:**

Karprofēns 40 mg

Gaiši brūna ar brūniem plankumiem, apaļa un izliekta aromatizēta tablete, ar krustveida dalījuma līnijām vienā pusē.

Tabletes var sadalīt 2 vai 4 vienādās daļās.

### 3. Mērķsugas

Suņi.

### 4. Lietošanas indikācijas

Skeleta-muskuļu bojājumu un deģeneratīvu locītavu slimību izraisīta iekaisuma un sāpju mazināšanai. Kā turpinājums parenterālai atsāpinošanai pēcoperācijas sāpju kontrolē.

### 5. Kontrindikācijas

Nelietot kaķiem.

Nelietot grūsnām un laktējošām kucēm.

Nelietot suņiem, jaunākiem par 4 mēnešiem.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

Nelietot suņiem ar sirds, aknu vai nieru slimībām, kā arī, ja pastāv gremošanas trakta čūlas (kuņģa vai zarnu čūla) vai asiņošanas iespēja, vai arī, ja ir pierādījumi par asins diskrāziju (asins slimība).

### 6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Lietošana veciem suņiem var būt saistīta ar papildu risku.

Ja no šādas lietošanas nav iespējams izvairīties, suņiem var būt nepieciešama rūpīga klīniskā kontrole.

Nelietot dehidratētiem, hipovolēmiskiem (ar mazu asiņu daudzumu) vai hipotensīviem (ar zemu asinsspiedienu) suņiem, jo iespējams paaugstināts nieru toksicitātes risks.

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL), piemēram, karprofēns, var izraisīt fagocitozes (viena no imūnsistēmas mehānismiem) inhibīciju, līdz ar to, ārstējot baktēriju izraisītus iekaisumus, vienlaikus ir jāuzsāk piemērota antibakteriālā terapija.

Tabletes ir aromatizētas. Lai novērstu nejaušu norīšanu, uzglabāt tabletes dzīvniekiem nepieejamā vietā.

Skatīt arī sadaļā “Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi”.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Pēc rīkošanās ar šīm veterinārajām zālēm mazgāt rokas.

#### Grūsnība un laktācija:

Laboratoriskajos pētījumos žurkām un trušiem tika konstatēta karprofēna fetotoksiska iedarbība, lietojot devas, kas tuvas terapeitiskajai devai.

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā.

Skatīt sadaļā “Kontrindikācijas”.

#### Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar citiem NPL un glikokortikosteroīdiem vai 24 stundu laikā pēc šo veterināro zāļu lietošanas. Karprofēns izteikti saistās ar plazmas olbaltumvielām un var konkurēt ar citām zālēm ar tikpat labu saistīšanās spēju, kas var radīt toksisku iedarbību.

Izvairīties no potenciāli nefrotoksisku zāļu vienlaicīgas lietošanas.

#### Pārdozēšana:

Ārstējot suņus ar karprofēnu devās līdz pat 6 mg/kg ķ.sv. divas reizes dienā 7 dienas (3 reizes vairāk par ieteicamo devu 4 mg/kg ķ.sv.) un 6 mg/kg ķ.sv. reizi dienā vēl 7 dienas (1,5 reizes vairāk par ieteicamo devu 4 mg/kg ķ.sv.), toksicitātes pazīmes nenovēroja.

Specifiska antidota pret karprofēna pārdozēšanu nav, taču ir jāizmanto vispārēja atbalsta terapija, ko lieto NPL pārdozēšanas gadījumā.

## **7. Blakusparādības**

Suņi:

|                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reti<br>(1 līdz 10 dzīvniekiem/10 000<br>ārstētajiem dzīvniekiem):                             | Nieru darbības traucējumi<br><br>Aknu darbības traucējumi <sup>b</sup>                                                                                                    |
| Ļoti reti<br>(<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem<br>dzīvniekiem, tostarp atsevišķi<br>ziņojumi): | Vemšana <sup>a</sup> , mīksts fekālijas <sup>a</sup> , diareja <sup>a</sup> , asinis fekālijās <sup>a</sup><br><br>Letarģija <sup>a</sup> , ēstgribas zudums <sup>a</sup> |

<sup>a</sup> Šīs blakusparādības parasti rodas ārstēšanas pirmajā nedēļā un vairumā gadījumu ir pārejošas un izzūd pēc ārstēšanas pārtraukšanas, taču ļoti retos gadījumos var būt smagas vai letālas.

<sup>b</sup> Idiosinkrātisks efekts

Ja rodas blakusparādības, pārtraukt šo veterināro zāļu lietošanu un konsultēties ar veterinārārstu.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontakttinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: <https://www.pvd.gov.lv>.

## **8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode**

Iekšķīgai lietošanai.

Lai nodrošinātu pareizu devu un izvairītos no pārdozēšanas, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

#### Devas

2 - 4 mg karprofēna uz kg ķermeņa svara dienā.

Skeleta-muskuļu bojājumu un deģeneratīvu locītavu slimību izraisīta iekaisuma un sāpju mazināšanai: sākuma deva, 4 mg karprofēna uz kg ķermeņa svara dienā, ko ievada, kā vienu devu vai divas vienādās daļās sadalītas devas, ņemot vērā klīnisko atbildes reakciju, var tikt samazinātas līdz 2 mg karprofēna/kg ķermeņa svara/dienā, ko ievada kā vienu devu. Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no pacientam novērotās atbildes reakcijas. Lai zāles lietotu ilgāk par 14 dienām, veterinārārstam suns ir regulāri jāpārbauda. Nepārsniegt ieteicamo devu.

Lai pagarinātu pretsāpju un pretiekaisuma iedarbību pēc operācijas, parenterālu pirmsoperācijas terapiju, kurā izmanto injicējamās karprofēnu saturošās veterinārās zāles, var turpināt ar karprofēna tablešu lietošanu 4 mg/kg ķ.sv./dienā līdz 5 dienām.

Turpmākā tabula ir šo vadlīnija veterināro zāļu lietošanai devā 4 mg uz kg ķermeņa svara dienā.

| Tablešu skaits devai 4 mg/kg ķ.sv. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ķermeņa svars (kg)                 | Canicaval vet 40 mg reizi dienā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Canicaval vet 40 mg divas reizes dienā                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | Canicaval vet 160 mg reizi dienā                                                                                                                                            | Canicaval vet 160 mg divas reizes dienā                                                                                                                                     |
| >2,5 kg - 5 kg                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| >5 kg - 7,5 kg                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| >7,5 kg - 10 kg                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| >10 kg - 12,5 kg                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| >12,5 kg - 15 kg                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| >15 kg - 17,5 kg                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| >17,5 kg - 20 kg                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| >20 kg - 25 kg                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                        |   |
| >25 kg - 30 kg                     |                                                                                        |   |   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| >30 kg - 35 kg                     |                                                                                        |   |   |                                                                                        |   |
| >35 kg - 40 kg                     |     |   |   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| >40 kg - 50 kg                     |     |   |   |                                                                                        |   |
| >50 kg - 60 kg                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |   |   |
| >60 kg - 70 kg                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |   |   |
| >70 kg - 80 kg                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |   |   |



= 1/4 tabletes



= 1/2 tabletes



= 3/4 tabletes




= 1 tablete

## 9. Ieteikumi pareizai lietošanai

Lai nodrošinātu precīzu devu, tabletes var sadalīt 2 vai 4 vienādās daļās. Novietojiet tableti uz līdzenas virsmas, lai dalījuma līnijas būtu vērstas uz augšu, bet izliektā (ieapaļā) puse būtu vērsta uz leju.





Puses: spiediet ar īkšķiem uz leju tabletes abas puses.  
Ceturtdaļas: spiediet ar īkšķi tabletes vidū.

#### **10. Ierobežojumu periods**

Nav piemērojams.

#### **11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Sadalītu tableti izlietot 3 dienu laikā.

Neizlietotās tablešu daļas ievietot atvērtajā blisterī, lai pasargātu no gaismas.

Neatvērtam blisterim nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc Exp.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

#### **12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai**

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

#### **13. Veterināro zāļu klasifikācija**

Recepšu veterinārās zāles.

#### **14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi**

Tirdzniecības atļaujas numurs: V/DCP/15/0021

Kartona kastīte ar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 vai 50 blisteriem pa 10 tabletēm

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

#### **15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta**

02/2025

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

#### **16. Kontakthinformācija:**

Tirdzniecības atļaujas turētājs:

Le Vet. Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Artesan Pharma GmbH & Co KG  
Wendlandstrasse 1, Lüchow  
29439, Vācija

vai

Lelypharma B.V.  
Zuiveringweg 42  
8243 PZ Lelystad  
Nīderlande


vai

Genera d.d.  
Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica  
10436 Rakov Potok  
Horvātija

Vietējie pārstāvji un kontakthinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

A/S Dimedium Latvija  
Ozolu iela 28  
Jaunmārupe, Mārupes novads  
LV-2166, Latvija  
+371 676 10001

#### **17. Cita informācija**



Sadalāma tablete.