

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/01/1406

Gallivac IBD liofilizāts suspensijas pagatavošanai vistām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, Avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint priest
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Gallivac IBD liofilizāts suspensijas pagatavošanai vistām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena deva satur:

Aktīvā viela:

Novājināts infekciozā bursīta vīruss, celms S706 vismaz $10^{4,0} \cdot \text{CCID}_{50}$ *

**CCID₅₀ – šūnu kultūras infekciozā deva*

4. INDIKĀCIJA(-S)

Cāļu vakcinācijai pret infekciozo bursītu.

Imunitātes iestāšanās: 2 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums: līdz augšanas perioda beigām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojot jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Vistas (cāļi).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Okulārai lietošanai, intranazālai lietošanai, lietošanai ar dzeramo ūdeni vai izsmidzināšanu.

Atšķaidīt liofilizātu tūrā dzeramajā ūdenī, kas nesatur antiseptiskus vai dezinfekcijas līdzekļus. Lietot nekavējoties pēc atšķaidīšanas.

Apvidos ar izteiktām epidemioloģiskajām izmaiņām - viena vakcinācija 11 un 21 dienu vecumā.
Apvidos ar vāji izteiktām epidemioloģiskajām izmaiņām - viena vakcinācija 14 dienu vecumā.

Lai lietotu vakcīnu, izdur šļirci, kas piepildīta ar dzeramo ūdeni, adatu cauri flakona korķītim. Ievada ūdeni, ievieš atšķaidīto vakcīnu šļircē un ievada tās saturu traukā ar dzeramo ūdeni, kas nepieciešams, lai vakcīnu ievadītu. Flakonu skalo divas reizes.

Individuālā vakcinācija

Okulārai lietošanai:

1000 putniem izšķīdināt 1000 devu liofilizātu 1 ml dzeramā ūdens un pēc tam atšķaidīt ar 50 ml dzeramā ūdens.
Iepilināt vakcīnas šķīduma pilienu putnam acī, pagaidīt, kamēr piliens izplatās, un tad atbrīvot putnu.

Intranazālai lietošanai, knābja iemērkšanai, tikai 1 diennakti veciem cāļiem:

1000 putniem izšķīdināt 1000 devu liofilizātu 1 ml dzeramā ūdens un pēc tam atšķaidīt ar 50 ml dzeramā ūdens.
Iemērkāt knābi līdz nāsīm tā, lai vakcīnas šķīdums var iekļūt deguna ejās.

Masveida vakcinācija

Lietošanai ar dzeramo ūdeni, cāļiem no 5 dienu vecuma

1000 putniem izšķīdināt 1000 devu liofilizātu 1 ml dzeramā ūdens un pēc tam izšķīdināt to tādā dzeramā ūdens daudzumā, kuru putni uzņems vienas stundas laikā.
Tieši pirms lietošanas sagatavoto vakcīnas šķīdumu lieto putniem, kuriem pirms tam liegta piekļuve dzeramajam ūdenim vismaz 2 stundas.

Lietošanai ar izsmidzināšanu

1000 putniem izšķīdināt 1000 devu liofilizātu 1 ml dzeramā ūdens un pēc tam atšķaidīt ar 250 ml dzeramā ūdens.
Izsmidzina vakcīnas šķīdumu virs putniem, lietojot spiediena izsmidzinātāju, kas veido mikropilienu. Lai vakcīna pienācīgi izplatītos, jāpārliedz, ka putni ir saspiedušies cieši kopā izsmidzināšanas laikā un turpmākās 15 minūtes.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ievērot vispārēju aseptiku.

Lietot sterilus materiālus vakcīnas šķīduma sagatavošanai, kas nesatur antiseptiskus un dezinfekcijas līdzekļus.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas saskaņā ar lietošanas instrukciju: 2 stundas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai nokļūšana acīs, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

Vakcīnas sagatavošanai lietot tikai aprīkojumu un ūdeni, kas nesatur mazgāšanas un/vai dezinfekcijas līdzekļus.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Iepakojums:

1000 devu stikla flakons, kaste ar 1 flakons.

1000 devu stikla flakons, kaste ar 10 flakoniem.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.