

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/12/0044**

**LV Vitol-140 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENZES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**LV Vitol-140 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem**

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

1 ml šķīduma satur:

**Aktīvās vielas:**

Vitamīns A (retinola palmitāts) 80 000 IU

Vitamīns D<sub>3</sub> (holekalciferols) 40 000 IU

Vitamīns E (α-tokoferola acetāts) 20 mg

**Palīgvielas:**

Benzilspirts, butilhidroksitoluols, sojas eļļa

Dzeltens, eļļains šķīdums.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

LV Vitol-140 ir vitamīnu A, D<sub>3</sub> un E kombinācija lietošanai zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem sekojošos gadījumos:

- stresa izraisītu veselības traucējumu ārstēšanai vakcinācijas, saslimšanas, transportēšanas, paaugstināta mitruma, paaugstinātas temperatūras vai straujas temperatūras maiņas gadījumā;
- lai uzlabotu barības izmantojamību.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem, kuri uzņem A vitamīnu pietiekamā daudzumā, jo ir iespējama tā uzkrāšanās pārtikā izmantojamajos audos.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Ievadot noteiktajās devās, blakusparādības nav novērotas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Zirgi, liellopi, aitas, kazas, cūkas, suņi un kaķi.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Vienreizējai intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Neievadīt šīs veterinārās zāles subkutāni liellopiem, teļiem, zirgiem, kumeļiem, aitām, kazām, cūkām un sivēniem.

Liellopiem un zirgiem: 10 ml;

Teļiem un kumeļiem: 5 ml;

Aitām un kazām: 3 ml;

Cūkām: 5-8 ml;

Sivēniem: 1-3 ml;

Suņiem: 1-5 ml;

Kaķiem: 1-2 ml.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Lai novērstu vitamīnu kumulāciju (uzkrāšanos) organismā, nelietot LV Vitol-140 suņiem un kaķiem biežāk kā vienu reizi nedēļā.

Liellopiem, teļiem, zirgiem, kumeļiem, aitām, kazām, cūkām un sivēniem ievadīt šīs veterinārās zāles tikai vienu reizi, nepārsniedzot ieteicamo devu.

Veicot injekciju, ievērot vispārpieņemtus aseptikas principus.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem:

Zirgi, liellopi: 234 dienas,

Cūkas: 224 dienas,

Aitas, kazas: 185 dienas.

Pienam:

Zirgi, liellopi, aitas, kazas: 120 stundas (5 dienas).

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī (2 - 8 °C).

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Lai novērstu vitamīnu kumulāciju (uzkrāšanos) organismā, nelietot LV Vitol-140 suņiem un kaķiem biežāk kā vienu reizi nedēļā.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nevar izslēgt A vitamīna hipervitaminozes risku. Tādēļ, ievadot šīs veterinārās zāles, ievērot lielu piesardzību. Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pētījumos ar A vitamīnu laboratorijas dzīvniekiem ir pierādīta teratogēna iedarbība. Tādēļ šo veterināro zāļu ievadīšanu nedrīkst veikt grūtnieces.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai nokļūšana acīs, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Pēc rīkošanās ar šīm veterinārajām zālēm, rūpīgi nomazgāt rokas.

#### Lietošana grūsnības, laktācijas laikā:

Lietojot zāles grūsnības pirmajā trimestrī, ievērot piesardzības pasākumus, jo vitamīnam A var būt teratogēna iedarbība.

Drīkst lietot laktācijas laikā.

#### Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

#### Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Taukos šķīstošos vitamīnus nedrīkst uzņemt pārmērīgi, jo tie uzkrājas organismā un var izraisīt blakusparādības.

Vitamīna A pārdozēšanas gadījumā var novērot samazinātu barības uzņemšanu, ķermeņa svara samazināšanos, eritrēmu, alopeciju, izmaiņas gļotādās un garo kaulu lūzumu uz ko var norādīt klībums vai izmainīta gaita.

Vitamīna D pārdozēšana var izpausties kā hiperkalcēmija, hipofosfatēmija, osteoporoze, hipoparatiroidisms, hiperkalcitonisms un distrofiskā kalcinoze.

Nelietot lielākās devā kā norādīts.

#### Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

10/2021

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums: brūns, II tipa stikla flakons (100 ml), kas noslēgts ar plastmasas aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku:

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005