

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za
100ml, 250 ml vialo

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo
Florfenikol
Fluniksin

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml raztopine vsebuje:
florfenikol 300,0 mg
fluniksin (megluminijev fluniksinat) 16,5 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100ml,
250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT UPORABE**

Subkutano.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 46 dni
Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Uporaba pri mlekaricah v času laktacije in presušitve ni dovoljena. Ne uporabite pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, v obdobju dveh mesecev pred pričakovanim porodom.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25°C. Zdravilo ne sme zmrzniti. Zaščitite pred mrazom.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemska

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0294/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Nalepka za viala s100ml, 250 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Resflor 300/16,5 mg/ml □ raztopina za injiciranje za govedo
Florfenikol
Fluniksin

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml raztopine vsebuje:
florfenikol 300,0 mg
fluniksin (megluminijev fluniksinat) 16,5 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml
250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 46 dni

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.
Uporaba pri mlečnih kravah v času laktacije in presušitve ni dovoljena. Ne uporabljajte pri brejih živalih, katerih mleko bo 2 meseca po pričakovanem porodu namenjeno za prehrano ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Pazite da ne pride do nenamernega samoinjiciranja.

Pred pripravo vsakega odmerka obrišite zamašek. Uporabljajte suhe sterilne igle in brizge.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odperto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25°C. Zdravilo ne sme zmrzniti. Zaščitite pred mrazom.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemska

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0294/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije